

# **Свойства функций**

**Автор: Сорокина Надежда Николаевна, учитель  
математики ГБОУ НКК**

**2019 г.**

На рисунке изображён график зависимости температуры  $p$  ( $^{\circ}\text{C}$ ) от времени суток  $t$  (час)

Определите промежуток времени, в течение которого температура была равна 0

Б: Во сколько градусов самая низкая и самая высокая температура достигалась?



Мы выяснили некоторые свойства функции  $p = f(t)$ , где  $t$  – время,  $p$  – температура

**ООФ и**

**ОЗФ**


Рассмотрим функцию  $y=f(x)$ , график которой изображён на рисунке.

ООФ  $x \in [-5; 9]$

:


ОЗФ  $y \in [-4; 5]$

:



# Нули

Значения аргумента, при которых функция обращается в нуль, называются **нулями функции**.




$$y=0 \text{ при } x=-3,$$
$$x=7$$

# Промежутки

## знакопостоянства

Промежутки в которых функция сохраняет знак, называются **промежутками** **знакопостоянства**.



$y > 0$  при

$y < 0$  при  $-5 \leq x < -3,$

$7 < x < \dots$

# Промежутки

## Промежутки монотонности – это промежутки возрастания и убывания


**Определение.** Функция называется возрастающей в некотором промежутке, если большему значению аргумента из этого промежутка соответствует большее значение функции; функция называется убывающей в некотором промежутке, если большему значению аргумента из этого промежутка соответствует меньшее значение функции.

Функция  $y = f(x)$  называется **возрастающей** в некотором промежутке, если для любой пары значений аргументов  $x_1, x_2$  из неравенства  $x_1 < x_2$  следует неравенство  $f(x_1) < f(x_2)$ .


Функция  $y = f(x)$  называется **убывающей** в некотором промежутке, если для любой пары значений аргументов  $x_1, x_2$  из неравенства  $x_1 < x_2$  следует неравенство  $f(x_1) > f(x_2)$ .

*Если функция возрастает на всей области определения, то её называют **возрастающей функцией**, а если убывает на всей области определения – **убывающей функцией**.*

Если функция возрастает на всей области определения,  
то её называют **возрастающей функцией**,  
а если убывает на всей области определения –  
**убывающей функцией**.



**Возрастающая  
функция**



**Убывающая  
функция**

# Промежутки

## МОНОТОННОСТИ

Функция возрастает в


промежутке

Функция убывает в

промежутке

$[-5; 3]$ .

$[3; 9]$ .



# Свойства монотонных функций

Возрастающие и убывающие функции обладают определенными алгебраическими свойствами, которые могут оказаться полезными при исследовании функций.

1. Если функции  $f$  и  $g$  возрастают (убывают) на интервале  $(a,b)$ , то **сумма функций  $f+g$**  также возрастает (убывает) на этом интервале.
2. Если функция  $f$  возрастает (убывает) на интервале  $(a,b)$ , то **противоположная функция  $-f$**  убывает (возрастает) на этом интервале.
3. Если функция  $f$  возрастает (убывает) на интервале  $(a,b)$ , то **обратная функция  $1/f$**  убывает (возрастает) на этом интервале.
4. Если функции  $f$  и  $g$  возрастают (убывают) на интервале  $(a,b)$  и, кроме того,  $f \geq 0$ ,  $g \geq 0$ , то **произведение функций  $fg$**  также возрастает (убывает) на этом интервале.
5. Если функция  $g$  возрастает (убывает) на интервале  $(a,b)$ , а функция  $f$  возрастает (убывает) на интервале  $(c,d)$ , где  $g:(a,b) \rightarrow (c,d)$ , то **композиция функций  $f \circ g$**  (т. е. **сложная функция  $y=f(g(x))$** ) также возрастает (убывает) на интервале  $(a,b)$ .


# Линейная функция

**Линейной функцией** называется функция вида

$$y = kx + b$$



где  $k$  и  $b$  – заданные числа

**Графиком линейной функции является прямая**




**Линейная функция обращается в нуль при**

$$x = -\frac{b}{k}$$



$$\begin{aligned}y &= 0; \\ kx + b &= 0; \\ kx &= -b; \\ x &= -b/k\end{aligned}$$

# Промежутки знакопостоянства линейной функции



При  $k > 0$  функция принимает отрицательные значения в промежутке  $\left(-\infty; -\frac{b}{k}\right)$  и положительные значения в промежутке  $\left(-\frac{b}{k}; +\infty\right)$ .

$$k > 0; y < 0;$$

$$kx + b < 0;$$

$$kx < -b;$$

$$x < -b/k$$


$$k > 0; y > 0;$$

$$kx + b > 0;$$

$$kx > -b;$$

$$x > -b/k$$

# Промежутки знакопостоянства линейной функции




При  $k < 0$  функция принимает отрицательные значения в промежутке  $\left(-\frac{b}{k}; +\infty\right)$  и положительные значения в промежутке  $\left(-\infty; -\frac{b}{k}\right)$ .

$$\begin{aligned} k < 0; y < 0; \\ kx + b < 0; \\ kx < -b; \\ x > -b/k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k < 0; y > 0; \\ kx + b > 0; \\ kx > -b; \\ x < -b/k \end{aligned}$$

# Промежутки монотонности линейной




При  $k > 0$  функция  $y = kx + b$  является

**возрастающей**

При  $k < 0$  функция  $y = kx + b$  является

**убывающей**



Докажем это. Пусть  $x_1$  и  $x_2$  — произвольные значения аргумента, причём  $x_2 > x_1$ . Обозначим через  $y_1$  и  $y_2$  соответствующие им значения функции:

$$y_1 = kx_1 + b \text{ и } y_2 = kx_2 + b.$$

Рассмотрим разность  $y_2 - y_1$ :

$$y_2 - y_1 = (kx_2 + b) - (kx_1 + b) = kx_2 - kx_1 = k(x_2 - x_1).$$

Множитель  $x_2 - x_1$  положителен, так как  $x_2 > x_1$ . Поэтому знак произведения  $k(x_2 - x_1)$  определяется знаком коэффициента  $k$ .


Если  $k > 0$ , то  $k(x_2 - x_1) > 0$  и  $y_2 > y_1$ . Значит, при  $k > 0$  функция  $y = kx + b$  является возрастающей.

Если  $k < 0$ , то  $k(x_2 - x_1) < 0$  и  $y_2 < y_1$ . Значит, при  $k < 0$  функция  $y = kx + b$  является убывающей.

# ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ

$$y = kx + b$$

график – прямая






$$k = 0$$




$$k > 0$$

$$k < 0$$




$$b = 0$$



$$b > 0$$



$$b < 0$$




**Функция**


$$y = \frac{k}{x} \quad k \neq 0$$

**ООФ:  $x \neq 0$**



**Функция  $y = \frac{k}{x}$  нулей не имеет.**

Функция  $y = \frac{k}{x}$  при  $k > 0$  принимает отрицательные значения в промежутке  $(-\infty; 0)$  и положительные значения в промежутке  $(0; +\infty)$ .





Функция  $y = \frac{k}{x}$  при  $k < 0$  принимает отрицательные значения в промежутке  $(0; +\infty)$  и положительные значения в промежутке  $(-\infty; 0)$ .



При  $k > 0$  функция  $y = \frac{k}{x}$  является убывающей в каждом из промежутков  $(-\infty; 0)$  и  $(0; +\infty)$ . При  $k < 0$  функция  $y = \frac{k}{x}$  является возрастающей в каждом из этих промежутков

Заметим, что, хотя функция  $y = \frac{k}{x}$ , где  $k \neq 0$ , убывает (или возрастает) в каждом из промежутков  $(-\infty; 0)$  и  $(0; +\infty)$ , она не является убывающей (возрастающей) функцией на всей области определения.


## Функция

$$y = |x|$$

$$y = |x| =$$

$x$ , если  $x \geq 0$

$-x$ , если  $x < 0$



## Свойства:

- $y=0$  при  $x=0$
- $y>0$  при  $x>0$
- $y<0$  при  $x < 0$
- Возрастает при  $x \geq 0$
- Убывает при  $x \leq 0$

# Самое

## главное

Значения аргумента, при которых функция обращается в нуль, называются **нулями функции**.

Промежутки в которых функция сохраняет знак, называются **промежутками знакопостоянства**.

**Промежутки монотонности** – это промежутки возрастания и убывания функции.

Функция  $y = f(x)$  называется **возрастающей в некотором промежутке**, если для любой пары значений аргументов  $x_1, x_2$  из неравенства  $x_1 < x_2$  следует неравенство  $f(x_1) < f(x_2)$ .

Функция  $y = f(x)$  называется **убывающей** в некотором промежутке, если для любой пары значений аргументов  $x_1, x_2$  из неравенства  $x_1 < x_2$  следует неравенство  $f(x_1) > f(x_2)$ .

Если функция возрастает на всей области определения, то её называют **возрастающей функцией**, а если убывает на всей области определения – **убывающей функцией**.

**При исследовании функции** необходимо указать: ООФ, ОЗФ, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности