

ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ, СВОДЯЩИЕСЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОРНЕЙ КВАДРАТНОГО ТРЕХЧЛЕНА

(в помощь учителям математики,
работающим в выпускных классах)

**Косенко
Наталья
Михайловна
учитель математики**



*На свете ни единому уму,
Имевшему учительскую
прыть,
Глаза не удалось открыть
тому,
Кто сам не собирался их
открыть.*

И. Губерман



**Задачи с параметрами, традиционно
включаются в варианты письменных
экзаменов по математике.**

**К сожалению, решению задач с
параметрами в школьной программе
отведено очень мало времени, поэтому
практика показывает, что решение
задач данного вида вызывает у
выпускников большие затруднения.**



АНАЛИЗ ЗАДАЧ С

ПАРАМЕТРАМИ

Анализируя задачи с параметрами, которые предлагаются в тестах ЕГЭ, можно увидеть, что большинство уравнений можно свести к квадратным, корни которых находятся на ограниченном множестве переменной величины. Ограничения возникают в области определения и области значений функций, входящих в уравнение (логарифмические, показательные, иррациональные, модульные).



Рассмотрение класса задач, связанных с исследованием корней квадратного трёхчлена, позволяет решить следующие задачи:

- ▣ стимулировать более глубокое изучение темы «Квадратный трёхчлен»;*
- ▣ развивать у школьников навыки аналитического мышления;*
- ▣ обеспечить необходимый тренинг при подготовке к экзамену по математике.*



КАК РЕШАТЬ?

Решение в «лоб»
(подстановка корней уравнения на множество ограничений)

Применение косвенных приемов
(теоремы Виета, теорем о расположении корней квадратного уравнения, графических методов)

Первый путь применяется для корней линейного уравнения.

Второй путь при решении квадратных уравнений. Он проще и более универсален.



***ТЕОРЕМЫ О
РАСПОЛОЖЕНИИ
КОРНЕЙ
КВАДРАТНОГО
ТРЕХЧЛЕНА***



ТЕОРЕМА 1

Пусть дан трёхчлен $f(x) = ax^2 + bx + c$, где $a \neq 0$
и d -любое действительное число.

Если выполняется условие:

$$\left\{ \begin{array}{l} D = b^2 - 4ac \geq 0; \\ a \cdot f(d) > 0; \\ -\frac{b}{2a} < d. \end{array} \right.$$

то этот трёхчлен имеет два действительных корня x_1 и x_2 , которые меньше числа d



ТЕОРЕМА 2

Пусть дан трёхчлен $f(x) = ax^2 + bx + c$, где $a \neq 0$ и d -любое действительное число.

Если выполняется условие:

$$\left\{ \begin{array}{l} D = b^2 - 4ac \geq 0; \\ a \cdot f(d) > 0; \\ -\frac{b}{2a} > d. \end{array} \right.$$

то этот трёхчлен имеет два действительных корня x_1 и x_2 , которые меньше числа d



СЛЕДСТВИЕ ИЗ ТЕОРЕМЫ 1 И 2

Пусть даны два действительных числа d_1 и d_2 , где $d_1 < d_2$. Если для квадратного трёхчлена $f(x)$ из (1) выполняются условия:

$$\left\{ \begin{array}{l} D = b^2 - 4ac \geq 0, \\ a \cdot f(d_1) > 0, \\ a \cdot f(d_2) > 0, \\ d_1 < -\frac{b}{2a} < d_2, \end{array} \right.$$

то этот трёхчлен имеет два действительных корня x_1 и x_2 , принадлежащие промежутку

$$(d_1, d_2).$$



ТЕОРЕМА 3

Пусть дано некоторое действительное число d . Если для квадратного трехчлена $f(x) = ax^2 + bx + c$, где $a \neq 0$, выполняется условие $a \cdot f(d) < 0$, то он имеет два действительных корня x_1 и x_2 , расположенных на вещественной оси по разные стороны от d .

$$a \cdot f(d) < 0$$



ТЕОРЕМА 4

Пусть даны два действительных числа d_1 и d_2 , где $d_1 < d_2$.

Если для квадратного трехчлена

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \text{ где } a \neq 0,$$

выполняется условие $f(d_1) \cdot f(d_2) < 0$,

квадратный трехчлен имеет два

действительных корня x_1 и x_2 , один из

которых принадлежит промежутку

, а другой не принадлежит промежутку

$$[d_1; d_2]$$

ТЕОРЕМА 5

Пусть даны два действительных числа d_1 и d_2 , где

Если для квадратного трехчлена $f(x) = ax^2 + bx + c$, где выполняется условие $a \neq 0$,

$$\begin{cases} a \cdot f(d_1) < 0 \\ a \cdot f(d_2) < 0 \end{cases}$$

то он имеет два действительных корня x_1 и x_2 , один из которых меньше числа d_1 , а другой больше числа d_2 .

d_2



ЗАМЕЧАНИЯ

Условия теорем 1-5 являются необходимыми и достаточными условиями для исследования случаев расположения корней квадратного трёхчлена.

Данные теоремы позволяют по единой методике решать большой класс задач.



ПРИМЕР

Найти все значения параметра , при которых уравнение имеет действительные корни

$$ax^2 + (a + 3)x + 2a + 1 = 0$$

- a) меньше «5»;
- b) больше «-3»;
- c) принадлежащие промежутку $[0;3]$
- d) находящиеся на вещественной оси по разные стороны от числа «1»;
- e) один из которых принадлежит промежутку $[0;3]$ а другой не принадлежит;
- f) расположенные на вещественной оси по разные стороны от промежутка $[0;3]$.



ПРИ ПОМОЩИ ДАННЫХ УРАВНЕНИЙ МОЖНО РЕШАТЬ БОЛЬШОЙ КЛАСС ЗАДАЧ.

Пример 1

- Найти все значения параметра a , при которых уравнение
$$\square g(ax) = 2\square g(x+1)$$
- имеет единственный корень.

Пример 2

- При каких значениях параметра a , уравнение
$$\square (4^{t-1} - (a-3) \cdot 2^{t-1} + 9) \cdot \lg(5 - 2^t) = 0$$
 имеет 2 корня.

