

Тема урока:

*Геометрический*

*мысл производной.*



*Домашнее  
задание:*

*№859(5, 6),  
860(2, 4, 6, 8)*

# Геометрический смысл производной

$$k = f'(x_0) = \operatorname{tg} \alpha$$

угловым коэффициентом  
касательной

значением производной в  
точке  $x_0$


тангенсом угла наклона  
касательной к  
положительному  
направлению оси OX

На рисунке изображены график функции  $y = f(x)$  и касательная к этому графику, проведенная в точке с абсциссой  $x_0$ . Найдите значение производной функции  $y = f(x)$  в точке  $x_0$ .

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{8}{2}$$

Еще удобный треугольник...

3). Найдем тангенс угла  $-\alpha$   
 это отношение 4:1. Тангенс  
 тупого, смежного угла равен  $-4$ .



## 2 способ

В данных заданиях всегда есть удобные точки.

Этим можно воспользоваться.

**Решение:** Уравнение прямой  $y = kx + b$ .

В этом уравнении угловой коэффициент  $k$  - искомая величина.

$$f'(x_0) = k$$

$$k = \operatorname{tga}$$


$$y = kx + b$$

Подставим координаты удобных точек в уравнение прямой.

$$\begin{cases} -7 = b. & \text{---} \\ -3 = -1k + b. \end{cases}$$

$$-4 = k$$

$$k = -4$$



**Самостоятельная работа  
по материалам КИМов ЕГЭ**

## ***Вывод уравнения касательной***

- Дана функция  $y=f(x)$  непрерывная и дифференцируемая в точке  $(x_0; f(x_0))$ .
- Составим уравнение касательной к графику функции  $y=f(x)$  в точке  $(x_0; f(x_0))$ .
- Уравнение прямой (касательной) имеет вид:  $y=kx+b$  (1), где  $k$  – угловой коэффициент прямой (касательной).
- По геометрическому смыслу производной:  $k_{кас} = f'(x_0)$ , где  $x_0$  – абсцисса точки касания.

## *Вывод уравнения касательной*

- Подставим в уравнение  $y=kx+b$  (1) вместо  $k$  выражение  $k_{\text{кас}} = f'(x_0)$ .
- Получим:  $y = f'(x_0) \cdot x + b$  (2).
- Точка с координатами  $(x_0; f(x_0))$  принадлежит касательной, значит её координаты удовлетворяют уравнению касательной, то есть уравнению (2).
- Следовательно уравнение касательной (2) принимает вид:  $f(x_0) = f'(x_0) \cdot x_0 + b$  (3).

## *Вывод уравнения касательной*

- Выразим из уравнения (3) коэффициент  $b$ .
- Получим:  $b = f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0$ . Подставим это значение во (2) уравнение.
- Тогда  $y = f'(x_0) \cdot x + f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0$ .
- После преобразования уравнение принимает вид:  $y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$ .
- Это и есть **уравнение касательной** к графику функции  $y = f(x)$  в точке  $(x_0; f(x_0))$ .

# Уравнение касательной

$$y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

угловой коэффициент касательной  
(значение производной в точке  $x_0$ , тангенс  
угла наклона касательной к оси абсцисс)

ордината точки касания  
значение функции  $y=f(x)$  в  
точке  $x_0$ )

абсцисса точки касания

# Алгоритм составления уравнения касательной

1. Запишите уравнение касательной к графику функции  $y=f(x)$  в точке  $(x_0, f(x_0))$  абсциссой  $x_0$  в общем виде.  $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$
2. Найдите производную функции  $y=f(x)$
3. Вычислите значение производной  $y_0 = f'(x_0)$
4. Вычислите значение функции в точке  $x_0$   $y_0 = f(x_0)$
5. Подставьте найденные значения в уравнение касательной

*Составить уравнение касательной к графику функции  $y=f(x)$  в точке  $x_0$ .*

$$y=\ln^2 x, x_0=e.$$

$$y=f'(x_0) \cdot (x-x_0) + f(x_0)$$

$$f(x_0)=f(e)=\ln^2 e=1$$

$$f'(x)=2\ln x \cdot x^{-1}$$

$$f'(x_0)=f'(e)=2\ln e \cdot e^{-1} = 2e^{-1}$$

*Подставим в уравнение касательной:*

$$y=2e^{-1} \cdot (x-e) + 1$$

$$y=2e^{-1} \cdot x - 1$$

*Составить уравнение касательной к графику функции  $y=f(x)$  в точке графика с ординатой  $y_0$ .*

$$y = \frac{3-x}{x+1}, \quad y_0=1. \quad y = f'(x_0) \cdot (x-x_0) + f(x_0)$$

$$y = \frac{3-x_0}{x_0+1} = 1 \Rightarrow x_0 = 1$$

$$f'(x) = \frac{-4}{(x+1)^2}$$

$$f'(x_0) = f'(1) = 1$$

Подставим в уравнение касательной:

$$y = -1 \cdot (x-1) + 1$$

$$y = -x + 2$$

*Составить уравнение касательной к графику функции  $y=f(x)$ , образующей с осью  $Ox$  угол  $\alpha$ .*

$$y = \frac{x-3}{x-2}, \alpha = 45^\circ \quad y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

$$f'(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} 45^\circ = 1 = f'(x_0)$$

$$\frac{1}{(x_0 - 1)^2} = 1 \Rightarrow x_0 = 1; 3$$

Подставим в уравнение касательной и получим:

$$y = x - 3, \quad y = x + 1$$

*Составить уравнение касательной к графику функции  $y=f(x)$ , параллельной прямой  $y=kx+b$ .*

$$y = e^{2x-1}, y=2x+7$$

$$f'(x) = 2e^{2x-1} \quad y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

$$k_{\text{кас}} = 2 = f'(x_0)$$

$$2e^{2x-1} = 2,$$

$$\text{то есть } x_0 = 0,5$$

Подставим в уравнение касательной и получим:

$$y = 2x$$

*Решаем в классе:*

*№ 860 (чет.)*

*В презентации использованы материалы сайта  
<http://le-savchen.ucoz.ru>*