


Степенная



функция



Работу выполнила
Травкина Анжела, ученица 10 класса
МОУ «Средняя школа №50 города Макеевки»

Степенная функция


Степенная функция – это функция вида $y=x^n$, где n - заданное действительное число.

Частные случаи степенной функции

$$y=x^2$$



Парабола

парабола



$$y=x^3$$


Кубическая



$$y=$$


Гипербола

$$\frac{1}{x}$$



Степенная функция с натуральным показателем

Первый случай: $n = 2k, k \in \mathbb{N}$



n – четное натуральное число

1. Область определения: \mathbb{R}

2. Область значения: $[0; +\infty]$


3. Нули функции: $x=0$

**4. Промежутки знакопостоянства:
 $y > 0$ на каждом из промежутков $(-\infty; 0)$ и $(0; +\infty)$**

5. Четность: функция четная

6. Возрастание/убывание: функция убывает на промежутке $(-\infty; 0]$, возрастает на промежутке $[0; +\infty)$

Второй случай: $n=2k+1$, $k \in \mathbb{N}$



n – нечетное натуральное число

1. Область определения: \mathbb{R}

2. Область значения: \mathbb{R}

3. Нули функции: $x=0$

4. Промежутки знакопостоянства:
 $y < 0$ на промежутке $(-\infty; 0)$, $y > 0$ на
промежутке $(0; +\infty)$

5. Четность: функция нечетная

6. Возрастание/убывание: функция
возрастающая

Степенная функция с целым показателем

n – четное отрицательное число

1. Область определения: $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$

2. Область значения: $(0; +\infty)$

3. Нули функции: –

4. Промежутки знакопостоянства:


$y > 0$ на каждом из промежутков $(-\infty; 0)$ и $(0; +\infty)$

5. Четность: функция четная

6. Возрастание/убывание: функция

возрастает на промежутке $(-\infty; 0)$, убывает на промежутке $(0; +\infty)$

Первый случай $n = -2k$, $k \in \mathbb{N}$.



n – нечетное отрицательное число

Второй случай: $n = -(2k+1)$, $k \in \mathbb{N}$

1. Область определения: $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$

2. Область значения: $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$

3. Нули функции: –


4. Промежутки знакопостоянства:

$y < 0$ на промежутке $(-\infty; 0)$, $y > 0$ на промежутке $(0; +\infty)$

5. Четность: функция нечетная

6. Возрастание/убывание: функция

убывает на каждом из промежутков $(-\infty; 0)$ и $(0; +\infty)$



Функция $y = \sqrt[n]{x}$

n – нечетное натуральное число, $n > 1$

1. Область определения: \mathbb{R}

2. Область значения: \mathbb{R}

3. Нули функции: $x=0$

4. Промежутки знакопостоянства:


$y < 0$ на промежутке $(-\infty; 0)$,

$y > 0$ на промежутке $(0; +\infty)$

5. Четность: функция нечетная

6. Возрастание/убывание: функция

возрастающая



Функция $y = \sqrt[n]{x}$

n – четное натуральное число

1. Область определения: $[0; +\infty]$


2. Область значения: $[0; +\infty]$

3. Нули функции: $x=0$

4. Промежутки знакопостоянства:
 $y > 0$ на промежутке $(0; +\infty)$

5. Четность: функция ни четная, ни нечетная

6. Возрастание/убывание: функция
возрастающая




Степень с рациональным показателем

Определение: Степенью положительного числа a с рациональным показателем r , поданным в виде $\frac{m}{n}$, где $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, называют число $\sqrt[n]{a^m}$, то есть

$$a^r = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Функцию, которую можно задать формулой $y=x^r$, $r \in \mathbb{Q}$, называют степенной функцией с рациональным показателем.



изображены

$$y = x^{\frac{1}{2}}, y = x^{\frac{1}{3}}, y = x^{\frac{1}{4}}$$


Степень с отрицательным дробным показателем

Рассмотрим функцию $y = x^{-r}$, где r – положительная несократимая дробь.

Свойства этой функции:

- 1) Область определения $(0; +\infty)$.
- 2) Функция ни четная, ни нечетная.
- 3) Функция $y = x^{-r}$ убывает на $(0; +\infty)$

$$y = x^{-\frac{1}{4}}, y = x^{-\frac{1}{8}}, y = x^{-\frac{5}{6}}$$



Свойства степени с рациональным показателем

1. Произведение степеней. Для любого $a > 0$ и любых рациональных чисел p и q выполняется равенство:

$$a^p \times a^q = a^{p+q}$$

Следствие. Для любого $a > 0$ и любого рационального числа p выполняется равенство

$$a^{-p} = \frac{1}{a^p}$$

2. Частное степеней. Для любого $a > 0$ и любых рациональных чисел p и q выполняется равенство:

$$a^p \div a^q = a^{p-q}$$

3. **Степень степени.** Для любого $a > 0$ и любых рациональных чисел p и q выполняется равенство:

$$(a^p)^q = a^{pq}$$


4. **Степень произведения и степень дроби.** Для любого $a > 0$ и $b > 0$ и любого рационального числа p выполняются равенства

$$(ab)^p = a^p b^p$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p}$$




Корень n -ой степени



Определение: Корнем n -ой степени из числа a , где $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, называют такое число, n -ая степень которого равна a .

Примечание:

- если n – четное натуральное число, то при $a < 0$ корень n -ой степени из числа a не существует; при $a = 0$ корень n -ой степени из числа a равен 0; при $a > 0$ существуют два противоположные числа, которые являются корнями n -ой степени из числа a .
- если n – нечетное натуральное число, больше 1, то корень n -ой степени из любого числа существует, при чем только один.



Арифметический корень n-ой степени

Определение: Арифметическим корнем n –ой степени из неотрицательного числа a , где $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, называют такое неотрицательное число, n –ая степень которого равна a .

Примечание:

Для любого неотрицательного числа

a имеет место следующее: $\sqrt[n]{a} \geq 0$

выполняется равенство

$$(\sqrt[n]{a})^n = a$$



Свойства корня n-ой степени


1. Корень из степени. Для любого $a \in R$ и $k \in N$ выполняются равенства:

$$\sqrt[2k+1]{a^{2k+1}} = a$$

$$\sqrt[2k]{a^{2k}} = |a|$$

2. Корень из произведения. Если $a \geq 0$ и $b \geq 0$, $n \in N$, $n > 1$, то

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$



3. Корень из дроби. Если $a \geq 0$ и $b > 0$, $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, то

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

4. Степень корня. Если $a \geq 0$, $n \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N}$, $n > 1$, то


$$\sqrt[n]{a^k} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^k$$

5. Корень из корня. Если $a \geq 0$, $n \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N}$, $n > 1$, $k > 1$ то

$$\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$$

6. Если $a \geq 0$, $n \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N}$, $n > 1$, то

$$\sqrt[n \cdot k]{a^k} = \sqrt[n]{a}$$



Примеры:

1. Найдем значение выражения $\sqrt[3]{64 \cdot 8}$


$$\sqrt[3]{64 \cdot 8} = \sqrt[3]{64} \cdot \sqrt[3]{8} = 4 \cdot 2 = 8$$

2. Найдем значение выражения $\sqrt[4]{81 \cdot 256}$

$$\sqrt[4]{81 \cdot 256} = \sqrt[4]{81} \cdot \sqrt[4]{256} = 3 \cdot 4 = 12$$

3. Найдем значение выражения $\sqrt[4]{16 \cdot 81}$

$$\sqrt[4]{16 \cdot 81} = \sqrt[4]{16} \cdot \sqrt[4]{81} = 2 \cdot 3 = 6$$



Примеры:

1. Упростим выражение: $\sqrt{\sqrt[3]{6}}$


$$\sqrt{\sqrt[3]{6}} = \sqrt[2 \cdot 3]{6} = \sqrt[6]{6}$$

2. Упростим выражение: $\sqrt[3]{\sqrt{2}}$

$$\sqrt[3]{\sqrt{2}} = \sqrt[3 \cdot 2]{2} = \sqrt[6]{2}$$

3. Упростим выражение: $\sqrt[4]{\sqrt[3]{3}}$

$$\sqrt[4]{\sqrt[3]{3}} = \sqrt[4 \cdot 3]{3} = \sqrt[12]{3}$$




Примеры:

1. Упростим выражение: $\sqrt[4]{\frac{81}{625}}$

$$\sqrt[4]{\frac{81}{625}} = \frac{\sqrt[4]{81}}{\sqrt[4]{625}} = \frac{3}{5}$$

2. Упростим выражение: $\sqrt[3]{2\frac{10}{27}}$

$$\sqrt[3]{2\frac{10}{27}} = \sqrt[3]{\frac{64}{27}} = \frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$$




Примеры:

1. Упростим выражение: $\sqrt[3]{2 \cdot \sqrt{2}}$

$$\sqrt[3]{2 \cdot \sqrt{2}} = \sqrt[3]{\sqrt{2^2} \cdot 2} = \sqrt[3]{\sqrt{2^3}} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt{2}$$

2. Упростим выражение: $\sqrt[6]{7^4}$

$$\sqrt[6]{7^4} = \sqrt[3]{\sqrt{7^4}} = \sqrt[3]{7^2} = \sqrt[3]{49}$$



**Картинки для презентации
взяты из открытых источников
Интернета**