



МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Выполнил работу:

учитель математики

Киричевский Алексей

Ростиславович

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уравнения занимают значительное место в курсе математики средней школы. Остановимся лишь на алгебраических уравнениях, которые разобьем на три группы:

- 1) полиномиальные уравнения вида $P_n(x) = 0$, где $P_n(x)$ — многочлен n -й степени относительно x ;
- 2) дробно-рациональные уравнения, т.е. содержащие в качестве двух компонент частные двух многочленов;
- 3) иррациональные уравнения.

Для ряда приемов даны небольшие теоретические обоснования. Приведено 30 приемов, иллюстрированных более чем 36 примерами. Не надо думать, что приведенный в конкретном примере прием является наиболее рациональным для решения данного примера. Просто надо принять к сведению существование такого подхода к решению уравнений.

Одни и те же подходы (применение тригонометрии, использование однородности, разложение на множители и др.) находят применение не только при решении рациональных, дробно-рациональных, иррациональных уравнений, но и при решении трансцендентных уравнений, неравенств, систем.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

- Под алгебраическим уравнением принято понимать уравнение, которое может быть записано в виде $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$, где a_n, a_{n-1}, \dots, a_0 – заданные числа, x – неизвестное. n – наибольшую степень неизвестного – называют степенью алгебраического уравнения.

ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Даже если вы не решали и такой пример, например:

Дано: $2x + 1 = 11$. Найти x .

Давайте рассмотрим линейное уравнение $ax + b = c$, где a и b — любые числа, а c — любое число.

Сначала уравнение обрело вид $2x = 10$. В общем виде, вам повезло, все, что необходимо

сделать, это разделить обе части уравнения на a . В нашем случае $2x = 10$ превратилось в $x = 5$.

Вывод: если $a \neq 0$, то уравнение имеет единственное решение $x = \frac{c-b}{a}$.

Если же $a = 0$, то уравнение имеет бесконечное множество решений.

Теперь выполняем перенос: $2x = 10 - 1$. Здесь $10 - 1 = 9$, так что $2x = 9$.

Вот и все — решение найдено! Осталось найти решение по уже известной схеме.

Узнали? Самое что ни на есть линейное уравнение. Решение которого:

В каком случае уравнение $ax + b = c$ имеет нулевые значения, уравнение предстоит решить,

чтобы вывести конечное выражения для переменной.

КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ

- Например, при решении квадратного уравнения $4x^2 - 9 = 0$ можно использовать квадратный формульный метод. Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$.

решить квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ (где $a \neq 0$) можно с помощью формулы Виета. Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$. Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$. Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$.

Важно другое: по знаку дискриминанта D можно определить, сколько корней имеет квадратное уравнение. Дискриминант $D = b^2 - 4ac$. Если $D > 0$, то уравнение имеет два корня; если $D = 0$, то один корень; если $D < 0$, то корней нет.

Если $D > 0$, то можно использовать любую из этих формул — получится одно и то же число.

Правила решения квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ (где $a \neq 0$) можно использовать формулу Виета, если $D \geq 0$. Если $D < 0$, то корней нет; если $D = 0$, то один корень; если $D > 0$, то два корня.

Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$. Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$.

А уравнение $4x^2 - 9 = 0$ можно решить по формуле Виета. Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$.

Для квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ (где $a \neq 0$) можно использовать формулу Виета. Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$.

Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$. Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$.

Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$. Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$.

Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$. Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$.

Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$. Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$.

Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$. Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$.

Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$. Если же уравнение решается по формуле Виета, то $4x^2 - 9 = 0$, где $a=4$, $b=0$, $c=-9$.

$$4x^2 - 9 = 0 \Rightarrow 4x^2 = 9 \Rightarrow x^2 = 9/4 \Rightarrow x_1 = 3/2 = 1,5; x_2 = -1,5.$$

ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

- Приближаем уравнение типа $\frac{x^2 - 2x - 6}{x^2 - 2x - 3} = \frac{x - 6}{x - 2}$ к обыкновенному уравнению, если числитель дроби равен нулю, а знаменатель отличен от нуля, перемножив уравнение равносильно системе:

Переносим все слагаемые в одну сторону и приводим дроби к наименьшему общему знаменателю:

$$x^2 - 2x - 6 \neq 0 \quad \frac{x^2 - 2x - 6}{x^2 - 2x - 3} = \frac{x - 6}{x - 2} \Rightarrow x^2 - 2x - 6(x - 2) = (x - 6)(x - 2)$$

где переносим все слагаемые в одну часть уравнения и приводим дроби к наименьшему общему знаменателю (то есть x в таких уравнениях в знаменателе есть переменная), и исключаем их из области допустимых значений:

В общем виде дробно-рациональные уравнения решают по следующей схеме:

$$\frac{4}{x^2 - 2} = \frac{3}{x^2 - 4} + \frac{2}{x^2 - 4} \Rightarrow \frac{4}{x^2 - 2} - \frac{3}{x^2 - 4} - \frac{2}{x^2 - 4} = 0$$

1) Все слагаемые переносим в одну сторону:

$$4(x^2 - 4) - 3(x^2 - 2) - 2(x^2 - 4) = 0$$

2) Дроби приводим к НОЗ (наименьшему общему знаменателю).

Теперь находим значения переменных, при которых числитель обращается в нуль:

Значение переменной, при котором знаменатель обращается в нуль, исключаем из ОДЗ:

$x \neq 3$.

$$-x^2 - 2x + 8 + 30 = 0 \Rightarrow -x^2 - 2x + 38 = 0$$

Уравнение в случаях дробно-рациональных уравнений решаем тем же способом, что и обыкновенное уравнение. Если левая часть уравнения равна нулю, а знаменатель не равен нулю, то уравнение равносильно уравнению $ax^2 + bx + c = 0$. Если же знаменатель равен нулю, а числитель не равен нулю, то уравнение не имеет решений. Если же и числитель, и знаменатель равны нулю, то уравнение равносильно уравнению $ax^2 + bx + c = 0$. Если же и числитель, и знаменатель равны нулю, то уравнение равносильно уравнению $ax^2 + bx + c = 0$.

Напомним с рассмотрения примеров общего случая.

Оба корня удовлетворяют условиям $x \neq 2, x \neq -4$. Ответ: 5; -6.

Ответ: x – любое число, кроме 3.

МЕТОД ГРУППИРОВКИ

$$2) a^2x + a^2y + a^2b^2 + a^2b^2 = b - b^3 =$$

Способы группировки: первое слагаемое со вторым, второе с третьим, четвертое с пятым и шестым. Группируем первое слагаемое со вторым, третье – с четвертым: между скобками всегда ставим знак «+».

Объединение членов многочлена в группы, имеющие общий множитель, и вынесение из каждой группы общего множителя (в одной из групп общего множителя может не быть). Выносим общий множитель (а²х) из второй группы скобок, все оставшееся выносим за скобки: $a^2(x + 7) + b^2(a - 3) = a^2(x + 7) + b^2(a - 3)$.

Общий множитель (4 - у) выносим за скобки: $(4 - y)(x + 7)(a - 3)$.

Общим множителем группировать скобки не удается. Например, первое – с четвертым, второе – с пятым, третье – с шестым:

2) Вынесение полученного общего для всех групп множителя за скобки.

$$= a^2(x + 7) + b^2(a - 3)$$

Общий множитель (4 - у) выносим за скобки:

Общим множителем группировать скобки не удается. Например, первое – с четвертым, второе – с пятым, третье – с шестым:

$$= (4 - y)(x + 7)(a - 3)$$

В группировке скобок слагаемых первое слагаемое с пятым, второе с третьим, четвертое с шестым, равно столько же должно остаться в скобках. Если общий множитель совпадает с скобками скобок, то общий множитель выносим за скобки, в скобках общего множителя нет, после вынесения общего множителя за скобки остается единица (+1 или -1).

Общий множитель (а - 3) выносим за скобки: $(a - b) + b^2(a - b) =$

Общий множитель (а - b) выносим за скобки. Не забываем поставить единицу на место

(при b) любом способе группировки ответ получается одинаковый (от перестановки мест множителей произведение не меняется). $= (a - b)(a^2 + 1 + b^2)$.

МЕТОД ПОДСТАНОВКИ

- Ищем в уравнении некоторое повторяющееся выражение, которое обозначим новой переменной, тем самым упрощая вид уравнения. В некоторых случаях очевидно что удобно переписать уравнение иначе, а именно обозначить.

$(x^2 + 2x)^2 - (x + 2x + 1) = 55$, сразу увидим подстановку $x + 2x = t$. Имеем $t^2 - t - 56 = 0$, $t_1 = -7, t_2 = 8$. Осталось решить $x^2 + 2x = -7$ и $x^2 + 2x = 8$. В результате получаем, что первое уравнение не имеет корней, а у второго $x = 0$. Далее решаем его как дробно-рациональное уравнение: $\frac{x^2 + x - 5}{x} = t$ получаем $t^2 + 4t + 3 = 0$. Далее решаем его как дробно-

рациональное уравнение: $\frac{t^2 + 4t + 3}{t} = 0$;

$$t^2 + 4t + 3 = 0 \text{ и } t \neq 0; t_1 = -3, t_2 = -1.$$

$$\text{Тогда } \frac{x^2 + x - 5}{x} = -3 \text{ и } \frac{x^2 + x - 5}{x} = -1.$$

Решаем получившиеся уравнения:

$$\frac{x^2 + x - 5 + 3x}{x} = 0,$$

$$x^2 + 4x - 5 = 0,$$

$$x_1 = -5, x_2 = 1; x \neq 0.$$

$$\text{Ответ: } -5; 1; -1 \pm \sqrt{6}.$$

$$\frac{x^2 + x - 5 + x}{x} = 0$$

$$x^2 + 2x - 5 = 0$$

$$x_3 = -1 - \sqrt{6}, x_4 = -1 + \sqrt{6}; x \neq 0$$

В более сложных случаях подстановка видна лишь после преобразований.

МЕТОД ПОДБОРА

- При решении уравнений высших степеней рациональные корни уравнения

$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ ищем в виде $\frac{p}{q}$, где p – делитель a_0 , q – делитель a_n ,

p и q взаимно просты, $p \in Z, q \in N$.

Решить уравнение $x^3 - x^2 - 8x + 6 = 0$.

Решение. Здесь $a_n = 1, a_0 = 6$. Поэтому, если данное уравнение имеет рациональные корни, то их следует искать среди делителей числа 6: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Проверкой убеждаемся, что $x = 3$, т.к. $27 - 9 - 24 + 6 = 0$. Делим $x^3 - x^2 - 8x + 6$ на $x - 3$, получаем $x^2 + 2x - 2$. Тогда данное уравнение можно представить в виде $(x - 3)(x^2 + 2x - 2) = 0$. Отсюда находим, что $x_1 = 3$ – решение, найденное подбором,


$x_{2,3} = -1 \pm \sqrt{3}$ – из уравнения $x^2 + 2x - 2 = 0$.

Ответ: $3; -1 \pm \sqrt{3}$.

УРАВНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ МОДУЛЬ

- При решении уравнений с модулем используется определение модуля и метод интервалов.
Задача. Решить уравнение $|1 - 2x| + |3x + 2| + |x| = 5$.

Решение. Приравниваем к нулю выражения, стоящие под знаком модуля, отмечаем на числовой оси полученные значения, исследуем уравнение в каждом из полученных интервалов:



- a) если $x \in (-\infty; -\frac{2}{3})$, то $1 - 2x > 0, 3x + 2 < 0, x < 0$ и уравнение переписывается так:
 $1 - 2x - 3x - 2 - x = 5$, т.е. $-6x = 6, x = -1 \in (-\infty; -\frac{2}{3})$.
- b) Если $x \in [-\frac{2}{3}; 0)$, то $1 - 2x > 0, 3x + 2 \leq 0, x < 0$ и поэтому имеем $1 - 2x + 3x + 2 - x = 5$, и т.к. $3 \neq 5$, то в промежутке $[-\frac{2}{3}; 0)$ корней нет;
- c) если $x \in [0; \frac{1}{2})$, то получаем $1 - 2x + 3x + 2 + x = 5$, т.е. $2x = 2, x = 1 \notin [0; \frac{1}{2})$;
- d) Если $x \in [\frac{1}{2}; \infty)$, то $-1 + 2x + 3x + 2 + x = 5, 6x = 4, x = \frac{2}{3} \in [\frac{1}{2}; \infty)$.

Ответ: $-1; \frac{2}{3}$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сколько различных методов присутствуют в математике. И все они по-своему уникальны. Для каждого уравнения можно подобрать несколько методов, но в основном, чтобы он не нарушал целостности условия.

Но самое главное – это видеть какой метод стоит применять. А для этого нужно знать их все.

The image features a dark blue gradient background with white decorative circuit-like lines in the corners. The text is centered and reads:

БЛАГОДАРЮ

ЗА

ВНИМАНИЕ