Равносильность уравнений

<u>Определение 1.</u> Два уравнения с одной переменной f(x) = g(x) и p(x) = h(x) называют равносильными, если множества их корней совпадают.

Например, уравнения $x^2 - 4 = 0$ и $(x + 2)(2^x - 4) = 0$ равносильны, оба они имеют по два корня: 2 и -2. Равносильны и уравнения $x^2 + 1 = 0$ и $\sqrt{x} = -3$, поскольку оба они не имеют корней.

Два уравнения равносильны тогда и только тогда, когда каждое из них является следствием другого.

Этапы решения уравнения

Первый этап — mехнический. На этом этапе осуществляют преобразования по схеме $(1) \to (2) \to (3) \to (4) \to ...$ и находят корни последнего (самого простого) уравнения указанной цепочки.

<u>Второй этап</u> — *анализ решения*. На этом этапе, анализируя проведённые преобразования, отвечают на вопрос, все ли они были равносильными.

<u>Третий этап</u> — *проверка*. Если анализ, проведённый на втором этапе, показывает, что некоторые преобразования могли привести к уравнению-следствию, то обязательна проверка всех найденных корней их подстановкой в исходное уравнение.

Теоремы о равносильности уравнений

Теорема 1. Если какой-либо член уравнения перенести из одной части уравнения в другую с противоположным знаком, то получится уравнение, равносильное данному.

Теорема 2. Если обе части уравнения возвести в одну и ту же нечётную степень, то получится уравнение, равносильное данному.

Теорема 3. Показательное уравнение $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ (где a > 0, $a \neq 1$) равносильно уравнению f(x) = g(x).

Определение 3. Областью определения уравнения f(x) = g(x) или областью допустимых значений переменной (ОДЗ) называют множество тех значений переменной x, при которых одновременно имеют смысл выражения f(x) и g(x).

Теорема 4. Если обе части уравнения f(x) = g(x) умножить на одно и то же выражение h(x), которое:

- а) имеет смысл всюду в области определения (в области допустимых значений) уравнения f(x) = g(x);
- б) нигде в этой области не обращается в 0, то получится уравнение f(x)h(x) = g(x)h(x), равносильное данному в его OJ3.

Следствием теоремы 4 является ещё одно «спокойное» утверждение: если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же отличное от нуля число, то получится уравнение, равносильное данному.

Теорема 5. Если обе части уравнения f(x) = g(x) неотрицательны в ОДЗ уравнения, то после возведения обеих его частей в одну и ту же чётную степень п получится уравнение $(f(x))^n = (g(x))^n$, равносильное данному в его ОДЗ.

Теорема 6. Пусть a > 0 и $a \ne 1$, X — решение системы неравенств $\begin{cases} f(x) > 0, \\ g(x) > 0. \end{cases}$ Тогда уравнение $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ равносильно на множестве X уравнению f(x) = g(x).

Перечислим наиболее часто встречающиеся причины расширения области определения уравнения.

- 1. Освобождение в процессе решения уравнения от знаменателей, содержащих переменную величину.
- 2. Освобождение в процессе решения уравнения от знаков корней чётной степени.
- 3. Освобождение в процессе решения уравнения от знаков логарифмов.

Подведём итоги. Исходное уравнение преобразуется в процессе решения в уравнение-следствие, а значит, обязательна проверка всех найденных корней, если:

- 1) произошло расширение области определения уравнения;
- 2) осуществлялось возведение обеих частей уравнения в одну и ту же чётную степень;
- 3) выполнялось умножение обеих частей уравнения на одно и то же выражение с переменной (разумеется, имеющее смысл во всей области определения уравнения).

Пример 1. Решить уравнение $\sqrt{2x+5} + \sqrt{5x-6} = 5$.

Решение. Первый этап — технический. На этом этапе, как мы отмечали выше, осуществляют преобразования заданного уравнения по схеме $(1) \to (2) \to (3) \to (4) \to \dots$ и находят корни последнего (самого простого) уравнения указанной цепочки.

<u>Третий этап</u> — *проверка*. Подставим поочерёдно каждое из найденных значений переменной в исходное уравнение.

Если x=2, то получаем $\sqrt{2\cdot 2+5}+\sqrt{5\cdot 2-6}=5$, т. е. 3+2=5 — верное равенство.

Если
$$x = 44\frac{2}{9}$$
, то получаем $\sqrt{2 \cdot 44\frac{2}{9} + 5} + \sqrt{5 \cdot 44\frac{2}{9} - 6} = 5$.

Пример 2. Решить уравнение

$$\ln(x+4) + \ln(2x+3) = \ln(1-2x).$$

Решение. <u>Первый этап</u>. Воспользуемся правилом «сумма логарифмов равна логарифму произведения». Оно позволяет заменить выражение $\ln(x+4) + \ln(2x+3)$ выражением $\ln(x+4)(2x+3)$. Тогда заданное уравнение можно переписать в виде:

<u>Третий этап</u>. Поскольку, кроме расширения ОДЗ уравнения, никаких других неравносильных преобразований в процессе решения уравнения не было, проверку можно выполнить по ОДЗ исходного уравнения. Она задаётся системой неравенств

$$\begin{cases} x + 4 > 0, \\ 2x + 3 > 0, \\ 1 - 2x > 0. \end{cases}$$

Пример 4. Решить уравнение $\log_{x+4}(x^2-1) = \log_{x+4}(5-x)$.

Решение. Потенцируя, получаем:

$$x^{2} - 1 = 5 - x;$$

 $x^{2} + x - 6 = 0;$
 $x_{1} = 2, x_{2} = -3.$

Для проверки выпишем условия, задающие ОДЗ:

$$\begin{cases} x + 4 > 0, \\ x + 4 \neq 1, \\ x^2 - 1 > 0, \\ 5 - x > 0. \end{cases}$$

Значение x = 2 удовлетворяет всем условиям этой системы, а значение x = -3 не удовлетворяет второму условию; следовательно, x = -3 — посторонний корень.

Omeem: 2.

О потере корней

Укажем две причины потери корней при решении уравнений:

- 1) деление обеих частей уравнения на одно и то же выражение h(x) (кроме тех случаев, когда точно известно, что всюду в области
- определения уравнения выполняется условие $h(x) \neq 0$);
 - 2) сужение ОДЗ в процессе решения уравнения.

$$\sqrt{7x+3}=x;$$

$$\log_2(x-1)-\log_2x=0;$$

$$\sqrt{3x-5} = \sqrt{9-7x};$$
 6) $\sqrt{x^2-4} + \sqrt{1-x^2} = 4.$

$$\lg(x^2-9) + \lg(4-x^2) = 1;$$

$$\lg (x^2 - 3x) - \lg (2x - x^2) = 0.5.$$

$$\log_3(x^2 - 10x + 40) = \log_3(4x - 8);$$

$$\log_{0.8}(9x - 4x^2) = \log_{0.8}(x^3 + 4x^2);$$

Решите уравнение:

.11. a)
$$\sqrt{7}x - 6 = x$$
;

6)
$$x + 3 = \sqrt{2x + 9}$$
;

B)
$$\sqrt{6x-11} = x-1$$
;

$$\Gamma) -x - 5 = \sqrt{7x + 23}.$$

.12. a)
$$\sqrt{x^4 - 3x - 1} = x^2 - 1$$
;

6)
$$\sqrt{x^4-3x-1}=1-x^2$$
;

B)
$$\sqrt{x^4 + x - 9} = 1 - x^2$$
;

$$\Gamma) \sqrt{x^4 + x - 9} = x^2 - 1.$$

.13. a)
$$\sqrt{x^4 - 5x^2 - 2.5x} = 5 - x^2$$
;

6)
$$\sqrt{x^4-5x^2-2.5x}=x^2-5;$$

B)
$$\sqrt{x^4 - 3x^2 - 1.5x} = x^2 - 3$$
;

$$\Gamma) \sqrt{x^4 - 3x^2 - 1.5x} = 3 - x^2.$$