Критические точки функции, максимумы и минимумы.

Урок по алгебре и началам анализа в *11* классе по учебнику А. Н. Колмогорова.

Учитель математики МБОУ СОШ № *31* Туапсинского района Краснодарского края Зайцева Нина Михайловна

Цели урока:

- ***ОБУЧАЮЩАЯ :***

1) Ввести определение критических точек;
2) Рассмотреть теорему Ферма, которая является необходимым условием экстремума функции;
3) Вывести признак максимума функции и признак минимума функции;
4) Научиться решать задачи на данную тему, используя полученные знания

- ***РАЗВИВАЮЩАЯ :***

1) Способствовать развитию общения как метода научного познания, аналитико-синтетического мышления, смысловой памяти и произвольного внимания,
2) Развитие навыков исследовательской деятельности

- ***ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ :***

1) Способствовать развитию творческой деятельности
2) Развивать у учащихся коммуникативные компетенции, потребности к самообразованию.

Математический диктант

Функция задана графиком. Укажите область определения этой функции.

1 [-2; 4]

2 [-5; 6)

3 [-5; 5]

4 (-2; 4]



ПОДУМАЙ!

ВЕРНО!

ПОДУМАЙ!

Это множество значений!

Функция задана графиком. Укажите множество значений этой функции.

1 [-5; 7]

2 [-3; 5]

3 (-5; 7)

4 (-3; 5)

ПОДУМА Й!

ПОДУМА Й!

ВЕРНО!

Это область определения!



В какой из указанных точек производная функции, график которой изображен на рисунке, отрицательна?

ПОДУМАЙ!

1 x_1 В этой точке производная равна нулю!

2 x_2 Уг... ельной с ос... , значит $k < o$.

ПОДУМАЙ!

3 x_3 В этой точке производная равна нулю!

ПОДУМАЙ!

4 x_4

Геометрический смысл производной
$k = \mathrm{tg}\ \alpha$

1 ☐
2 ☒
3 ☐
4 ☐
5 ☐

ВЕРНО!

Угол наклона касательной с осью Ох острый, значит $k > o$



Проверка (4)

На рисунке изображен график функции y =f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x_0.
Найдите значение производной в точке x_0.

1 **0**

Верно!

2 **1**

Подумай!

3 **–1**

Подумай!

4 **не существует**

Подумай!



Геометрический смысл производной: **k = tg** α
Угол наклона касательной с осью Ох равен 0 (касательная параллельна оси Ох, значит tg$0^0 = 0$

На рисунке изображен график функции y =f(x).
Укажите в какой точке значение производной отрицатально.

В этой точке производная не существует

Угол наклона касательной с осью Ох острый, значит $k > 0$.

В этой точке производная равна нулю!

1 x_1

2 x_2

3 x_3

4 x_4



Верно!

Угол наклона касательной с осью Ох тупой, значит $k < 0$.

На рисунке изображен график функции y =f(x), заданной на промежутке [-5;5]. Укажите точку, в которой производная равна 0.



Не верно!

Верно!

Не верно!

Не верно

1 — 1

2 — -1

3 — 1

4 — -3

Непрерывная функция $y = f(x)$ задана на отрезке $[a;b]$
На рисунке изображен ее график. В ответе укажите количество точек графика этой функции, в которых касательная параллельна оси Ох.

1	3
2	5
3	8
4	11

Подумай!

Верно!

Подумай!

Подумай!



Проверка

На рисунке изображен график функции y =f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x_0.
Найдите значение производной в точке x_0.



Подумай!

1 –5

Подумай!

2 –1

Подумай!

3 5

Верно!

4 1

Геометрический смысл производной: **k = tg** α
Угол наклона касательной с осью Ох острый, значит $k > 0$.
Из прямоугольного треугольника находим tgα = 4 : 4 =1

На рисунке изображен график функции y =f(x) и касательная
к нему в точке с абсциссой x_0.
Найдите значение производной в точке x_0.



Подумай!

1 0,5

Подумай!

2 –0,5

3 –2

Верно!

Подумай!

4 2



Геометрический смысл производной: **k = tg** α

Угол наклона касательной с осью Ох тупой, значит $k < 0$.

Из прямоугольного треугольника находим $tg\alpha = 6 : 3 = 2$. Значит, $k = -2$

Математику нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед!

Критические точки функции, максимумы и минимумы.

Определение: Внутренние точки области определения функции, в которых её <u>производная равна нулю или не существует</u>, называются <u>критическими точками</u> этой функции.





<u>*Теорема Ферма*</u> (необходимое условие экстремума)

Если точка x_0 является точкой экстремума функции f *и* в этой точке существует производная f', то она равна нулю: $f'(x_0) = 0$.

Доказательство

Рассмотрим случай $f'(x_0) > 0$. По определению производной отношение $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ при $x \to x_0$ стремится к положительному числу $f'(x_0)$, а следовательно, и само будет положительно при всех x, достаточно близких к x_0. Для таких x $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}>0$, и значит $f(x) > f(x_0)$ для всех $x > x_0$ из некоторой окрестности точки x_0. Поэтому x_0 не является точкой максимума.

Если же $x < x_0$, то $f(x) < f(x_0)$, и, следовательно, x_0 не может быть и точкой минимума f.

Случай $f'(x_0)<0$ разбирается аналогично.



Важно! Теорема Ферма есть лишь необходимое условие экстремума: из того, что производная в точке x_0 обращается в нуль, необязательно следует, что в этой точке функция имеет экстремум.

Например, производная $f(x) = x^3$ обращается в нуль в точке 0, но экстремума в этой точке функция не имеет.

Рассмотрим критические точки, в которых производная не существует. Точка 0 для функции $y = \sqrt{x}$ не является критической; в ней производная не существует, но она не является внутренней точкой области определения функции.







Функция $y = |x|$ не имеет производной в точке 0. Значит, 0 – критическая точка. Очевидно, что в точке 0 функция имеет минимум.

Рассмотрим функцию $f(x) = 2x + |x|$. По графику видно, что в точке 0 эта функция не имеет экстремума. В этой точке функция не имеет и производной.

Достаточные условия существования экстремума в точке.

Признак максимума функции. Если функция f непрерывна в точке $\boldsymbol{x_0}$, а $f'(x_0) > 0$ на интервале $(a;x_0)$ и $f'(x_0) < 0$ на интервале $(x_0;b)$, то точка x_0 является точкой максимума функции f.

Если в точке x_0 производная меняет знак с плюса на минус, то точка x_0 есть точка максимума.

Доказательство.

Производная $f'(x_0) > 0$ на интервале $(a;x_0)$, а функция f непрерывна в точке x_0, следовательно функция f возрастает на промежутке $(a;x_0]$, и потому $f(x) < f(x_0)$ для всех x из интервала $(a;x_0)$.
На промежутке $[x_0;b)$ функция f убывает, и потому $f(x) < f(x_0)$ для всех x из интервала $(x_0;b)$

Итак, $f(x) < f(x_0)$ для всех x из интервала $(a;b)$, то есть x_0 есть точка максимума.

Признак минимума функции. Если функция f непрерывна в точке $\boldsymbol{x_0}$, а $f'(x_0) < 0$ на интервале $(a;x_0)$ и $f'(x_0) > 0$ на интервале $(x_0;b)$, то точка x_0 является точкой минимума функции f.

Если в точке x_0 производная меняет знак с минуса на плюс, то точка x_0 есть точка минимума.

Пример. Найдем точки экстремума функции $f(x) = 3x - x^3$.

Решение.

$f'(x) = 3 - 3x^2$. Производная определена во всех точках.

$f'(x) = 0$ при $x = -1$ и $x = 1$

$3x - x^3 = 0$ при $x=0$ и $x = \pm\sqrt{3}$

$x = -1$ – точка минимума, $x = 1$ – точка максимума,

$f(1) = 2$, $f(-1) = -2$





Закрепление изученного*:*

Решить № 292

Задание на дом*:* п.*23,* № *288, 290*

СПАСИБО ЗА УРОК!

Математический диктант -автор Савченко Е.М.

http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=9658