

Интегрирование рациональных функций

- Дробно – рациональная функция
- Простейшие рациональные дроби
- Разложение рациональной дроби на простейшие дроби
- Интегрирование простейших дробей
- Общее правило интегрирования рациональных дробей

Дробно - рациональная функция

Дробно – рациональной функцией называется функция, равная отношению двух многочленов:

$$f(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$$

Рациональная дробь называется **правильной**, если степень многочлена $P_m(x)$ меньше степени многочлена $Q_n(x)$, то есть $m < n$, в противном случае дробь называется **неправильной**.

Всякую неправильную рациональную дробь можно, путем деления числителя на знаменатель, представить в виде суммы многочлена $L(x)$ и правильной рациональной дроби:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = L(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

Дробно - рациональная функция

Привести неправильную дробь к правильному виду:

$$\frac{x^4 - 5x + 9}{x - 2}$$

$$\begin{array}{r} x^4 - 5x + 9 \\ \underline{-} x^4 - 2x^3 \\ \hline -2x^3 - 5x + 9 \\ \underline{-} 2x^3 - 4x^2 \\ \hline -4x^2 - 5x + 9 \\ \underline{-} 4x^2 - 8x \\ \hline -3x + 9 \\ \underline{-} 3x - 6 \\ \hline 15 \end{array}$$

$x - 2$

$x^3 + 2x^2 + 4x + 3$

$x^4 - 5x + 9$

$x - 2$

$x^3 + 2x^2 + 4x + 3$

$\frac{15}{x - 2}$

Простейшие рациональные дроби

Правильные рациональные дроби вида:

$$(I) \quad \frac{A}{x - a}$$

$$(II) \quad \frac{A}{(x - a)^k} \quad (k \geq 2; k \in N)$$

$$(III) \quad \frac{Mx + N}{x^2 + px + q} \quad (p^2 - 4q < 0)$$

$$(IV) \quad \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^k} \quad (p^2 - 4q < 0; \quad k \geq 2; k \in N)$$

Называются *простейшими рациональными дробями*
I, II, III, IV типов.

Разложение рациональной дроби на простейшие дроби

Теорема: Всякую правильную рациональную дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$, знаменатель которой разложен на множители:

$$Q(x) = (x - x_1) \cdot (x - x_2)^k \cdot \square \cdot (x^2 + p_1x + q_1) \cdot \\ \cdot (x^2 + p_2x + q_2)^s$$

можно представить, притом единственным образом в виде суммы простейших дробей:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x - x_1} + \frac{B_1}{x - x_2} + \frac{B_2}{(x - x_2)^2} + \square + \frac{B_k}{(x - x_2)^k} + \\ + \frac{Cx + D}{x^2 + p_1x + q_1} + \frac{M_1x + N_1}{x^2 + p_2x + q_2} + \frac{M_2x + N_2}{(x^2 + p_2x + q_2)^2} + \\ + \square + \frac{M_sx + N_s}{(x^2 + p_2x + q_2)^s}$$

Разложение рациональной дроби на простейшие дроби

Поясним формулировку теоремы на следующих примерах:

$$\frac{x^2 + 4}{(x - 2)(x - 3)^3} = \frac{A}{x - 2} + \frac{B_1}{x - 3} + \frac{B_2}{(x - 3)^2} + \frac{B_3}{(x - 3)^3}$$

$$\frac{x^3 + 3}{x^2(x^2 + 1)} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1}$$

$$\frac{7x^2 + 8x + 9}{(x - 4)(x^2 + x + 1)^2} = \frac{A}{x - 4} + \frac{M_1x + N_1}{x^2 + x + 1} + \frac{M_2x + N_2}{(x^2 + x + 1)^2}$$

Для нахождения неопределенных коэффициентов $A, B, C, D\dots$ применяют два метода: **метод сравнения коэффициентов и метод частных значений переменной**. Первый метод рассмотрим на примере.

Разложение рациональной дроби на простейшие дроби

Представить дробь в виде суммы простейших дробей:

$$\frac{2x^2 - 3x - 3}{(x-1)(x^2 - 2x + 5)} = \frac{-1}{x-1} + \frac{3x-2}{x^2 - 2x + 5}$$

$$\frac{A(x^2 - 2x + 5) + (Bx + C)(x - 1)}{(x-1)(x^2 - 2x + 5)}$$

($x-1$) ~~$(x^2 - 2x + 5)$~~ *Приведем простейшие дроби к общему знаменателю*

$$Ax^2 - 2Ax + 5A + Bx^2 + Cx - Bx - C = 2x^2 - 3x - 3$$

x^2	$A + B = 2$	<i>Приравняем числители получившейся и исходной дробей</i>
x^1	$-2A + C - B = -3$	$\Rightarrow A = 1$
x^0	$5A - C = -3$	<i>Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях x</i>

$$\begin{cases} A = 1 \\ B = 3 \\ C = -2 \end{cases} \Rightarrow$$

Интегрирование простейших дробей

Найдем интегралы от простейших рациональных дробей:

I $\int \frac{A}{x-a} dx = A \int \frac{d(x-a)}{x-a} = A \ln|x-a| + C$

II $\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = A \int (x-a)^{-k} d(x-a) =$

$$= \frac{A(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C$$

III $\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q} dx$

Интегрирование дроби 3 типа рассмотрим на примере.

Интегрирование простейших дробей

$$\begin{aligned} \int \frac{3x+1}{(x^2+2x)+10} dx &= \int \frac{3x+1}{(x^2+2x+1)+9} dx = \\ &= \int \frac{3x+1}{(x+1)^2+9} dx = \left| \begin{array}{l} x+1=t \\ x=t-1 \\ dx=dt \end{array} \right| = \int \frac{3(t-1)+1}{t^2+9} dt = \\ &= \int \frac{3t-2}{t^2+9} dt = 3 \int \frac{t \, dt}{t^2+9} - 2 \int \frac{dt}{t^2+9} = \frac{3}{2} \int \frac{d(t^2+9)}{t^2+9} - \\ &- \frac{2}{3} \operatorname{arctg} \frac{t}{3} = \frac{3}{2} \ln |t^2+9| - \frac{2}{3} \operatorname{arctg} \frac{t}{3} + C = \\ &= \boxed{\frac{3}{2} \ln |x^2+2x+10| - \frac{2}{3} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{3} + C} \end{aligned}$$

Интегрирование простейших дробей

IV $\int \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^k} dx$

Интеграл данного типа с помощью подстановки: $x + \frac{p}{2} = t$
приводится к сумме двух интегралов:

$$M \int \frac{t \, dt}{(t^2 + a^2)^k} + N \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^k}$$

Первый интеграл вычисляется методом внесения t под знак дифференциала.

Второй интеграл вычисляется с помощью рекуррентной формулы:

$$I_k = \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^k} = \frac{1}{a^2} \left(\frac{2k-3}{2k-2} \cdot I_{k-1} + \frac{t}{2(k-1)(t^2 + a^2)^{k-1}} \right)$$

Интегрирование простейших дробей

$$I_3 = \int \frac{dt}{(t^2 + 1)^3} \quad a = 1; k = 3 \quad I_1 = \int \frac{dt}{t^2 + 1} = arctg t$$

$$I_2 = \int \frac{dt}{(t^2 + 1)^2} = \frac{2 \cdot 2 - 3}{2 \cdot 2 - 2} \cdot I_1 + \frac{t}{2(2-1)(t^2 + 1)} = \\ = \frac{1}{2} \cdot arctg t + \frac{t}{2(t^2 + 1)}$$

$$I_3 = \frac{2 \cdot 3 - 3}{2 \cdot 3 - 2} \cdot I_2 + \frac{t}{2(3-1)(t^2 + 1)^2} =$$

$$= \boxed{\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{2} arctg t + \frac{t}{2(t^2 + 1)} \right) + \frac{t}{4(t^2 + 1)^2} + C}$$

Общее правило интегрирования рациональных дробей

- Если дробь неправильная, то представить ее в виде суммы многочлена и правильной дроби.
- Разложив знаменатель правильной рациональной дроби на множители, представить ее в виде суммы простейших дробей с неопределенными коэффициентами
- Найти неопределенные коэффициенты методом сравнения коэффициентов или методом частных значений переменной.
- Проинтегрировать многочлен и полученную сумму простейших дробей.

Пример

$$I = \int \frac{x^5 + 2x^3 + 4x + 4}{x^3 + 2x^2 + x} dx$$

Приведем дробь к правильному виду.

$$\begin{array}{r} x^5 + 2x^3 + 4x + 4 \\ - x^5 - 2x^4 - x^3 \\ \hline -2x^4 + x^3 + 4x + 4 \\ - -2x^4 - 4x^3 - 2x^2 \\ \hline -5x^3 + 2x^2 + 4x + 4 \\ - 5x^3 + 10x^2 + 5x \\ \hline -8x^2 - x + 4 \end{array}$$

$$\frac{x^5 + 2x^3 + 4x + 4}{x^3 + 2x^2 + x} = x^2 - 2x + 5 + \frac{-8x^2 - x + 4}{x^3 + 2x^2 + x}$$

Пример

$$\begin{aligned} \frac{-8x^2 - x + 4}{x^3 + 2x^2 + x} &= \frac{-8x^2 - x + 4}{x(x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2} \\ &= \frac{A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx}{x(x+1)^2} \\ &\quad \text{Представим дробь в виде} \\ &\quad \text{разложим знаменатель на простейшие дроби} \\ &\quad \text{правильной дроби на} \\ &\quad \text{множители} \\ x = 0 & \quad A = 4 \\ x = -1 & \quad -C = -3 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} A = 4 \\ B = -12 \\ C = 3 \end{cases} \\ x = 1 & \quad 4A + 2B + C = -5 \\ & \quad \text{Найдем неопределенные коэффициенты методом} \\ & \quad \text{частных значений переменной} \\ \frac{-8x^2 - x + 4}{x^3 + 2x^2 + x} &= \frac{4}{x} - \frac{12}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

Пример

$$I = \int x^2 - 2x + 5 + \frac{4}{x} - \frac{12}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2} dx =$$

$$\int x^2 dx - 2 \int x dx + 5 \int dx + 4 \int \frac{dx}{x} - 12 \int \frac{dx}{x+1} + 3 \int \frac{dx}{(x+1)^2} =$$

$$= \boxed{\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + 4 \ln|x| - 12 \ln|x+1| - \frac{3}{x+1} + C}$$