


За страницами учебника.

Внеклассное мероприятие в 8 классе.



- ❖ Эта тема является ступенькой в изучении более сложного материала математики средней школы. Умение быстро, рационально и правильно решать квадратные уравнения облегчает прохождение многих тем курса математики.

$$\sin^2 x + 4 \sin x \cdot \cos x - 5 \cos^2 x = 0.$$

$$(x^2 - 5x - 6) \cdot \sqrt{x^2 + 5x - 6} = 0.$$

$$2\sqrt{x} - 7\sqrt[4]{x} + 3 = 0.$$

$$(3x - 12)\sqrt{3x^2 - 10x + 3} = 0.$$

$$(6x - 5)\sqrt{2x^2 - 5x + 2} = 0.$$

$$3 \log_8^2 x + 5 \log_8 x = 2.$$

$$5^{2(\log_2 x)^2} - 26 \cdot 5^{(\log_2 x)^2} + 25 = 0.$$

$$2 \log_4^2 x - \log_4 x^{13} = 7.$$



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ:

- Различные приёмы решения заслуживают внимания, поскольку они не отражены в школьных учебниках математики;
- Овладение данными приёмами поможет учащимся экономить время и эффективно решать уравнения;
- Потребность в быстром решении уравнений обусловлена применением тестовой системы выпускных и вступительных экзаменов.

$x^2 + y^2 + 2dx + 2ey + f = 0$

$(x, y) = P(x, y)$

$a = \pi r^2$

Прием 1

$$1978x^2 - 1984x + 6 = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

если $a + b + c = 0$, то

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{c}{a}.$$

Пример:

$$2x^2 + x - 3 = 0$$

$$a + b + c = 2 + 1 - 3 = 0$$

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -\frac{3}{2}.$$

$$x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0$$

$$(x, y) = P(x, y)$$

$$a = \pi r^2$$

ЗАДАНИЕ 1:

Команда 8А

$$x^2 + 15x - 16 = 0$$

$$2x^2 + x - 1,5 = 0$$

$$-2x^2 + 1,7x + 0,3 = 0$$

$$\frac{1}{4}x^2 + 3\frac{3}{4}x = 4$$

Команда 8В

$$x^2 + 23x - 24 = 0$$

$$5x^2 + x - 1,2 = 0$$

$$-5x^2 + 0,6x + 4,4 = 0$$

$$\frac{1}{3}x^2 + 2\frac{2}{3}x = 3$$

Прием 2

$$1999x^2 + 2000x + 1 = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

если $a + c = b$, то


$$x_1 = -1, \quad x_2 = -\frac{c}{a}$$

Пример:

$$4x^2 + 11x + 7 = 0$$

$$a + c = b, \quad 4 + 7 = 11$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = -\frac{7}{4}$$



ЗАДАНИЕ 2:

Команда 8А

$$x^2 - 1 \text{ и } 66 = 0$$

$$6x^2 - 1 \text{ и } \frac{1}{6} - 1 = 0$$

$$0,5x - 1 \text{ и } 7 - 3,5 = 0$$

$$9x^2 - 1 \text{ и } \frac{2}{9} = 2$$

Команда 8В

$$x^2 - 1 \text{ и } 44 = 0$$

$$7x^2 - 1 \text{ и } \frac{1}{7} - 1 = 0$$

$$0,1x - 1 \text{ и } -39,9 = 0$$

$$2x^2 - 1 \text{ и } 4,59$$

Прием 3

Прием «Переброски» старшего коэффициента

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$y^2 + by + ac = 0$$

Прием 3 Прием «Переброски» старшего коэффициента

- Суть метода состоит в том, что корни квадратных уравнений $ax^2 + bx + c = 0$ и $y^2 + by + ac = 0$ связаны соотношениями:

$$x_1 = \frac{y_1}{a}, \quad x_2 = \frac{y_2}{a}$$

Пример:

$$2x^2 - 9x - 5 = 0$$

$$y^2 - 9y - 5 = 0$$

$$y^2 - 9y - 10 = 0$$

$$y_1 = -1, y_2 = 10$$

$$x_1 = \frac{-1}{2}, \quad x_2 = \frac{10}{2} = 5.$$



Задание 3:

Команда 8А

1. $3x^2 + 14x + 8 = 0$
2. $6x^2 + 13x + 2 = 0$
3. $10x^2 + 17x + 6 = 0$

1. -4 и $-2/3$
2. -2 и $-1/6$
3. -1,2 и -0,5

Команда 8В

1. $5x^2 + 14x + 8 = 0$
2. $6x^2 + 11x + 4 = 0$
3. $3x^2 + 11x + 6 = 0$

1. -2 и -0,8
2. -0,5 и $-4/3$
3. -3 и $-2/3$

Прием 4

$$6x^2 + 37x + 6 = 0$$

$$ax^2 + (a^2 + 1) \cdot x + a = 0$$

$$x_1 = -a, \quad x_2 = -\frac{1}{a}$$

Пример:

$$6x^2 + 37x + 6 = 0$$

$$x_1 = -6, \quad x_2 = -\frac{1}{6}$$

Задание командам:

- Придумать по три уравнения, решить их и по команде составленными уравнениями обменяться.
- Решить полученные уравнения, выходя к доске по одному.



ПРИЕМ 5

$$15x^2 - 226x + 15 = 0$$

$$ax^2 - (a^2 + 1) \cdot x + a = 0$$

$$x_1 = a, \quad x_2 = \frac{1}{a}$$


Пример:

$$15x^2 - 226x + 15 = 0$$

$$x_1 = 15, \quad x_2 = \frac{1}{15}$$

Задание командам:

- Придумать по три уравнения, решить их и по команде составленными уравнениями обменяться.
- Решить полученные уравнения, выходя к доске по одному.



Прием 6

$$17x^2 + 288x - 17 = 0$$

$$ax^2 + (a^2 - 1) \cdot x - a = 0$$

$$x_1 = -a, \quad x_2 = \frac{1}{a}$$

Пример:

$$17x^2 + 288x - 17 = 0$$

$$x_1 = -17, \quad x_2 = \frac{1}{17}$$

Задание командам:

- Придумать по три уравнения, решить их и составленными уравнениями по команде обменяться.
- Решить полученные уравнения, выходя к доске по одному.



Прием 7

$$10x^2 - 99x - 10 = 0$$

$$ax^2 - (a^2 - 1) \cdot x - a = 0$$

$$x_1 = a, \quad x_2 = -\frac{1}{a}$$

Пример:

$$10x^2 - 99x - 10 = 0$$

$$x_1 = 10, \quad x_2 = -\frac{1}{10}$$

Задание командам:

- Придумать по три уравнения, решить их и составленными уравнениями по команде обменяться.
- Решить полученные уравнения, выходя к доске по одному.





LOOHOO
LITHIUM SERIES