

LOGO

Производная показательной функции.

11 класс.

План урока

1

Повторение материала

2

Объяснение нового
материала

3

Решение примеров

4

Задание на дом


Устная работа.

1. **Определение производной.**
2. **Правила дифференцирования.**
3. **Производные элементарных функций.**
4. **Применение производной при исследовании функции.**
5. **Уравнение касательной.**

Устная работа.


$f(x)$	x^3	x^{-7}	$4x^6$	8	\sqrt{x}	$\frac{x^3}{3}$	$\sin(4x)$
$f'(x)$	$3x^2$	$-7x^{-8}$	$24x^5$	0	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	x^2	$4\cos(4x)$

$$f(x) = 2^x$$



$$\alpha = 35^\circ$$

$$g(x) = 3^x$$



$$\alpha = 48^\circ$$

$f(x) = \ln(x)$ –

α – угол наклона касательной

$$\alpha = 45^\circ$$

$$a = 2,718281828\dots$$

$$e \approx 2,7$$

Функция $f(x) = e^x$

Существует такое число большее 2 и меньше 3 (это число обозначают буквой e), что показательная функция $f(x) = e^x$ в точке 0 имеет производную, равную 1, т.е.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = 1.$$

Функция $f(x) = e^x$

Теорема 1.

Функция $f(x) = e^x$
дифференцируема в каждой точке
области определения, и

$$(e^x)' = e^x.$$

Определение

Натуральным логарифмом
называется логарифм по
основанию e :

$$\ln x = \log_e x$$

Теорема 2

Показательная функция $y = a^x$

дифференцируема в каждой точке области определения, и

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

Примеры.

1. Найдите производную функции

$$f(x) = e^{3x} (2x - 1).$$

Решение:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (e^{3x})'(2x - 1) + e^{3x} (2x - 1)' = \\ &= 3e^{3x} (2x - 1) + 2e^{3x}. \end{aligned}$$

2. Исследуйте функцию на экстремумы:

$$f(x) = x^2 2^{-x}$$

Решение:


$$f(x) = x^2 \cdot 2^{-x}, D(f) = \mathbb{R}.$$

$$f'(x) = 2x \cdot 2^{-x} - x^2 \cdot 2^{-x} \ln 2, D(f') = \mathbb{R}.$$

$$2x \cdot 2^{-x} - x^2 \cdot 2^{-x} \ln 2 = 0;$$

$$x \cdot 2^{-x} (2 - x \ln 2) = 0;$$

$$x_1 = 0; x_2 = \frac{2}{\ln 2}.$$



$$\text{Ответ : } x_{\max} = \frac{2}{\ln 2}; x_{\min} = 0.$$

Теорема 3

Первообразной для функции

$$f(x) = a^x$$

на

\mathbb{R}

является функция

$$F(x) = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

Примеры.

3. Вычислить интеграл

$$\int_{-\frac{1}{2}}^1 3^x dx = \frac{3^x}{\ln 3} \Big|_{-\frac{1}{2}}^1 = \frac{3^1}{\ln 3} - \frac{3^{-\frac{1}{2}}}{\ln 3} = \frac{3 - \sqrt{\frac{1}{3}}}{\ln 3} =$$
$$= \frac{3\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} \ln 3}.$$

Решение примеров.

№ 1617

№ 1618(абв)

№ 1619(вг)

№ 1620(вг)

№ 1624 (аб)

№ 1627 (б)

№ 1631 (бг)

Задание на дом

Пункт 41

№ 538

№ 539

№ 540 (ав)

№ 542(абв)