

**ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА ПО
ТЕМЕ:
ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ
УРАВНЕНИЯ И
НЕРАВЕНСТВА В РАМКАХ
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
(ПО УЧЕБНИКУ А.Н.КОЛМОГорова, 2001 ГОД.)**

Орловой Анастасии

IV курс 3 группа

Содержание

- Цели обучения теме
- Тематическое планирование
- Логико-математический анализ тем
- Анализ задачного материала
- Пример работы с понятием
- Пример работы с теоремой
- Пример работы с задачей
- Дополнительные задачи
- Система контроля
- Использованная литература



- Основная цель: На основе систематизации и обобщения знаний, полученных учащимися в курсе математики VII - X классов дополнить и обобщить основные теоретические положения линии уравнений и неравенств (иррациональные уравнения и неравенства)



Назад

Актуализируемые знания и умения:

Знания: алгебраические выражения, значения алгебраических выражений, алгебраические равенства, свойства числовых равенств, правила раскрытия скобок; линия числа: действия на числовом множестве, свойства арифметических действий; понятие уравнения, неравенства, приёмы решения уравнений и неравенств
Умения: считать правильно и рационально, работать с уравнением или неравенством, проводить простейшие логические рассуждения.

Вводимые понятия:

Определение: иррациональное уравнение, посторонние корни, иррациональное неравенство, На примере: иррациональные уравнения; иррациональные неравенства, способы решения иррациональных уравнений и неравенств

Свойства

Подстановка корней в уравнение

Свойства верных числовых равенств

Теоремы о равносильных и неравносильных преобразованиях

Правила

Решение иррационального уравнения

Решение иррационального неравенства

Задачный материал

Назад

Актуализация знаний	Мотивация введения нового материала	Закрепление нового материала		Повторение (сопутствующее)	Пропедевтика
		Первичное	В условиях комплексного применения знаний		
№388; №394; №404; №412; №415.		№417; №419; №150 (с.297).	№422; №426; №148 (с.297).		

Назад

подтема	ко-л-во часов	№ урока	Тема урока	Цели	Теор. материал	Задачный материал		повторение	Самост. работа	У М К	контроль
						В классе	Дома				
Решение иррациональных уравнений	2	1	Иррациональные уравнения	Актуализировать знания учащихся по данной теме, ввести понятие «иррациональное уравнение», рассмотреть основные способы решения.	Иррациональные уравнения, решение иррациональных уравнений	№2417, №2419, №2425	№2418, №2420, №2424			Учебник	Самостоятельная работа, проверка д/з
		2	Решение иррациональных уравнений	Закрепление изученной темы	Другие способы решения иррациональных уравнений	№2421 (а, б); №2426 (б, г); №2148 (в) (стр. 297)	№2422 (а, б); №2423 (б); №2426 (б)	<u>Самостоятельная работа №1 из набора</u>		Учебник	Самостоятельная, проверка д/з работа

Назад



подтема	ко-л-во часов	№ урока	Тема урока	Цели	Теор. материал	Задачный материал		повторение	Самост. работа	У М К	контроль
						В классе	Дома				
Решение иррациональных неравенств	1	3	Решение иррациональных неравенств	Познакомить учащихся с основными способами решения иррациональных неравенств	Способы решения иррациональных неравенств	№150 (а, б); №151 (б, г)	№150 (в, г); №151 (а, в)	№148	<u>Самостоятельная работа</u> а №2 из набора а	Учебник	Самостоятельная работа, проверка д/з
		4	<u>Проверочная работа</u>	Проверка знаний по изученной теме						Учебник	Проверочная работа

Назад



▣ Набор задач по теме «иррациональные уравнения»

▣ Первый уровень:




$$\sqrt[6]{x-3} = 2$$

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{2x+6} = 6$$

$$\sqrt{5-x} = \sqrt{3} + 2 - x$$

$$2x - \sqrt{x^3 + 2x^2 - 3x} = 0$$


$$\sqrt{5x+7} - \sqrt{x+4} = 4x+3$$



Назад

Набор задач по теме «иррациональные уравнения»

Второй уровень:

$$\sqrt{x^2 + x + 1} + \sqrt{x^2 + \frac{3}{4}x} = \sqrt{4x^2 + 3x}$$



$$x + \sqrt{\frac{x^2 + 4x}{x - 2}} = 0$$

$$2\sqrt[3]{x} + \sqrt[6]{x} = 10$$

$$5\sqrt{x + 1} \cdot \sqrt{x + 3} = 2\sqrt{2}(x^2 + 4x)$$

$$\frac{1}{2x - y} + \sqrt{y} = 1$$

$$\frac{\sqrt{y}}{2x - y} = -6$$



Назад

Набор задач по теме «иррациональные уравнения»

Третий уровень:

$$\frac{\sqrt[5]{5-x}}{x^2} - \frac{\sqrt[5]{5-x}}{25} = \sqrt[5]{\frac{x^2}{x+5}}$$





$$\sqrt{2 + \frac{x}{\sqrt{x+1}}} - 1 = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6} - \sqrt{x}}{\sqrt{x+4}}$$

$$\frac{x - y\sqrt{x^2 - y^2}}{\sqrt{1 - x^2 + y^2}} = 2$$

$$\frac{y - x\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{1 - x^2 + y^2}} = \frac{7}{4}$$

$$\frac{x^2}{y^2} + 2\sqrt{x^2 + 1} + y^2 = 3$$

$$x + \frac{y}{\sqrt{x^2 + 1 + x}} + y^2 = 0$$



Назад

▣ Набор задач по теме «иррациональные неравенства»



▣ Первый уровень:

$$\sqrt{x^2 - 2x - 12} < x$$

$$\sqrt{x^2 - 3x + 2} > x + 3$$

$$\sqrt{\frac{3x^2 - 2x + 2}{4 + 3x - x^2}} < 1$$

$$\sqrt{x + 2} - \sqrt{x - 1} > 1$$

$$\sqrt{\frac{3x - 1}{2 - x}} > 1$$



Назад

- ▣ Набор задач по теме «иррациональные неравенства»



- ▣ Второй уровень:

$$\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 + 3x - 4} > x + \frac{1}{2}$$

$$\sqrt{5 + x^2} - \sqrt{x - 2} \geq x + 1$$

$$3\sqrt{x - 2} - 2\sqrt{x - 1} > \sqrt{x + 1}$$

$$\sqrt{x^3 + x^2 - 4x + 1} \geq |x - 2|$$

$$\frac{\sqrt{6+x-x^2}}{2x+5} \geq \frac{\sqrt{6+x-x^2}}{x+4}$$



Назад

Набор задач по теме «иррациональные неравенства»



Третий уровень:

$$\frac{1 - \sqrt{1 - 4x^2}}{x} > \frac{3}{2}$$

$$\sqrt{5 - |x + 1|} \leq 2 + x$$

$$\frac{(x^2 - 1)(\sqrt{3 + x^2} + 2x)}{|x - 2| - 4x + 3} \geq 0$$

$$\frac{(|3x + 5| - |5x + 3|)(x^2 - 1)}{\sqrt{5 + 4x} + 2x + 1} \geq 0$$

$$\frac{(\sqrt{1 + 2x^2} - 1 - x^2)(|2x + 3| - |3x + 2|)}{(x^2 - 5x + 4)(\sqrt{5 + x} + 1 - x)(x^{99} - 1)} \leq 0$$



Назад

▣ *Понятие «иррациональное уравнение»*

▣ *Учащимся даётся карточка с заданием, в котором пропущены некоторые слова. Задача учащихся – заполнить все пропуски к концу урока.*



Назад

Определение.

Уравнение, в котором переменная содержится _____ (или под знаком операции возведения в дробную степень), называется **иррациональным**.

Примеры:

Основные свойства:

1. Все корни четной степени, входящие в уравнение, являются арифметическими.

а) Если подкоренное выражение положительно, то значение корня _____

б) Если подкоренное выражение равно нулю, то значение корня _____

в) Если подкоренное выражение отрицательно, то значение корня _____

2. Все корни нечетной степени, входящие в уравнение, определены при любом действительном значении подкоренного выражения.

а) Если подкоренное выражение положительно, то значение корня _____

б) Если подкоренное выражение равно нулю, то значение корня _____

в) Если подкоренное выражение отрицательно, то значение корня _____

Посторонний корень иррационального уравнения – это _____



Назад

Актуализация знаний:

Вспоминаются свойства степени и арифметического квадратного корня



1) *Найдите значение выражения:*

а)
$$\sqrt[3]{10 + \sqrt{73}} \cdot \sqrt[3]{10 - \sqrt{73}}$$

б)
$$\frac{\sqrt[3]{(4 + \sqrt{17})^2}}{\sqrt[3]{4 - \sqrt{17}}} + \sqrt{17}$$

в)
$$\sqrt[6]{\frac{64}{100\,000\,000}}$$



Назад

2) При каких значениях a верно равенство:



а) $\sqrt{a^2} = -a$

б) $\sqrt[3]{a^3} = -a$

в) $\sqrt[5]{a^5} = |a|$

г) $\sqrt[4]{a^4} = |a|$

3) Вынесите множитель из-под знака корня

а) $\sqrt[6]{64 a^8 b^{11}}$

б) $\sqrt[5]{-128 a^7}$

с) $\sqrt[4]{6 a^{12} b^6}$

д) $\sqrt[3]{54 a^{10}}$



Назад

4) *Внесите множитель под знак корня*

a) $-b \sqrt[4]{3}$

b) $ab \sqrt[8]{\frac{5b^3}{a^7}}$

c) $a \sqrt[4]{7}$

d) $-ab \sqrt[3]{-4}$



5) *Освободитесь от иррациональности в знаменателе*

a) $\frac{3}{\sqrt{7} - \sqrt{5}}$

b) $\frac{a - \sqrt{2}}{a + \sqrt{2}}$

c) $\frac{a}{\sqrt[3]{2}}$

d) $\frac{5}{3 \sqrt[5]{5}}$



Назад

На доске выписаны иррациональные уравнения, задание – выделить общие черты этих уравнений, после чего сформулировать определение иррационального уравнения.

$$\sqrt[6]{x-3} = 2$$

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{2x+6} = 6$$

$$\sqrt{5-x} = \sqrt{3} + 2 - x$$

$$2x - \sqrt{x^3 + 2x^2 - 3x} = 0$$

$$\sqrt{5x+7} - \sqrt{x+4} = 4x+3$$

$$\sqrt{x^2 + x + 1} + \sqrt{x^2 + \frac{3}{4}x} = \sqrt{4x^2 + 3x}$$

$$x + \sqrt{\frac{x^2 + 4x}{x-2}} = 0$$

$$2\sqrt[3]{x} + \sqrt[6]{x} = 10$$

$$5\sqrt{x+1} \cdot \sqrt{x+3} = 2\sqrt{2}(x^2 + 4x)$$



Назад



Иррациональное уравнение – это уравнение, в котором переменная содержится под знаком корня



Назад

После заполнения карточки в конце урока для закрепления из приведённого ниже списка уравнений выбрать те, которые являются иррациональными

1) $x^2 - 5x + 2 = 0$

2) $\sqrt{x} = 2$

3) $x\sqrt{2} - 7 = 12$

4) $\frac{25x-13}{21} = 0$


5) $\sqrt[3]{x} - 5\sqrt[6]{x} + 6 = 0$

6) $5\sqrt{7} + 12x = 12x^2$

7) $\operatorname{tg} x = 1$

8) $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

9) $\sqrt{18 - \sqrt[3]{x + 10}} = 4$



Назад


Работа с задачей

Уравнение:



$$\sqrt{x-1} + \sqrt{2x+6} = 6$$

Так как изучение темы проводится в рамках проблемного обучения, то ученики должны сами «открыть» способ решения этого уравнения. Для этого можно предложить набор уравнений с возрастающей сложностью, с помощью решения которых ученики смогут понять, как решать иррациональные уравнения



Назад

$$1) \sqrt{x} = 6$$

$x = 36$, так как $\sqrt{36} = 6$

$$2) \sqrt{-x} = 6$$

$x = -36$, так как выражение под знаком корня должно быть

неотрицательным и $\sqrt{-(-36)} = 6$

$$3) \sqrt{x} = -6$$


корней нет, так как корень не может равняться отрицательному числу

$$4) \sqrt{x-1} = 1$$

$$x-1 = 1$$

$x = 2$, так как

$\sqrt{2-1} = 1$ – верное равенство



Назад



$$5) \sqrt{x^2} = 1$$

$$x^2 = 1$$

x = 1 и x = -1, так как при подстановке в уравнение обоих корней получается верное равенство.

$$6) \sqrt{x} = \sqrt{-x}$$

x = 0, так как области определения корней левой и правой части пересекаются только по одной точке, и при подстановки её в уравнение получается верное равенство.


$$7) \sqrt{2 - x^2} = 1$$

$$2 - x^2 = 1$$

$$x^2 = 1$$

x = 1 и x = -1

При подстановке обоих корней в уравнение получается верное равенство.



Назад


Решите уравнение с помощью
подстановки $t = \sqrt[4]{x}$ или $t = \sqrt[6]{x}$

a) $\sqrt[3]{x} - 5\sqrt[6]{x} + 6 = 0$

b) $\sqrt{x} - 3\sqrt[4]{x} + 2 = 0$


c) $\sqrt{x} + \sqrt[4]{x} = 2$

d) $\sqrt[3]{x} - 5\sqrt[6]{x} = 6$



Назад

Так, на основе вспомогательных задач, учащиеся сами «открывают» способы решения иррациональных уравнений, так как знания получены самостоятельно, они лучше усваиваются. Так же ученики выписывают основные методы решения уравнений, обосновывают необходимость проверки при решении.



Назад

▣ Работа с теоремой



- ▣ Теорема. Если от обеих частей уравнения взять одну и ту же немонотонную функцию, которая не изменяет ОДЗ уравнения, то новое уравнение может содержать лишние корни, которые будут входить в ОДЗ исходного уравнения, и поэтому при таком способе решения каждое из найденных решений надо проверить непосредственной подстановкой в исходное уравнение. Причём эту проверку довести до численного равенства.



Назад

□ В данном случае, рассматривается возведение в квадрат или любую другую чётную степень. 

□ Рассматриваются два примера:

□ 1) $\sqrt{x - 6} = \sqrt{4 - x}$

□ Решая это уравнение, получаем единственное решение $x = 5$, однако при подстановке в уравнение мы не получим верного равенства. $x = 5$ - посторонний корень уравнения. Заметим, что $x = 5$ не входит в ОДЗ исходного уравнения. Значит ли это, что при решении любого уравнения мы должны находить его ОДЗ?



- ▣ *Рассмотрим второе уравнение:*

$$\sqrt{x - 1} = \sqrt{2x + 6}$$



- ▣ *При решении этого уравнения получаем два корня $x = 5$ и $x = 197$. Оба корня входят в ОДЗ исходного уравнения, однако при подстановке в исходное уравнение, оказывается, что $x = 197$ не является корнем исходного уравнения. $x = 197$ – посторонний корень.*
- ▣ *В результате учащиеся должны сделать вывод о том, что при решении иррациональных уравнений необходимо делать проверку, даже если корни входят в ОДЗ.*



- ▣ *Далее ставится вопрос о том, откуда возникают посторонние корни.*



$$\sqrt{g(x)} = \sqrt{f(x)}$$

- ▣ *- это исходное уравнение. При возведении обеих его частей в квадрат, получим*

$$(\sqrt{f(x)})^2 = (\sqrt{g(x)})^2$$

- ▣ *Но корнями этого уравнения будут так же корни уравнения*

$$-\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$$

- ▣ *Которые могут и не являться корнями исходного уравнения.*



*Эти корни будут посторонними. Для того,
чтобы их не включить в ответ, и нужна
проверка.*



Назад

▣ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1



$$1) \sqrt{3+x} = 3-x$$

$$2) \sqrt{3x+1} - \sqrt{2x-1} = 7$$

$$3) x + \sqrt{\frac{x^2+4x}{x-2}} = 0$$



Назад



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2



$$1) \sqrt{3 + x} > 3 - x$$

$$2) \sqrt{x^2 - 3x - 3} < 5 - x$$

$$3) \sqrt{x + 2} - \frac{4}{\sqrt{x+2}} \leq 3$$

Назад

□ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА



$$1) \sqrt{7 + 3x} = 4 - x$$

$$2) \sqrt{x^2 - 5x + 2} - \sqrt{x^2 + x + 1} = 1 - 6x$$

$$3) \sqrt{7 + x} \geq 7 - 2x$$

$$4) \sqrt[3]{1 + \sqrt{x}} = \sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}$$

$$5) x \cdot \sqrt{5 + 2x} \geq 5x - x^2$$

Назад



- ▣ Актуализируемые знания и умения:
- ▣ Знания: алгебраические выражения, значения алгебраических выражений, алгебраические равенства, свойства числовых равенств, правила раскрытия скобок; *линия числа:* действия на числовом множестве, свойства арифметических действий; понятие уравнения, неравенства, приёмы решения уравнений и неравенств
- ▣ Умения: считать правильно и рационально, работать с уравнением или неравенством, проводить простейшие логические рассуждения.



Вводимые понятия:

- ▣ **Определения:** иррациональное уравнение, посторонние корни, иррациональное неравенство,
- ▣ **На примере:** иррациональные уравнения; иррациональные неравенства, способы решения иррациональных уравнений и неравенств

Использованная литература:

- Алгебра и начала анализа 10-11. под ред. А.Н. Колмогорова, Москва, Просвещение, 2001г.
- «Математика для поступающих в вузы», Москва, «Дрофа», 1997 г.
- «Математика. Справочник школьника», Якушева Г., «Слово», 1997 г
- «Математика. Справочные материалы», В.А.Гусев, А. Г. Мордкович, Москва, «Просвещение», 1988 г.
- «Математика. Наглядный справочник с примерами», Л. Э.Генденштейн, Москва, «ИЛЕКСА», 2005г.