Решение простейших логарифмических уравнений.

К уроку по алгебре и началам анализа
учителя математики
Варавва Н.А.
МБОУ гимназия № 72 имени академика В. П.Глушко города Краснодара

Решить уравнение:

$\log_2 (x+3)=2$

- 1.Найдём ОДЗ, учитывая , что логарифм определён только для положительных чисел.
- $X+3>0$
- $X>-3$



- 2.Решим уравнение:
- $\mathrm{Log}_2(x+3)=2$, $2 = \mathrm{Log}_2 2^2 = \mathrm{Log}_2 4$
- $\mathrm{Log}_2(x+3)=\mathrm{Log}_2 4$
- $X+3=4$
- $X=4-3$
- $X=1$

-3

- 3. Проверка:



Ответ:1.

Решить уравнение: $\mathrm{Log}_{0,3}(4-x)=\mathrm{Log}_{0,3}(x+2)$.

- 1. Найдём ОДЗ уравнения:
- $\mathrm{Log}_{0,3}(4-x)=\mathrm{Log}_{0,3}(x+2)$

$$\begin{cases} 4-x \square 0, \\ x+2 \square 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} -x \square -4, \\ x \square -2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \square 4, \\ x \square -2. \end{cases}$$

-2



$$-2 < x < 4$$

- 2. Решаем уравнение:
- $\mathrm{Log}_{0,3}(4-x)=\mathrm{Log}_{0,3}(2+x)$
- $4 - x = 2+x$
- $-2x=2-4$
- $-2x = -2$
- $X=1$

- 3.Проверка.



4.Ответ:1

Решить уравнение:

$$\mathrm{Log}_e(3x+7)-2\mathrm{Log}_e(x+1)=0.$$

π

1.Найдём ОДЗ:

- $\mathrm{Log}_e(3x+7)-2\mathrm{Log}_e(x+1)=0.$

$$\begin{cases} 3x+7 \square 0, \\ x+1 \square 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x \square -7, \\ x \square -1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \square -\dfrac{7}{3}, \\ x \square -1; \end{cases}$$

$$x \square -1.$$

-1

- X > -1

-1

2.Решаем уравнение:

- $\mathrm{Log}_e(3x+7)- 2\mathrm{Log}_e(x+1)=0.$
- $\mathrm{Log}_e(3x+7)= 2\mathrm{Log}_e(x+1),$ $\quad 2\mathrm{Log}_e(x+1)= \mathrm{Log}_e(x+1)^2$

- $\mathrm{Log}_e(3x+7)=\mathrm{Log}_e(x+1)^2$
- $3x+7=(x+1)^2$
- $3x+7=x^2 +2x +1$
- $X^2 +2x +1-3x -7=0$
- $X^2 –x – 6 =0$
- По теореме обратной Виета:$x_1 =3$, $x_2 =-2$

3. Проверка корней.



Ответ.3

Решить уравнение:

$$3\mathrm{Log}_3(1-x^2)-\mathrm{Log}_3(1-x^2)=4$$

1.Найдём ОДЗ:

- $3\mathrm{Log}_3(1-x^2) - \mathrm{Log}_3(1-x^2) = 4.$
- $1 - x^2 > 0,$
- $X^2 < 1,$
- $|x|<1$

2.Решим уравнение:

- $3\mathrm{Log}_3{}^2(1-x^2)+\mathrm{Log}_3(1-x^2) - 4 = 0$,
- Пусть $\mathrm{Log}_3(1-x^2)= t$, тогда уравнение примет вид:
- $3t^2 - t -4 =0$,
- т.к. а+в+с=0 , то $t_1= -1$, $t_2 =-c\backslash a= 4\backslash 3$.
- Получим: $\mathrm{Log}_3(1-x^2)=-1$ или $\mathrm{Log}_3(1-x^2)=4/3$
- $\mathrm{Log}_3(1-x^2)=\mathrm{Log}_3 1/3$ $1- x^2 = 3^{4/3}$
- $1-x^2 =1/3$ $x^2 = 1-3^{4/3} <0$
- $x^2=2/3$ корней нет
- $x=\pm\sqrt{\frac{2}{3}}$
-

3.Проверка.



Ответ . $\pm\sqrt{\frac{2}{3}}$

$\log_8(3x-2)=2$

Уравнения для самостоятельного решения.

- Вариант 1.
- 1.$\log_8(3x-2)=2$
- 2.$\log_{0,99}(5x-1)=\log_{0,99}(3x+7)$
- 3.$\log_5 4+\log_5(x-1)=\log_5 8$
- 4.$10^{\lg(x-6)}=x^2-12x+36$
- 5. $\ln(x^2-x)=\ln(2x+4)$

- Вариант 2.
- 1.$\log_7(5x+2)=1$
- 2.$\lg(6x+1)=\lg(-x+8)$
- 3.$\log_4 9+\log_4(x+1)=\log_4 3$
- 4.$e^{\ln(x-2)}=x^2+6x-8$
- 5. $\log_2(x^2+3x)=\log_2(x+3)$

- X+1

- X*1