



В современном мире одногорбый верблюд распространен во многих регионах Азии и Африки как домашнее животное. Верблюдов используют для перевозки грузов или верховой езды.

20 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ОБ ОДНОГОРБЫХ ВЕРБЛЮДАХ

www.flickr.com / Andy Hayes



А Австралию верблюдов завез Конрад Мульте-Брун, которому они нужны были, чтобы исследовать необитаемые австралийские пустыни

www.zooclub.ru

www.flickr.com / Phillip Turner



Одногорбый верблюд, прозванный греками «дромайес», то есть «быстробегущий», был выведен в Африке

www.zooclub.ru



У дромедаров также различают несколько пород: мехари (самые быстроногие верблюды, развивающие скорость до 15-18 км/час), дедуль, джемель, туркменские арваны и др.

www.flickr.com / Lehva



В 1622 году Фердинанд Медичи привез дромедаров в Италию, их разводили недалеко от Пизы

www.zooclub.ru



Дромедары бегают не рысью, а иноходью

www.flickr.com / Mark Dumont



**За год бактрианы дают 600-800 л молока, а дромедары -
1000-2000 и более**

www.zooclub.ru



В Объединенных Арабских Эмиратах скаковой верблюд Джаббар с безупречной родословной был продан за 907 200 дол США. А его брат был куплен за 435 тыс. дол. США членом правящей семьи Абу-Даби



Ритуальной реакцией доминирующего самца дромедара является «бульканье»: верблюд стоит, выгнув шею, и, слегка отклонив назад голову, надувает мягкое небо да так, что оно пузырем вываливается сбоку изо рта.



**У зародыша одногорбого верблюда образуется два горба,
а верблюжата рождаются без горба**



За верблюда редкой породы маджхим по кличке Машауфан владельцу предлагали 3 200 000 дол. США. Но счастливый владелец драгоценного "корабля пустыни" отказался его продать



**В сутки самка одногорбого верблюда может дать
до 8-10 л молока**

www.flickr.com / Kyle Simourd



Максимальная скорость одногорбого верблюда — 16 км/час


www.zooclub.ru

[www.flickr.com /James Sullivan](http://www.flickr.com/James+Sullivan)



С одного дромедара настригают 2-4 кг шерсти в год

www.zooclub.ru



Северные арабийские племена начали использовать дромадеров, как верховых животных, около 3100 лет назад

www.flickr.com / Chris Hockley



Дромедары разделяются на тяжелых вьючных (например, туркменские) и на легких верховых

www.zooclub.ru



**Боевые и гоночные верблюды развивают скорость
до 20-25 км/час**



Дромедары крупнее двугорбых верблюдов, они более длинноноги, а шерсть у них реже и короче. Они не утратили способности к быстрому бегу и используются для верховой езды



У самцов-дромедаров мягкое небо, которое во время сезона размножения они раздувают для привлечения самок. Этот мешок красного цвета часто принимается за язык, т.к. он висит с одной стороны, высываясь изо рта



**Популяция диких одногорбых верблюдов в Австралии
оценивается около 500 тысяч особей**



Среди верховых одногорбых верблюдов особенно ценится порода махари, а в Индии - раджпутанская