

Растения, занесённые в Красную книгу Мордовии.

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ.



**Выполнила ученица 11 класса
Большакова Ксения.
Проверила Парашкина Н.А.**

2013год.

Флора РМ и охрана живой природы.


Первоочередными задачами в деле охраны живой природы являются инвентаризация ее видового состава, выявление редких и исчезающих растений, животных и грибов и создание на этой основе Красных книг.

В Красную книгу Мордовии включены 170 видов сосудистых растений (162 - покрытосеменных, 1 - голосеменных, 4 - папоротниковидных, 1 - хвощевидных, 2 - плауновидных),
12 - мохообразных, 2 - водорослей, 7 - лишайников и 9 видов грибов.



Сосудистые растения, занесенные в Красную книгу РМ.

1. Отдел Папоротниковидные
2. Отдел Хвощевидные
3. Отдел Плауновидные
4. Отдел Голосеменные
5. *Отдел Покрытосеменные:*
 - ❖ семейство Частуховые;
 - ❖ семейство Злаки;
 - ❖ семейство Осоковые;
 - ❖ семейство Лилейные;
 - ❖ семейство Сложноцветные;
 - ❖ семейство Розоцветные.



Виды семейства Розоцветные, занесенные в Красную книгу РМ.

- Спирея городчатая
- Спирея Литвинова
- Кизильник черноплодный
- Лапчатка песчаная
- Манжетка чамзинская
- Шиповник ржаво – красный
- Миндаль низкий, или бобовник



Спирея городчатая.

Статус: категория 2. Уязвимый.


Листопадный кустарник до 1 м высотой с тонкими побегами и мелкими листьями длиной 2 - 2,5 см. Листья продолговато-ланцетные или обратнойцевидные, на верхушке зазубренные. Молодые побеги и листья опушенные. Цветки мелкие, белые, пятичленные в щитковидных соцветиях. Тычинок много, пестиков 3 - 5. Плод — сборная 3-5-листовка.

В пределах ареала встречается на степных участках, сухих гривах в поймах рек. Вид светолюбив, морозостоек и засухоустойчив. Цветет в мае - июне, опыляется насекомыми. Семена созревают в августе - сентябре. Сравнительно быстро растущий кустарник, способный к интенсивному вегетативному размножению.



Распространение данного вида.

Восточноевропейско-западно-сибирский степной вид. Общее распространение: Средняя и Восточная Европа, Кавказ, Средиземноморье, Западная Сибирь, Средняя Азия (юг Казахстана). В респ. Мордовия произрастает Большеберезниковском, Дубенском, Кочкуровском районах в пойме р. Суры и на южных склонах в Ичалковском, Рузаевском, Лямбирском, Старошайговском, Ромодановском, Чамзинском р-нах и Октябрьском р - не Саранска. Отмечен во всех сопредельных регионах.



Меры по охране вида.

В результате распашки степных участков, регулярных весенних палов, усиленного выпаса и других видов землепользования нарушаются естественные условия произрастания.

- ❑ Охраняется в спроектированном Симкинском природном парке, памятнике природы «Левженский склон»;
- ❑ соблюдение режима ООПТ;
- ❑ Мониторинг за состоянием популяций. Организация новых охраняемых территорий. Необходима разработка методики интродукции этого степного кустарника в условиях ботанического сада Мордовского университета.
- ❑ В сопредельных регионах занесен в Красные книги Рязанской и Пензенской областей с категорией 3.



Спирея Литвинова.

Статус: категория 1.Исчезающий вид.


Летне-зеленый листопадный кустарник высотой до 1 м. Листья голые, ромбические, продолговато-ланцетные или обратнойцевидные, длиной 2 - 2,5 см. Побеги тонкие, неопушенные. Цветки в рыхлых щитковидных соцветиях, белые, мелкие. Плод – сборная листовка. Листовки голые или наверху пушистые.

Произрастает на сохранившихся степных участках, южных склонах. Вид светолюбив и морозостоек. Цветет в мае - июне, семена созревают в августе - сентябре. Размножается семенами при отсутствии задернения и излишнего уплотнения почвы. Обладает декоративными качествами. Необходимы исследования биологии и устойчивости вида в городских условиях. Отмечены небольшие группы особей, но численность сокращается.



Распространение вида.

Общее распространение: Средняя (Румыния) и Восточная Европа, Закавказье, юго-западные районы Европейской части России. В Мордовии достоверно зарегистрирован в Лямбирском и Рузаевском районах. На соседних территориях приводится только для Ульяновской и Пензенской областей. Вероятно, просматривается из-за сходства с предыдущим видом и будет найден в других пунктах.



Защита данного вида.

Лимитирующие факторы вида – это нарушение распашка, палы, чрезмерный выпас. Меры охраны.

- Охраняется на территории памятника природы «Левженский склон»;
- соблюдение режима ООПТ;
- поиск новых местообитаний и взятие их под охрану;
- разработка методики интродукции в ботанический сад Мордовского университета с целью сохранения генофонда мордовской популяции спиреи Литвинова;
- в сопредельных регионах вид включен лишь в Красную книгу Пензенской области с категорией 1.



Статус: категория 2. Условно-редкий вид. **Кизильник черноплодный.**


Летне-зеленый листопадный кустарник высотой до 2 м. Молодые побеги войлочно -опушенные, старые – голые, с красно-бурой корой. Листья яйцевидные с тупой или выемчатой верхушкой, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу светлые. Цветки в рыхлых кистях, мелкие, розовые, пятичленные. Плоды почти шаровидные, черные с сизым налетом. Мякоть плода мучнистая.

Неприхотливый к условиям произрастания, предпочитает карбонатные почвы. Цветет в мае, плоды созревают в августе. Размножается семенами и вегетативно. Светолюбив, холодостоек. На рыхлых почвах разрастается с помощью корневищ, на каменистых субстратах способен только к образованию поросли в основании ствола.



Местоположение вида.

Евразийский степной и лесостепной вид с широким ареалом. Общее распространение: Скандинавия, Средн. и Вост. Европа, Средиземноморье (Балканы), Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Япония, северо-восточный Китай, Средняя Азия. В Мордовии достоверно известен из Ардатовского и Большеберезниковского районов, а по старым сборам из поймы р. Алатырь близ Ичалковского района. В сопредельных регионах известен всюду, кроме Рязанской области и Чувашской Республики.



Защита данного вида.

Нарушение естественных местообитаний происходит в результате всех видов хозяйственной деятельности, палов, а также водной эрозии карбонатных обнажений, обусловленной естественными и антропогенными причинами.

- Охраняется в 2 ботанических памятниках природы в Большеберезниковском районе;
- соблюдение режима ООПТ;
- мониторинг состояния популяций;
- поиск новых мест обитания и организация их охраны;
- на соседних территориях занесен в Красную книгу Пензенской области с категорией 2.



Лапчатка песчаная.


Травянистое многолетнее растение с небольшим неутолщенным корневищем высотой 5 -15 см. Стебли восходящие, иногда почти лежачие, образующиеся из пазух прикорневых листьев. Листья пальчатые, нежесткие, как и стебли, с обеих сторон пепельно-серые от густого войлочного опушения, при этом верхняя сторона листа всегда более темная. Нижние листья пятипальчатые, верхние тройчатые; их листочки клиновидно-обратнояцевидные, кверху городчато-зубчатые, с каждой стороны имеют до 4 зубрин. Цветки желтые, в щитковидных соцветиях. Венчик, чашечка и подчашие из 5 листочков. Завязь верхняя. Плод – многоорешек.

Произрастает в сухих светлых лесах, на полянах и опушках остепненных сосновых боров, по песчаным надпойменным террасам и гривам. Предпочитает слобозадерненные участки с изреженным травяным покровом. Цветет с начала мая до начала июня. Размножается семенами и вегетативно - участками корневища, которые богаты таннидами, поэтому изредка используются для дубления кож.



Распространение.

Центрально-восточноевропейский лесной вид, спорадически распространенный по Средней и Восточной Европе от Скандинавии до севера Кавказа. В Европейской России встречается в бассейнах рек Волги, Дона, Камы, на запад до бассейна Днепра, Молдавии, Прикарпатья. В респ. Мордовия достоверно зарегистрирован только в Мордовском Присурье на территории Большеберезниковского и Дубенского р-нов. Встречается на всех сопредельных территориях, кроме Чувашской Республики.



Меры по защите.

Численность, пока стабильная (в окрестностях биостанции Мордовского университета наблюдается более 25 лет), ограничивается факторами: вырубка лесов и другие виды лесопользования, нарушающие места обитания вида, лесные пожары, затенение в результате зарастания другими видами, вытаптывание.

- Охраняется в Симкинском природном парке;
- соблюдение режима ООПТ;
- поиск новых и охрана всех известных мест обитания;
- на соседних территориях вид внесен лишь в Красную книгу Рязанской области с категорией 3.



Манжетка чамзинская.

Статус: категория 3. Редкий вид.

Травянистое многолетнее растение высотой до 30 см с тонким волокнистым корневищем. Стебли слабые, тонкие, приподнимающиеся, равные или слегка превосходящие по длине прикорневые листья, рыхло опушенные горизонтально отклоненными волосками. Прикорневые листья 1,5-3,5 см длиной и 3-6,5 см шириной, лопастные, нижние почковидные, верхние округлые, слегка волнистые, сверху зеленые, снизу сизо-зеленые. Стеблевые листья небольшие, короткочерешковые, полукруглые или широкопочковидные, верхние часто при основании клиновидные, 3-5 -лопастные, по краю зубчатые. Соцветие довольно узкое, из рыхловатых клубочков, цветоножки голые. Цветки мелкие – 2 -2,5 мм длиной и до 3 мм в диаметре, зеленые. Плод - многоорешек.

Произрастает по полянам и опушкам широколиственных лесов, расположенных на выходах карбонатов. Как и все манжетки – апомикт, т.е. растение, у которого зародыш развивается без оплодотворения. Цветет в июне - июле. В конце лета - начале осени может наблюдаться вторичное цветение. Плоды распространяются ветром.



Распространение и охрана вида.

Эндемик флоры Средней России, ранее известный только в Мордовии в Чамзинском районе. Недавно обнаружен сразу в двух пунктах: в Островском р-не Костромской области и в Серпуховском районе Московской области на территории Приокско-террасного заповедника. Труднодиагностируемый в полевых условиях, как и другие манжетки, вид.

Лимитирующие факторы – неясны, возможно, разрушение естественных местообитаний в результате выпаса, сенокошения, вырубки лесов.

Меры охраны:

- ✓ контроль за состоянием популяций;
- ✓ поиск новых местообитаний и при необходимости организация их охраны.



Шиповник ржаво – красный.

Статус: категория 3. Редкий вид.

Густоветвистый кустарник высотой от 50 см до 1,5 м с короткими ветвями. Шипы одинаковые, крупные, крючкообразные, сплюснутые, с довольно внезапно расширенным основанием, на некоторых ветвях с примесью обильных мелких прямых шипиков. Листья непарноперистые, с 5-7 мелкими округлыми листочками от 1,5 до 3 см длиной. Черешки листочков слегка опушенные, как и прилистники, сильножелезистые и с шипиками. Цветки розовые или красные, одиночные или в густых щитковидных соцветиях, на коротких цветоножках. Чашелистики перисто-надрезные или перисто-раздельные, вверх направленные, опадающие после окрашивания плодов. Плодики – твердые орешки, открытые в разрастающемся красном, кожисто-мясистом продолговатом или шаровидном гипантии.



Распространение вида.

Степной вид, распространенный в Средиземноморье, Атлантической и Средней Европе от юга Скандинавии до Северного Кавказа, встречается в Молдавии, Крыму, на Украине, северо-западе Нижней Волги и Дона. В Мордовии этот вид находится на северо-восточной границе ареала и известен по находкам С.Р. Майорова из Атяшевского и Ичалковского р-нов.



Меры по защите.

Лимитирующими факторами являются – вырубка лесов и распашка степных участков, выпас и прогон скота, лесные пожары, сбор на букеты, повышенная рекреация.

- Целесообразно объявить места произрастания вида ботаническими заказниками или памятниками природы;
- необходимы контроль за состоянием популяций и поиск новых мест обитания вида, особенно на востоке республики;
- проверка возможности культивирования вида в ботаническом саду МГУ им. Огарева.



Миндаль низкий, или бобовник.

Статус: категория 1. Исчезающий вид.




Листопадный кустарник высотой 0,5 - 1,5 м с прямостоячими голыми многочисленными укороченными побегами. Листья ланцетные или продолговато-овальные, темно-зеленые, голые, с пильчатым краем, расположены пучками на укороченных побегах, одиночно на удлиненных ростовых побегах. Цветки одиночные, розовато-красные, актиноморфные, до 2,5 см в диаметре, пятичленные, свободнолепестные, расположены на укороченных веточках. Плод – округло-яйцевидная сухая костянка с густым жестким опушением, длиной до 2 см и шириной 1,5 см. Семена горькие.



Распространение этого вида.

В пределах ареала произрастает на сохранившихся степных участках, по склонам балок. Образует чистые заросли или смешанные с терном, вишней степной. Цветет в конце апреля - начале мая до распускания листьев, поэтому в период массового цветения заросли кажутся ярко-розовыми. Всхожесть семян высокая, но они повреждаются мышами, во время палов, поэтому сеянцы в естественных условиях редки. Быстрорастущий степной кустарник, нетребовательный к почве и условиям увлажнения. Светолюбив, морозоустойчив.

Преимущественно европейско - западносибирский степной и лесостепной вид. Общее распространение: Средняя и Восточная Европа, северо-восток Средиземноморья, Северный Кавказ, юг Западной Сибири, северо-запад Средней Азии. В респ. Мордовия известны 2 местонахождения в Рузаевском и 1 в Ардатовском районах. Зарегистрирован во всех сопредельных регионах.



Лимитирующие факторы. Меры по охране.

Данный вид страдает от регулярных палов, при которых вместе с остатками прошлогодней травы погибают надземные побеги миндаля, но после этого быстро восстанавливается. Состояние популяции в Ардатовском районе требует современной ревизии. Также численность ограничивается по причинам: освоение склонов под дачные участки, выпас скота.

- Охраняется на территории памятника природы «Левженский склон»;
- соблюдение режима ООПТ, исключающего преобразование ландшафта;
- мониторинг состояния популяций;
- сохранение местообитаний;
- запрещение весеннего выжигания травы и выпаса скота;
- разработка методики и последующая интродукция вида в ботанический сад Мордовского университета;
- необходимо сохранение генофонда мордовских популяций;
- занесен в Красные книги Чувашской Республики с категорией 0, Рязанской и Пензенской областей с категориями 2 и 3 соответственно.

