



# *Животные Тамбовской области занесенные в Красную книгу*



Составитель:  
Дударева Н.В.

**Ходулочник – *Himantopus himantopus* Красная книга РФ. Редкий вид, имеющий в области низкую численность.**



**Кулик-сорока – *Haematopus ostralegus* Linnaeus, 1758.**  
**)**. Красная книга РФ. Вид, находящийся под угрозой  
**исчезновения.**



- Отряд: Ржанкообразные  
Семейство: Шилоклювковые -  
Категория: 3 - редкий в европейской части ареала  
Распространение: в гнездовой период наблюдался в Тамбовском районе - на прудах Бокинского рыбхоза и на Котовском водохранилище.

**Большой кроншнеп – *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758). Красная книга РФ. Сокращающийся в численности вид.**



**Европейский средний дятел - *Dendrocopos medius*  
(Linnaeus, 1758). Красная книга РФ. Редкий вид,  
имеющий в области низкую численность.**



**Серый сорокопут – *Lanius excubitor excubitor* Linnaeus, 1758. Красная книга РФ. Редкий вид, имеющий в области низкую численность.**



**Европейская белая лазоревка – *Parus cyanus* Pallas, 1770. Красная книга РФ. Редкий вид, имеющий в области низкую численность**



## **Авдотка**

**Отряд: Ржанкообразные Семейство: Ржанковые,  
Категория: 4 - вид с неопределенным статусом.**



Распространение: В начале XX в. обитала в Тамбовской области. На территории Бокинского рыбхоза был добыт один экземпляр. .  
Местообитания: Населяет степи полупустыни, пустыни, на северо-западе ареала - физиономические сходные ландшафты. Питается животной пищей. Один выводок в сезон, иногда 2. Возможны повторные кладки после потери яиц или даже птенцов. В кладке 1-3 яйца, обычно 2 (92% кладок). Насиживание 24-26 (до 27) дней, подъем молодых на крыло через 36-42 дня. Отмечено размножение на первом году, но более вероятно - не раньше, чем на 3 год. Максимальный возраст 15 лет 9 месяцев.



**Отряд: Соколообразные**  
**Семейство: Скопиные**  
**Категория: 3 - редкий вид**



Распространение: Летом встречен в Янковском лесничестве Мичуринского района, в Сокольниковском лесничестве Моршанского района, в Тамбовском районе. Местообитания: Населяет берега рек, озер. Гнездовой ареал лежит в пределах лесной зоны, местами захватывает облысённые поймы степных рек. . Откладывают 1-4, обычно 2-3 яйца. Причины гибели яиц - нарушение режима инкубации вследствие длительного беспокойства пары, загрязнение ядохимикатами. Недостаток пищи вызывает повышенную смертность птенцов. Среди слетков до 4 лет доживает в среднем 37%, до 8 лет - 17%, до 12 - 6-8%. Скопа - специализированный ихтиофаг, добывающий рыб средних размеров.

**Змееяд – *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1787). Красная книга РФ. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.**



**Орлан-белохвост – *Haliaeetus albicilla*  
(Linnaeus, 1758). Красная книга РФ. Вид, находящийся  
под угрозой исчезновения.**



**Скопа – *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758). Красная книга РФ. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.**



**Белоглазый нырок (чернеть) – *Aythya nyroca*  
Güldenstädt, 1770. Красная книга РФ. Сокращающийся в  
численности вид.**



**Русская выхухоль – *Desmana moschata* (Linnaeus, 1758). Красная книга РФ. . Вид, находящийся под угрозой исчезновения.**



# Литература:

<http://www.voroninsky.ru/>

**Спасибо  
за  
внимание!**