

КРАСНАЯ КНИГА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ



**Редкие и
исчезаю
щие
грибы**



Цель работы



Познакомиться с редкими и исчезающими видами грибов, занесенными в Красную книгу Ярославской области.



Лепиота луговая

Плодовое тело в виде шляпки и ножки. Шляпка плоско-выпуклая, с небольшим бороздчатым краем.

Бороздки шляпки бахромчатый. Ножка короткая, белая. Запах приятный, сладковатый.

Сапротроф. Обитает в светлых

широколиственных и смешанных лесах, на лугах, пастбищах, в парках, огородах.



Плодовые тела образует в июле-

Плютей петасатус




Плодовое тело в виде шляпки и ножки. Шляпка толстомясистая, почти плоская, с небольшим центральным возвышением, серовато-белая. Ножка беловатая. Ксилосапротроф. Растет на пнях и валеже б... на древесных о... Плодовые т... в июне-августе...



Рядовка опоясанная

Плодовое тело в виде шляпки и ножки. Шляпка вначале выпуклая, затем плоская, с центральным возвышением, серая или серо-коричневая. Ножка беловатая. Мякоть желтеет на срезе. Запах и вкус мучной.

Микоризообразователь; встречается в симбиозе с соснами.




Плодовые тела образует в августе-сентябре.

Дубовик обыкновенный, поддубник




Плодовое тело в виде шляпки и ножки. Шляпка выпуклая, подушковидная темно-бурая. Ножка цилиндрическая, утолщенная желтая с красноватым оттенком. Микоризообразователь. Обитает в широколиственных и смешанных лесах. Плодовые тела образует в июне =



Осиновик белый,


ПОДОСИНОВИК БЕЛЫЙ

Плодовое тело в виде шляпки и ножки. Шляпка выпуклая, полушаровидная белая или грязно-белая. Ножка книзу утолщенная, часто изогнутая, белая. Мякоть плодового тела белая на разрезе, быстро окрашивается в розовый цвет, затем окраска становится серой или черно-бурой. Растет в березовых песках




Плодовые тела образует в июле-

Гиропорус каштановый, каштановик



Встречается в симбиозе с широколиственными породами деревьев, а также с березой и сосной. Обитает в хвойных, смешанных и широколиственных лесах, часто на опушках, предпочитает песчаные почвы. Плодовые тела образует в июле-августе. Съедобен.





Гиропорус синеющий, синяк

Редкий вид. Мякоть плотная, белая, на разрезе быстро синеет. Без особого вкуса и запаха.

Обитает в хвойных, лиственных и смешанных лесах, предпочитает песчаную почву.

Плодовыи образует в августе. Съедобен.




Мутинус Равенеля



Встречается исключительно в посещаемых людьми местах. Сапротроф на гумусе. Споры распространяются мухами. Обитает в смешанных и хвойных лесах рядом с жильем, в парках, садах, на богатой гумусом и органическими остатками почве.

Плодовые тела образует в июле-октябре



Ганодерма блестящая, лакированный трутовик



Плодовые тела однолетние. Шляпка полукруглая, покрыта толстой блестящей, как бы лакированной коркой. Ткань шляпки и ножки белая.

Ксилосапротроф и факультативный паразит.


Вызывает белую гниль. Растет на сухостое,

Гериций коралловидный, ежевик коралловидный

Относится к видам с декоративными плодовыми телами. Ткань белая, мясистая, слабогорькая, без особого запаха. Ксилосапротроф. Растет на пнях и валеже лиственных пород деревьев, иногда в дуплах живых деревьев. Произрастает в



Клавариадельфус пестиковый, или рогатик пестиковый



Плодовые тела булавовидные желтые или рыжеватые. Ткань плотная, белая, на изломе окрашивается в пурпурно-буроватый цвет, имеет слабый грибной запах и горьковатый вкус. Плодовые тела появляются в августе-сентябре. Несъедобен.



Паутинник фиолетовый

Плодовое тело в виде шляпки и ножки. Шляпка полушаровидная, ножка булавовидная. Мякоть фиолетовая, со слабым запахом кедровой древесины. Произрастает в хвойных и лиственных лесах. Плодовые тела образует в августе-сентябре. Съедобен.



Феолепиота золотистая, чешуйчатка травяная



Плодовое тело в виде шляпки и ножки. Шляпка выпуклая, гладкая, ножка цилиндрическая. Мякоть белая или желтоватая. Запах сильный, цианидный, вкус мягкий. Встречается в лиственных и смешанных лесах.



Плодовое тело

Грифола зонтичная, трутовик разветвленный, полипорус

ЗОНТИЧНЫЙ

Плодовые тела
однолетние, состоящие из
ветвистых, несущих
маленькие шляпки, белых
ножек, соединенных у
основания в общий
клубневидный пенек.

Факультативный паразит
и ксилосапротроф.

Вызывает белую гниль.

Обитает в лиственных и
смешанных лесах.



Плодовые тела образует в июне-августе, но
не ежегодно. Съедобен.



КРАСНАЯ КНИГА
ПРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ



Берегите грибы

