

Красная книга Республики Коми. Птицы

Экологическое воспитание

Автор: Коснырева Людмила Васильевна,
учитель химии и биологии
МБОУ «СОШ» с. Гурьевка

с. Гурьевка, 2015 г.

Презентация предназначена для детей в возрасте 11-14 лет и может использоваться при изучении Класса «Птицы» в учебном предмете «Биология. 7 класс», а также на кружках экологической направленности.

Переход на следующий слайд презентации осуществляется по щелчку.

Птицы – класс высших наземных позвоночных, приспособившихся к полету. Генетически близки к рептилиям, но имеют более развитую нервную систему и поведение, постоянную температуру тела, а, следовательно, более высокий обмен веществ. Птицы (большинство видов) способны к воздушному полету, они высиживают яйца и выкармливают свое потомство. Оплодотворение внутреннее. Зародыш в яйце развивается в яйцевых оболочках. Кожа у птиц сухая, практически лишена желез. Внешние покровы образуют перья. Благодаря указанным особенностям, птицы расселились по всему земному шару и класс насчитывает около 40 отрядов и 9200 видов. Около 250 видов птиц встречается в Республике Коми, из них 33 вида занесены в Красную книгу Республики Коми.

Европейская чернозобая гагара



- Крупная птица величиной с небольшого гуся. На поверхности воды ее тело кажется плоским, шея длинной, клюв тонким. Особи обоих полов окрашены одинаково. На черной спине поперечными рядами расположены белые пятна. У молодых птиц спина без белых пятнышек, но со светлыми каймами. Весь низ белый. Клюв и ноги черные.
- В Европейской части России распространена от арктических островов к югу до Новгородской и Вологодской областей. В таежной зоне Республики Коми обитает на крупных озерах, на пролете отмечена в бассейнах всех речных систем и на крупных озерах.
- Общая численность птиц в Республике Коми не известна. Плотность населения в оптимальных местообитаниях варьирует от 0.2 до 0.4 особей на 10 км².

Красношейная поганка



- Птица небольших размеров. Длина тела составляет 31-38 см, масса тела – 300-500 г. Особи обоих полов окрашены одинаково во все времена года. Для брачного оперения характерна красновато-каштановая окраска шеи, черные щеки и пучки рыжих перьев на голове. На крыле два белых пятна. Клюв прямой (не вздернут вверх), черновато-серого цвета с желто-красным кончиком. Голос свистящий или крякающий и слышен только во время тока, в другое время птицы молчаливы.
- В Евразии вид распространен от Скандинавии на восток до Камчатки. Прилетает довольно поздно, в мае. В Республике Коми отмечается на пролете и изредка на гнездовании. Охраняется в Печоро-Илычском заповеднике и Национальном парке «Югыд ва».

Большая поганка, чомга



- Птица средних размеров. Длина тела около 95 см, крыла – 18 см, масса – до 1.5 кг. В брачном оперении верх головы и большие в виде рогов пучки перьев по бокам головы – черные, остальная голова белая. Шея окружена ржаво-бурым, по бокам черным воротником. Спина и крылья коричнево- бурые. Низ атласно-белый, с ржаво-бурыми пятнами на боках. Клюв красноватый, ноги зеленовато-бурые. Самка похожа на самца, но меньше его зимой. Пучки перьев на голове и воротник у нее менее развиты. Молодые птицы не имеют хохолка и воротника.
- В Республике Коми проникает на север до Печоро-Илычского заповедника. Гнездится на оз. Дон-ты, изредка на оз. Синдор. Зимует на Черном и Каспийском морях и южнее.
- В благоприятные для размножения годы число гнездящихся пар может достигать 12-16, численность – до 40 особей.

Выпь



- Птица средних размеров, масса тела достигает 1.9 кг, размах крыльев – 135 см. Общая окраска пестрая, верх головы черный, перья затылка удлинены, а их вершины имеют охристый оттенок. Бока головы и шеи желтовато-охристые. От угла рта тянется темно-рыжая полоса. Передняя часть спины и плечи с темными крупными пятнами. Задняя часть спины, верхние кроющие перья крыла и хвоста, рулевые перья охристо-рыжие с крапинками. Горло и шея спереди светло-охристой окраски, посередине с более темной полосой, которая проходит и на зоб. Брюхо с широкими продольными полосами, клюв и ноги зеленовато-желтые.
- Распространен в Центральной и Восточной Европе, в Сибири. В Республике Коми гнездятся 7-10 пар. Болотные системы в районе оз. Дон-ты, являющиеся местами обитания вида, охраняются. (.

Малая выпь



- У взрослого самца низ головы, спина, хвост, плечевые и маховые перья темно-бурого цвета с зеленоватым отливом. На боках груди расположено по пучку бурых перьев с желтоватыми краями. Остальное оперение глинисто-охристого цвета. Клюв желтый, ноги желто-зеленые. У самки бока головы и шея рыжие. На горле и шее – с наствольными пятнами. Длина взрослой птицы составляет около 40 см, крыла – 14-16, хвоста – 5 см.
- Гнездится в Европе к северу до Балтийского моря, на Кавказе, в Закавказье, юго-западной и средней Азии. В северной Африке ведет оседлый образ жизни. Европейские особи зимуют в Африке, залетая до ее южной части.
- В Республике Коми дважды отмечали в середине июня и октябре в Печоро-Илычском заповеднике. Регулярно гнездится в пределах озерно-болотной системы Дон-ты. Возможно, гнездящихся птиц наблюдали у с. Ношуль на болоте у зарастающей старицы р. Луза.

Краснозобая казарка



- Небольшой гусь, с массой тела до 1.7 кг и размахом крыльев до 130 см. Ярко окрашенная птица: верх головы, спина и передняя часть брюшка и хвост черные, бока и подхвостье белые. На уздечке белое округлое пятно. Позади глаза большое рыжее пятно. Бока шеи и зоб темно рыжие и окаймлены белой полосой. Клюв и лапы черные.
- Места зимовки расположены на юге Азии.
- В южных районах Республики Коми регулярно отмечаются одиночные особи, пары или небольшие группы казарок отдельно и в стаях других видов гусей во время весеннего пролета.

Серый гусь




- Крупный гусь весом до 4.5 кг и размахе крыльев до 180 см. От других гусей отличается общим серым окрасом, серебристо-серыми кроющими перьями крыла, белыми и черными полосками на боках тела, розовыми лапами и клювом. Надхвостье белое.
- В России к югу вид распространен до Черного моря, низовий Волги, южного Прибайкалья и Забайкалья.
- В Республике Коми отмечен в гнездовое время в бассейнах Выми и Верхней Вычегды. Залеты вида регистрировали в Троицко-Печорском районе на р. Волосница, дважды отмечали на пролете в Интинском районе на болотах долины рек Малая Инта и среднего течения р. Косью.

Пискулька



- Внешне похож на белолобого гуся. От него отличается меньшими размерами, белое пятно на лбу относительно больше и захватывает верх головы между глазами. Верхняя часть спины буровато-серая, поясница аспидно-серая. Зоб, грудь и бока тела буро-серые со светлыми каймами перьев, на груди неправильные черные пятна, брюшко и подхвостье белые, рулевые перья хвоста черные с белыми вершинами и боковыми каймами. Клюв розово-телесного цвета, ноготок беловатый, лапы оранжевые. Вокруг глаза голое припухлое кольцо лимонно-желтого цвета, радужина глаза – темно-ореховая. Клюв розово-серый, лапы грязно-желтые.
- Распространена в Северной Евразии от Норвегии до Чукотки. Во время сезонных миграций пискульку ежегодно регистрируют на пролете в бассейнах рек Вычегда, Сысола и Печора.
- В Республике Коми численность пискульки не превышает 200-300 особей, гнездятся 40-80 пар.

Лебедь-кликун



- Большая, сплошь белая птица, молодые особи – серо-дымчатые. Основание клюва от верхних краев ноздрей желтое, остальная часть клюва окрашена в черный цвет; у молодых птиц желтый цвет заменен грязно-красноватым. Среди других лебедей на воде отличается тем, что держит шею прямо вверх, а голову под прямым углом к шее. Лапы у старых птиц черные, у молодых – грязно-желтые или красноватые.
- Распространен в Евразии от Скандинавии до Камчатки и Охотского моря, в Англии, Исландии.
- В Республике Коми – в лесотундре и таежной зоне, чаще встречается в бассейне р. Печоры.

Малый лебедь



- Внешне сходен с кликуном, но отличается меньшими размерами. Клюв окрашен в черный и желтый цвета, у каждой птицы они имеют индивидуальный рисунок. Лапы черные.
- Распространен в тундрах Евразии от Кольского полуострова до Чукотки. Во время сезонных миграций встречается в бассейнах Вычегды, Сысолы и Печоры.
- Плотность населения птиц на территории Республики Коми в типичных местообитаниях – 0.1-0.2 особи на 10 км².

Скопа



- Довольно крупная птица. Размах крыльев достигает 170 см, вес – до 2 кг. От других пернатых хищников отличается контрастной окраской. Верх тела, крыльев и хвоста темно-бурый, низ – белый с «ожерельем» из темных пестрин поперек зоба. Голова белая с широкой черной полосой, проходящей через глаз. Самцы и самки окрашены одинаково.
- Встречается по всему миру, кроме Антарктиды. В Республике Коми встречается в бассейнах Печоры, Вычегды и Мезени от южных границ средней тайги до северного предела распространения высокоствольных лесов. Основное гнездовое население вида сосредоточено на крупных правобережных притоках Печоры в темнохвойных предгорьях Северного и Приполярного Урала, а также на севере Печорской низменности и прилегающих отрогах Тиманского кряжа.

Осоед



- Хищная перелетная птица средних размеров с размахом крыльев 135-150 см, весом до 1 кг. Характерна маленькая голова, относительно узкие крылья и длинный закругленный хвост с широкой вершинной темной полосой. Отличительный признак – жесткие закругленные перышки вокруг клюва. Окраска тела, особенно его нижней стороны, очень изменчива. Более обычны темно-бурые особи, реже встречаются светло-охристые и рыжие птицы. Самцы отличаются от самок пепельно-серой головой.
- Населяет большую часть Европы и запад Азии. В Республике Коми проходит северо-восточная граница европейского ареала вида. Встречается в южной половине республики. Гнездовые находки известны для равнинной части бассейна Верхней Печоры.

Болотный лунь



- Птица с длиной тела 53-59, крыла – 40-43, хвоста – 23-26 см. У взрослых самцов перья головы охристые с темными наствольями, спины – темно-бурые с ржавчатыми каймами, плечевых – темно-бурые с поперечным рисунком, надхвостье бурое. Первые пять маховых перьев черные с белым основанием, остальные серо-сизые. Горло беловатое, низ тела буровато-рыжий. Взрослая самка крупнее самца. Перья головы и шеи светлее, спины темнее – шоколадно-бурого цвета.
- Вид населяет Евразию от Атлантического океана к востоку до Приморья.
- Перелетный вид. Гнездится на крупных озерно-болотных системах. На озере Дон-ты ежегодно занимает территорию с зарослями кустарниковой ивы и тростника, подтопляемую весной. В Республике Коми в благоприятные годы возможно гнездование 6-8 пар в бассейнах рек Вычегда, Луза и Кобра.

Беркут



- Крупный орел с размахом крыльев 180-240 см, весом 4-6 кг. Оперение большинства особей темно-бурое, на голове охристые или золотисто-каштановые перья. Взрослый наряд приобретают только на шестом году жизни.
- Ареал вида охватывает Евразию, Северную Америку, север Африки.
- Современные учетные данные по Республике Коми имеются на охраняемых территориях Северного и Приполярного Урала и прилегающего Предуралья, а также в бассейнах Вычегды (две пары), Ижмы (две пары), Пижмы (одна пара), Выми (две пары), Мезени (две-три пары) и Усы (одна-две пары).
- Охраняется в Печоро-Илычском заповеднике, Национальном парке «Югыд ва», в ряде комплексных, лесных и болотных заказников республиканского значения .

Орлан-белохвост



- Самый крупный из гнездящихся в регионе пернатых хищников. Размах крыльев 200-250 см, вес до 7 кг. Характерная особенность силуэта летящей птицы – длинные и широкие «прямоугольные» крылья, относительно небольшая голова, широкий короткий хвост клиновидной формы. У взрослых особей хвост чисто-белый. Клюв массивный, желтого цвета. Наблюдаются значительные индивидуальные вариации окраски оперения. Основной фон чаще всего бурый, голова и передняя часть корпуса, особенно у старых птиц, гораздо светлее. Окончательный наряд птицы приобретают на 5 году жизни.
- Ареал вида охватывает почти всю Евразию и часть Гренландии. Гнездовое население практически целиком сосредоточено в бассейне Печоры. В конце прошлого столетия отмечался на гнездовании в среднем течении Вычегды.

Кречет



- Крупный сокол. Самка крупнее и обычно темнее самца. Вес самца до 1.3, самки – 2.1 кг, крыло самцов длиной 35-38 см, самок – 38-41, размах крыльев 125-160 см. Общая окраска светлая, с более или менее развитым поперечным рисунком из пятен или полос. Голова сверху темно-серая, спина серо-сизая. Низ тела более светлый, с оттенком от белого до кремового цвета. Клюв бурый, лапы желтые.
- Распространен от Кольского полуострова до Камчатки, в Скандинавии, Исландии, Гренландии, Северной Америке.
- На гнездовании в пределах республики отмечен на Приполярном и Полярном Урале, в бассейнах рек Большая Роговая, Адзьва, Колва, Лая, Шапкина, верховьях Усы. Места гнездования сохраняются в Национальном парке «Югыд ва».

Сапсан



- У самца перья головы черноватые, спины – темно-сизые. «Усы», перья на щеках и позади глаз черные. Низ тела беловатый с каплевидными пятнами, на боках с сизоватым налетом и поперечными темными полосами. Самки имеют более темную окраску, низ тела рыжеватый, размеры крупнее, чем у самцов. Длина тела у сапсанов составляет 40-53 см, крыла самцов – 29-33, самок – 35-37 см.
- Населяет Евразию, Африку, Америку, Австралию, Великобританию, острова Северного Ледовитого океана.
- В Республике Коми гнездится на западных склонах Северного и Приполярного Урала, у станции Сивая Маска, ст. Собь – на Полярном Урале. В верховьях р. Печора встречается в течение всего бесснежного периода, но на гнездовье не найден. Зимует в южной и центральной Европе и на Среднем Востоке.

Кобчик

- Птица с длиной тела 30-32, крыла – 23-25.5, хвоста – 14-15 см. Взрослый самец темно-пепельно-сизой окраски с рыжими «штанами», брюхом и нижними кроющими перьями хвоста. Клюв с желтоватым основанием. Восковица, кольцо вокруг глаз и ноги ярко-кирпично-красные. Взрослая самка сверху пепельно-серая с темными поперечными полосами на спине, крыльях и хвосте. Темя, шея и низ ржавые.
- Распространен в Евразии от Австрии до Алтая.
- В Республике Коми на гнездовании найден в бассейне р. Сысола, верховьях рек Печора и Мезень, в долинах горных рек на Северном и Приполярном Урале. Встречен летом и в период кочевок в окрестностях городов Ухта, Воркута, с. Кослан.



Перепел



- Небольшая птица с массой тела 80-150 г, размахом крыльев до 35 см. Общая окраска самцов и самок рыжевато-бурая с продольными полосками, на темени одна светлая продольная полоса.
- Вид распространен от островов Атлантического океана через всю Евразию до Северного Китая, Японии и Кореи.
- В Республике Коми северная граница области регулярного гнездования проходит по бассейнам рек Сысола и Вычегда, верховьям р. Ижма.
- Основными местами обитания в Республике Коми являются луга в поймах рек и на надпойменных террасах, мелиорированные луга, поля с зерновыми и многолетними культурами. Птицы в большей степени активны в сумеречное время.

Серый журавль



- Перья туловища серые. Затылок, горло и низ шеи черно-серые. Бока головы, спинная сторона шеи – белые. Уздечки и темя без перьев покрыты черной кожей и черными щетинками. На задней части темени – голая бородавчатая кожа кирпично или темно-красного цвета. Летом верхняя сторона тела буроватая или охристо-бурого цвета. Клюв зеленовато-бурый, ноги черные, глаза красные или красно-бурые.
- Распространен от Скандинавии до Алтая.
- В Республике Коми к концу столетия было до 700-800 гнездящихся пар. С 2002 г., после катастрофической гибели кладок в зоне тайги в Республике Коми из-за возврата морозов в период откладки яиц и насиживания, численность оценивается в 400-450 гнездовых пар, а общая численность составляет 950 особей.

Коростель



- Небольшая птица, размером немного крупнее дрозда. Вес тела в зависимости от сезона варьирует от 80 до 200 г, размах крыльев достигает 50 см. Оперение спины темно-бурое, перья с охристыми каемками по краям и серыми на вершинах, горло светлое, грудь, зоб и бока тела охристо-рыжие. Перелетный вид.
- Распространен от Франции до верховий р. Лена.
- В Республике Коми на пойменных лугах долины р. Сысола плотность птиц варьирует от 0.8 до 22, р. Вычегда – в среднем составляет 0.4 особи на 1 км².

Камышница



- Птица с длиной тела 30-35 см, крыла самцов – 16-19, крыла самок – 16-18 см. Весной оперение головы и шеи птиц черновато-серого цвета с белыми продольными пятнами по бокам тела, остальной верх – темно-оливково-бурый. Подхвостье черное с белыми длинными перьями. Лобная лысина и клюв ярко-красные, ноги зеленые с красным кольцом на вершине голени. Осенью верх рыжее, белые пятна по бокам тела и на подхвостье более развиты.
- Гнездящийся перелетный вид. Распространен повсеместно. Наиболее северные находки в Волжско-Камском крае: район Яранска и устье р. Белая; озерно-болотная система Дон-ты и пойма среднего течения р. Вычегда, где с 1970 г. камышницу встретили дважды (1986 г., 1995 г.). Молодая птица отмечена осенью на р. Пижма.

Лысуха

- Птица с длиной тела 37-42 см, крыла самок – 19.5-21.5 см, самцов – 20-23.5, хвоста – 5-6 см. Взрослая птица серовато-черная с более светлым низом и более темными головой и шеей. На крыле беловатая полоса. Клюв с красноватым основанием и белой вершиной. Лобная лысина белая. Ноги грязно-зеленовато-бурые с оранжевой пяткой.
- Распространена в Австралии, Тасмании, Новой Гвинее, Шри-Ланке, северо-западной Африке.
- В Республике Коми единственная находка на озерно-болотной системе Донты в среднем течении р. Вычегда.



Кулик-сорока



- Крупный кулик с контрастным черно-белым оперением. Длина тела составляет 40-46 см, крыла – 23-28 см, размах крыльев – 80-86 см, масса тела – 400-600 г. Самки и самцы окрашены одинаково, Голова, зоб, спина и конец хвоста черные, остальные части тела белые. Молодые птицы отличаются от взрослых бурым верхом, светлыми каемками на перьях, отсутствием белого горлового пятна, темным клювом, с грязно-оранжевым основанием, бурыми ногами и глазами. Очень крикливы. Голос громкий и звонкий.
- Обитает в Евразии, Америке, Африке, Австралии.
- В Республике Коми немногочисленный гнездящийся и редкий пролетный вид. Отмечен в бассейнах рек Печора, Вычегда, Сысола, Лепъю, Нившера, Вишера, Летка, Луза, Илыч, Волосница, Мезень, Седью, Северная Мылва, Сойва.

Дупель



- Окраска пестрая. Сверху буровато-черная с тремя узкими ржаво-желтоватыми полосами на голове и поперечными извилистыми полосами и каймами по верху туловища. Горло беловатое. Низ испещрен поперечными, угловатыми темными пятнами по охристо-буроватому фону на горле и грязно-беловатыми снизу тела. Маховые перья черно-бурые. Хвост имеет 7-9 чаще 9 пар рулевых перьев, из них три крайних почти целиком белые. Длина тела составляет 23.5-28, крыла – 12-15, клюва – 6-7.5, хвоста – около 6 см. Масса тела – 170-311 г, в среднем 200 г.
- Распространен от Скандинавии до бассейна р. Енисей. Гнездящийся перелетный вид. В Республике Коми имеет широкое распространение.

Большой веретенник



- Голова, шея, зоб и верх груди рыжие. Верх головы с темно-бурой продольной полосатостью. Низ головы и бока с поперечными бурыми полосами. Мантия черно-бурая с рыжими поперечными полосами и пятнами. Кроющие перья крыла серовато-бурые, маховые – черно-бурые, второстепенные перья с широким белым основанием. Рулевые – черные, у основания белые. Брюхо и нижняя сторона крыла белые. Самка крупнее самца, меньше рыжих тонов. Ноги черные. Зимой мантия дымчато-бурая. Длина крыла самцов составляет 19.6-24, самок – 20-23 см; клюва самцов – 8-13, самок – 9-13 см. Масса тела 253-353 г.
- Гнездящийся перелетный вид. В республике Коми встречается в бассейнах рек Вычегда, Сысола, Луза.
- Зимуют в Африке и в районе Средиземного моря.

Белая сова



- Крупная сова преимущественно или чисто-белой окраски. У самок темные пестрины есть почти на всем оперении, у самцов голова и нижняя часть тела всегда белые, иногда совсем без пестрин. Размах крыльев составляет до 183 см, масса тела – до 3 кг.
- Область гнездования охватывает тундры Северного полушария. В 1988 г. плотность гнездования белых сов на крайнем северо-востоке Республики Коми составляла 15.6-20 пар на 100 км². Более поздних сведений о численности вида в регионе нет.

Филин



- Самая крупная из европейских сов. Размах крыльев 160-190 см, вес 2-3.3 кг. Характерные особенности внешнего вида – рыжеватая или охристая окраска, большая голова с хорошо выраженными «ушами» и оранжевые глаза. Наблюдаются значительные индивидуальные отличия в окраске. В Республике Коми обитают преимущественно светлые филины.
- Ареал охватывает всю Евразию, кроме ее крайнего севера, и север Африки. В Республике Коми населяет всю таежную зону. Местообитания вида сохраняются в Печоро-Илычском заповеднике, Национальном парке «Югыд ва» и комплексном заказнике «Уньинский».

Серая неясыть



- Крупная сова, значительно крупнее вороны. Масса тела птицы достигает 700 г., размах крыльев – 105 см. Общий тон окраски сероватый или рыжий, с выраженными продольными и поперечными пестринками на голове и затылке, на спине мелкая густая рябь. Брюшная сторона светлее. Лицевой диск сероватый с более темными пестринками, отграничен от шеи полосой из темных бурых пятен.
- Ареал вида охватывает северо-западную Африку, Евразию от Скандинавии до Дальнего Востока, Крым, Кавказ, Среднюю Азию.
- Редкий, отмечающийся не ежегодно вид. В долине рек Вычегда и Сысола плотность популяции серой неясыти в характерных для нее местообитаниях не превышает 0.1 особи на 1 км².

Длиннохвостая неясыть



- Крупная птица с размахом крыльев до 134 см, массой тела до 1.3 кг. Окраска серая с многочисленными продольными темными и светлыми пестринами. От других крупных сов отличается длинным хвостом, далеко выступающим за концы сложенных крыльев и черными глазами. Окраска самца и самки сходная, но последняя заметно крупнее.
- Ареал вида охватывает всю лесную зону Евразии. В Республике Коми населяет таежные леса от южной до северной подзон, а также западные склоны Северного и Приполярного Урала.
- В последнее десятилетие в районе Печоро-Ильчского заповедника ежегодно регистрировали от 1-6 визуальных встреч одиночных птиц. В 2005 г. отмечен первый случай успешного размножения длиннохвостой неясыти в равнинном участке заповедника.

Бородатая неясыть



- Крупная сова, уступающая по размерам только филину. Размах крыльев составляет 130-158 см, масса тела самцов до 1.1, самок – до 1.9 кг. Окрас дымчато-серый с многочисленными темными и светлыми пестринами. Характерные отличия – четкие концентрические круги на лицевом диске, желтые глаза и черная «борода» под клювом.
- Населяет леса северных и умеренных лесов Евразии и Северной Америки. В Республике Коми отмечена в бассейне р. Печоры.

Обыкновенный серый

сорокопут



- Птица размером с дрозда, с длинным ступенчатым хвостом. Длина тела составляет 23-28 см, крыла – 11-13 см, размах крыльев – 35-39 см, масса тела – 60-80 г. Верх тела самца пепельно-серый, надхвостье беловато-серое, низ белый; через глаз проходит широкая полоса черного цвета; хвост черный с различным развитием белого цвета на боковых перьях; глаза коричневые, клюв и ноги черные. Самка похожа на самца и обычно лишь немного темнее, бывают самки с темным чешуйчатым рисунком по низу тела. Молодые особи похожи на самку, но темнее, с чешуйчатым рисунком как снизу, так и сверху. Голос – грубый, напоминает сорочий. Песня – набор строф из песен других птиц.
- Прилетает в апреле-мае. Отлет в сентябре-октябре. Южные популяции оседлы, северные мигрируют на юго-запад и зимуют в средней полосе Европейской части России, Крыму, на Кавказе, в Малой и Средней Азии, Европе.
- Общая численность на территории Республики Коми в пределах ареала неизвестна.

Соловей-красношейка



- Верх тела самца оливково-бурый с темной шапочкой, низ беловатый, грудь аспидно-серая, бока буроватые. Щеки и надглазные полосы белые, уздечка черная. Горло металлически блестящего, рубиново-красного цвета, окаймленные снизу и с боков черной и черно-бурыми узкими полосками. В окраске самки преобладают бурые оттенки, горловое пятно бледно-бурое. Клюв черный, ноги бурые. Длина тела составляет около 16 см, крыла – 7-8, хвоста – 5-6 см.
- В Республике Коми в Предуралье и на Северном Урале в период размножения исключительно редок, встречается в конце лета.



**Спасибо за
внимание!**



Источник литературы:

<http://ib.komisc.ru/add/rb//images/2684.jpg>