

ПРИРОДНЫЙ ПАРК "ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ"

**ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ
ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ**



природа - наше будущее...

ВИДОВОЙ СОСТАВ ПТИЦ
ПРИРОДНОГО ПАРКА «ПТИЧЬЯ
ГАВАНЬ», ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ.

ХОХЛАТАЯ ЧЕРНЯДЬ

Утка средних размеров,
длина составляет 40-47 см,
размах крыльев 65-72 см,
вес 550—746 г.

Телосложение коренастое, с узкой шеей и относительно большой головой. В брачном наряде оперение самцов в основном чёрное, но с белоснежно-белыми боками, брюхом и «зеркалами» на крыльях. Перья на голове имеют синевато-зелёный оттенок. Голова округлая; **клюв** широкий и короткий, голубовато-серый с, как правило, тёмным окончанием. **Радужная оболочка** жёлтая. На затылке имеется свисающий хохолок, хорошо заметный у самца во время брачного периода. Ноги серые.



СЕРАЯ УТКА



Серая утка — широко распространённая и многочисленная птица семейства утиных. Гнездится в степных, лесостепных, отчасти лесных районах Евразии и Северной Америки. Обыватели довольно часто принимают этот вид за самку кряквы, шилохвости и других обычных северных уток, поскольку у самцов отсутствуют яркие, бросающиеся в глаза детали оперения. Между тем селезень в брачном наряде имеет характерные черты, по которым его нетрудно отличить от других видов.

КРАСНОГОЛОВЫЙ НЫРОК



Красногóловый нырóк— нырковая утка средней величины, распространённая в умеренных широтах Европы и Сибири, а также в небольшой области на севере Африки. Наибольшей численности достигает в полосе лесостепей и в южной части зоны лесов. Гнездится по берегам крупных водоёмов с обширными плёсами открытой воды, где часто встречается смешанными стаями в компании с хохлатой чернетью. Зимует в Западной и Южной Европе, Африке, Японии и тропической Азии. Объект промысловой и спортивной охоты.

ЛЕБЕДЬ



Оперение лебедей по своей окраске бывает либо чисто белого, либо серого или чёрного цвета. Самок и самцов внешне весьма трудно различить. Лебедей от гусей отличает более длинная шея, позволяющая в более глубоких водах обыскивать дно в поисках пищи, а также их величина, по которой они являются самыми крупными водными птицами. Размах их крыльев достигает двух метров, а масса может превышать 15 кг. Лапы довольно короткие, из-за чего лебеди, передвигаясь по земле, производят несколько неуклюжее впечатление. Зато у них очень развитая летательная мускулатура, позволяющая им преодолевать тысячи километров при ежегодных перелётах на юг и обратно.

Потомство выращивается обоими родителями, опекающими детёнышей в течение 1—2 лет после рождения.

Серая утка

Водоплавающая птица из семейства поганковые
Распространена в северном полушарии, большей частью в зоне лесов, но также местами проникает к северу до кустарниковой тундры и к югу до пустынь. Неприметная птица, встречается одиночными особями или парами, на гнездовьях редко образует рыхлые колонии. Гнездится на небольших заросших водоёмах, где большую часть времени проводит в тени надводной растительности — разреженных зарослях тростника, осоки и т. п. При беспокойстве пытается затаиться среди травы или, нырнув, удалиться. Сезон размножения растянут во времени, в южной части ареала — с апреля по июль, в северной — с мая по август. В кладке обычно 3—4 белых яйца. Перелётная птица. Зимует в незамерзающей части моря, где при несильном волнении добывает корм на относительно небольшой глубине, а также в небольшом количестве на незамерзающих озёрах.

поганка достигает в длину 40—50 см, размаха крыльев 77—85 см, массы 692—925 г.



КРАСНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА.



Внешний вид.

Длина тела достигает 20—22 см, масса — 300—570 г. Весной и летом голова чёрная с пучками рыжих перьев над и за глазами, шея и бока рыжие. Осенью и зимой общая окраска светлая, на голове тёмно-серая шапочка, шея спереди белая. Клюв прямой, чёрный со светлым кончиком. Плывающая птица держит голову чуть откинутой назад.

ЧАЙКА

Чайки — наиболее многочисленный род птиц семейства чайковых, обитающих как на морских просторах, так и на внутренних водоёмах. Многие виды считаются синантропными — они живут вблизи человека и получают от этого выгоду.

Как правило, это крупные либо среднего размера птицы, с белым или серым оперением, часто с чёрными отметинами на голове или крыльях. Одними из отличительных характеристик являются сильный, слегка загнутый на конце клюв, и хорошо развитые плавательные перепонки на ногах.



КРЯКВА



Кряк'ва — птица из семейства утиных (Anatidae) отряда гусеобразных (Anseriformes). Наиболее известная и распространённая дикая утка. Длина тела самца около 62 см, самки — около 57 см, масса достигает 1—1,5 кг. Голова и шея самца зелёные, зоб и грудь коричнево-бурые, спина и брюшная сторона тела серого цвета с тонкими поперечными пятнышками. Окраска самки бурая с более тёмными пятнышками, брюшная сторона буровато-серая с продольными пестринами. На крыле у самца и самки сине-фиолетовое «зеркало».

Частично перелётная птица. Населяет пресные и слегка солоноватые водоёмы. В последние годы многие птицы зимуют на незамерзающих водоёмах в крупных городах и их окрестностях.

ОТГАТКИ

Гусь



Дятел



Снегирь



НАША ДРУЖИНА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ДОЗОРЕ. МЕСТО ДОЗОРА: ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ

Цель:

1. Провести мониторинг видового состава птиц Птичьей гавани.
2. Уборка загрязненных территорий.
3. Научится слушать тишину.
4. Останавливать нарушителей!
5. Наблюдать за птицами.

НАШ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД ВО ВРЕМЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОЗОРА. (ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ)



НА ОТДЫХЕ ПО ТРОПИНКАМ ПАРКА.



**ЯНА
АЛЕКСЕЙЦЕВА
СДЕЛАЛА
ЗАРИСОВКИ
ПАРКА ПТИЧЬЯ
ГАВАНЬ**



**После
прогулки,
отдых в
столовой**



**Экологический дозор с самой высокой точки - смотровой площадки.
Общий вид парка «Птичья гавань».**

ДО/ПОСЛЕ



БЫЛО




СТАЛО

ПРИРОДА ПТИЧЬЕЙ ГАВАНИ.





ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОТРЯДА. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД ДЕТСКИМ ЛЕТНИМ ЛАГЕРЕМ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ.



БЕРЕДИТЕ ПРИРОДУ!

