


कविशोकायुग




Кайнозойська ера розбивається на 2 періоди:

- *Третинний* (65 - 2 млн. років тому);
- *Четвертний* (2 млн. років тому - наш час)

ПАЛЕОЦЕНОВА ЕПОХА

(від 65 до 55 млн. років тому)



Северная Америка

Европа

Азия

экватор

Атлантический океан

Африка

Аравия

Индия

Южная Америка

Новая Зеландия

Австралия

Антарктида




На суші починалося панування ссавців.

З'явилися гризуни та комахоїдні,

«плануючі» ссавці та ранні примати.

У морях на зміну морським рептиліям
прийшли нові види хижих кісткових риб
та акул. Виникли нові різновиди
двостулкових молюсків і
форамініфер.





Еоценова епоха

(від 55 до 38 млн. років
тому)

З'явилися
летючі
миші, лемури;



ANNA NEKARIS



00000000000000

предки нинішніх
слонів, коней,
свиней

Олігоценова епоха

(від 38 до 25 млн. років
тому)



Розпочався бурхливий розквіт травоїдних ссавців. Серед них виникли нові види кроликів, зайців, гігантських лінивців




З'явилася
більшість
сучасних птахів,
серед яких були
велетенські
нелітаючі
форми, такі як
хижий журавель
фороракос

Міоценова епоха

(від 25 до 5 млн років тому)

«Шаблезубый тигр»





*В Австралії продовжували
розвиватися яйцекладні та
сумчасті.*

ПЛІОЦЕНОВА ЕПОХА

від 5 до 2 млн. років тому

**В Австралію
проникли пацюки,**



**в Африці
з'явилися перші
людиноподібні
істоти.**

ПЛЕЙСТОЦЕНОВА ЕПОХА

від 2 до 0,01 млн. років
тому



З'явилися перші люди, і багато великих ссавців почали зникати з обличчя Землі.



Голоценова ЕПОХА

від 0,01 млн. років

тому

до наших днів

