

# Букарка



**Самый маленький вредитель - долгоносик**



***Букарка*** - это вредитель плодовых культур.  
Встречается повсеместно.

**Букарка** является вредителем, который причиняет немало хлопот садоводам. Эти жуки селятся на плодовых деревьях и сильно снижают урожайность.



Они повреждают яблоню, грушу, реже айву, вишню, терн, боярышник, рябину, черемуху.

## *Личинки букарки*



Личинки этих жуков в длину не превышают 3-х миллиметров. Тело удлиненной формы. У личинки не имеется ног. Окрас тела бледно-желтый, а голова коричневого цвета. Личинки мало двигаются, они находятся в изогнутом состоянии, свернувшись калачиком.

***Взрослые букарки*** имеют сравнительно небольшие размеры, в длину они достигают 2,5-3 миллиметра. Окрас тела темно-синий, он отдает металлическим блеском.




## *Личинки букарки*



Личинки выходят из яиц весной. Процесс их развития занимает 30 суток. В июне личинки переползают с листвы в землю, зарываются в грунт на 8 сантиметров, и там окукливаются.

## *Куколки букарки*

Куколки развиваются с июня по август. Куколка развивается около 13 дней. Большая часть молодых особей впадает в спячку. В сентябре некоторые особи выбираются на почки деревьев и поедают их.



- 1 Жук
- 2 Личинка
- 3 Куколка

Личинки и букарки выедают тычинки, пестики и цветоножки бутонов. После деятельности вредителей, деревья перестают цвести. Особенный вред личинки причиняют листьям, так как большая часть из них опадает на землю.



## *Наносимый вред*





## *Меры защиты*

1. Сбор и сжигание опавших листьев.
2. Осенняя обработка почвы (перекапывание).
3. При численности, превышающей 40 жуков на одно дерево, - обработка инсектицидами.

**Инсектициды** - это химические препараты для уничтожения вредных насекомых.

