

Спид –чума 21 века.

- На пороге тысячелетий наступает момент, когда Мы за все бываем в ответе, перелистывая года, Человек, покоривший небо, чудо техники изобретая, Приобщаясь к дурным привычкам о здоровье своем забывает.

Немного статистики:

- • Сегодня в мире ВИЧ/СПИДом больны более 40 млн человек
- Каждую минуту в мире примерно 11 человек заражаются ВИЧ.
- В России официально зарегистрировано почти 300 тыс. ВИЧ-инфицированных, но предполагается, что их по крайней мере в три раза больше.
- 80% ВИЧ-инфицированных в России - молодежь от 14 до 29 лет

В – вирус (крошечный организм, микроб)

И – иммунодефицита

Ч – человека


С – синдром (картина болезни)

П – приобретенного (полученного при заражении)

И – иммуно- (невосприимчивость, защита от инфекций)

Д – дефицита (недостаток, недостаточное количество)

Вирус ВИЧ



Фазы развития заболевания

- 1. Период «окна»
- 2. Период первичных *проявлений*
- 3. Период развития вторичных заболеваний
- 4. СПИД, или терминальная стадия

Период «окна»

- Длится около 6 месяцев с момента заражения
- ВИЧ уже попал в организм и активно размножается, но антитела к нему еще не выработаны.
- Обычно никаких симптомов нет, лишь иногда может ненадолго повыситься температура.
- В это время ВИЧ трудно определить с помощью анализа крови.
- Человек еще не подозревает, что в его организм попал ВИЧ, но уже может передавать его другим людям

Период первичных проявлений

- • Начинается примерно через 6 месяцев после заражения и может длиться 6 и более лет.
- Иногда наблюдается незначительное ухудшение самочувствия: повышение температуры, потливость, недомогание.
- Иммунная система «увидела» ВИЧ и начала бороться с ним, вырабатывая антитела. Это держит ее в напряжении, она не справляется с другими защитными задачами.
- Анализ крови на антитела уже позволяет поставить человеку диагноз «ВИЧ - инфекция»

Период развития вторичных заболеваний

- Могут развиваться кожные и инфекционные заболевания, туберкулез, рак.
- При правильном лечении современные препараты еще способны вернуть болезнь на уровень первичных проявлений.
- Это состояние можно поддерживать достаточно долго, если человек старается вести разумный образ жизни.
- Однако если человек употребляет наркотики, спиртное, не бережет себя от других инфекций, происходит дополнительное ослабление иммунитета и ВИЧ быстрее развивается в стадию СПИД

СПИД или терминальная стадия

- 4. СПИД, или терминальная стадия
 - В организме почти не остается защитных клеток.
 - Системы и органы человека необратимо поражены.
 - Развиваются все новые заболевания, не поддающиеся эффективному лечению.
 - Одно заболевание сменяет другое, человек не успевает выздороветь и полностью восстановить силы.
 - Развитие болезни приводит к смерти

Пути заражения

- Половой – при непостоянном половом партнере и гомосексуальных отношениях, при искусственном оплодотворении
- При использовании загрязненных медицинских инструментов, у наркоманов – одним шприцем
- От матери-ребенку: внутриутробно, при родах, при кормлении грудным молоком
- Через кровь: при переливании крови, пересадке органов и тканей

СПИД не передается

- • Через воздух
- При разговоре, кашле
- При пользовании общей посудой
- Через рукопожатие
- Через поцелуй
- Через пищу
- При купании в бассейне, душе
- Через спортивные предметы
- Через домашних животных
- Через укусы насекомых
- При уходе за больными

Можно ли убить вирус СПИДа?

50-70° спирт	Несколько секунд
Кипячение	Мгновенно
Попадание в желудочно-кишечный тракт	Разрушается соляной кислотой и ферментами
Температура 56° С	30 минут
Дезинфицирующие вещества	Мгновенно
Попадание на кожу	Через 20 минут

- СПИД – опасное и коварное заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита
- СПИД распространяется из-за нашего невежества, а также нежелания изменить нормы своего поведения
- Лозунг «Не погибни из-за невежества!» должен стать нормой жизни для каждого человека!

**1 ДЕКАБРЯ –
Всемирный день
борьбы со СПИДом**