

Отряд Голубеобразные





- Голова небольшая, шея коротка, клюв прямой, при основании покрытый восковицей, ноздри прикрыты крышечками. Пальцы коротких ног прикреплены на одной высоте; крылья довольно длинные и заострены, с 10 большими и 11—15 малыми маховыми перьями; хвост из 12 (реже 14 или 16) перьев.

Дронто



Дронты, или Dodo — полностью вымершее семейство крупных нелетающих птиц. Существовали три вида в двух родах. Обитали на островах Маврикий, Реюньон и Родригес

Голубиные



Голубиные — собственно «голуби». Птицы со слабым клювом средней величины, короткими ногами и 12 рулевыми перьями. К ним относится большая часть голубеобразных, а именно около 200 видов входящие в 47 родов (6 родов только с вымершими видами). Больше всего видов в подсемействе Настоящие голуби (Columbinae). Самый крупный род этого подсемейства — Голуби (Columba) — 51 вид, в том числе 2-3 недавно

Полевой



Обыкновенный голубь, или полевой, родоначальник домашнего голубя, длиной 34 см, сверху пепельно-голубого, снизу сизого цвета, на крыльях чёрные полосы, рулевые перья с чёрными концами; избегает деревьев и гнездится на скалах или развалинах, водится в Европе. Путём тщательного подбора получено множество чрезвычайно разнообразных пород домашних голубей, резко отличающихся по величине, оперению, форме тела и т. д. Кроме мяса, голуби полезны человеку и в качестве почтовых голубей.

Вяхирь



Вяхирь длиной 43 см, цвет голубо-серый с красновато-серой головой и грудью, белыми пятнами и металлическим отливом на шее; живёт в лесах от Скандинавии до средней части Гималайских гор; на севере перелётная, на юге — оседлая птица; гнездится на ветвях.

Клинтух



Голубь клинтух меньше вяхиря (31-32 см), сизого цвета, зоб винно-красный, шея с металлическим блеском, ореол распространения приблизительно тот же, гнездится в дуплах.

Кольчатая горлица



Кольчатая горлица за последние 500 лет очень широко расселилась по большей части Евразии. Индия считается её первоначальной родиной. Кольчатые горлицы приблизительно 400 лет назад попали в Турцию, затем на Балканский полуостров.

Обыкновенная горлица



Обыкновенная горлица из-за веса примерно 300 грамм в России считается самым мелким голубем. Длинной 30 см, ржаво-буро-серого цвета с чёрными и серыми пятнами, снизу красновато-серого. Гнёзда вьёт не высоко, на кустах и деревьях. Водится в большей части Европы и Азии, в Южной России.

Голубь Виктория



Голубь Виктория имеет красивый гребень, который состоит из распушённых перьев с маленькими треугольниками на кончиках. Живёт голубь Виктория в лесу, вьёт гнездо и ночует на деревьях, но основную часть дня проводит на земле, питаясь опавшими плодами.

Ржанкообразные

Ржанкообразные — один из самых крупных отрядов водных и околоводных птиц, распространённых во всём мире и значительно различающихся как морфологически, так и по поведенческим характеристикам.



Общая характеристика

- Отряд ржанкообразные насчитывает более 300 видов и объединяет порядка 20-ти семейств (бекасовые, чайковые, авдотки, серпоклювы, ржанковые, чистиковые и другие), которые в свою очередь тоже делятся на подотряды и надсемейства



Внешний вид

Хохотун черноголовый



Песчанка




Среда обитания

- Птицы этого отряда распространены по всему миру, не исключая Антарктику, даже более – на севере количество ржанкообразных увеличивается и там они себя чувствуют намного комфортнее, чем в тропиках. И для самой экосистемы Арктики и Субарктики они играют важнейшую роль.



Питание

Некоторые виды растительноядные, а другие предпочитают питаться лишь животной пищей. Так как практически все живут поблизости водоемов или моря, то соответственно основной пищей большинства является рыба. Другие же на замену рыбе предпочитают питаться различными водными и наземными насекомыми.



Размножение



Значения для человека



Интересные факты



Вопросы

- Какой внешний вид у Ржанкообразных птиц ?
- Где обитают эти птицы?
- Чем питается данный отряд птиц?
- Где гнездятся Ржанкообразные птицы?
- Какой вред наносят птицы людям?

