

Тип Апикомплексы (Apicomplexa)

Тип Apicomplexa Levine, 1970

Споровики

Паразитические или хищные свободноживущие протисты. Расселительные стадии (зоиты, зооспоры) и вегетативные жгутиковые формы имеют общие для всех черты строения: покровы образованы пелликулой, есть микропоры; апикальный комплекс расположен на переднем конце клетки и представлен коноидом и полярным кольцом, от которого отходят субпелликулярные микротрубочки; имеются роптрии и микронемы. Микрогаметы одно-, двух- или трехжгутиковые, сильно специализированы. Свободноживущие виды являются хищниками, паразитические виды обычно имеют сложный цикл развития.

Класс Perkinsemorphea Levine, 1978

Перкинсеморфы (Рис. 2.35)

Свободноживущие хищники или паразиты, имеющие в жизненном цикле двухжгутиковые клетки с чертами строения зоита. Включает 2 отряда: Colpodellida (=Spiromonadida) и Perkinsida Levine, 1978.

Представители: *Colpodella* (=Spiromonas), *Perkinsus*.




Рис. 2.35. Схема строения клетки коллодеды. (По: Крылов, Мыльников, 1986.)

вмк – внутренний мембранный комплекс (уплощенные альвеолы), жк – жгутики, м – митохондрия, мн – микрокомы, мткк – микротрубочковый конус, мп – микропора, мк – микротрубочковые корешки, пв – пиноцитарительная вакуоль, ро – ронтрии, св – сократительная вакуоль, т – трихоциста, я – ядро.

Кольподеллиды — хищные жгутиконосцы, обитающие в почве, морской и пресной воде. Размеры их клеток колеблются от 7 до 25 мкм,

ЖГУТИКОВ Кольподеллиды — хищные жгутиконосцы, обитающие в почве, морской и пресной воде. Размеры их клеток колеблются от 7 до 25 мкм, жгутиков обычно два, оба лежат субапикально в жгутиковых карманах.

Покровы представлены типичной пелликулой, характерной для альвеолят.

Как и споровики, кольподеллиды обладают уникальным комплексом органелл — апикальным комплексом, состоящим из коноида, полярного кольца, роптрий и микронем. Однако, в отличие от паразитических апикомплексов, кольподеллиды используют данный аппарат не для проникновения в клетку хозяина, а для питания, буквально "высасывая" своих жертв — различных других одноклеточных.


Питающиеся жгутиконосцы активно перемещаются в водной среде в поисках жертвы. Осуществив питание (иногда несколько раз) зоиты

переходят на следующую стадию жизненного цикла и ИНЦИСТИРУЮТСЯ.

Под оболочкой цисты особь проходит серию делений, что приводит к формированию четырех (как правило) дочерних особей, которые выходят из цисты и вновь приступают к поиску добычи.

КЛАСС PERKINSEA LEVINE, 1978
Отряд Perkinsorida Levine, 1978
Семейство Perkinsidae Levine, 1978
Род *Perkinsus* Levine, 1978

Очень мелкие одноклеточные организмы. Самой заметной чертой всех *Perkinsus* является строение зооспоры. Подвижные зооспоры, продуцируемые зооспорангием, имеют два жгутика. Передний жгутик орнаментирован волосовидными, похожими на шпоры образованиями, задний – гладкий. Зооспора содержит апикальный комплекс, состоящий из конуса, субпелликулярных трубочек, роптрий, прямолинейных микронем и связанных с конусом микронем. На переднем конце зооспоры встречаются крупные вакуоли. Жизненный цикл представлен вегетативным размножением, Паразиты моллюсков.




Perkinsus marinus
(Mackin, Owen & Collier) Levine 1978

Класс Sporozoea Leuckart, 1879

Споровики (Рис. 2.36)


Все паразиты со сложным жизненным циклом, включающим 3 основные стадии: бесполое поколение (поколения), появляющиеся в результате мерогонии; гамогония, приводящая к образованию гамет и ооцисты; и спорогония, у большинства видов проходящая во внешней среде. Жгутиковые стадии представлены только микрогаметами. Зоиты являются расселительными формами без жгутиков.

Представители: *Gregarina*, *Eimeria*, *Plasmodium*.



Основные стадии жизненного цикла спорозоитов. (По: Sleight, 1989.)


А – расселительная стадия (спорозоит), Б – бесполое размножение в клетке хозяина (мерогония), В – расселительная стадия, появившаяся в результате бесполого размножения (мерозоит), Г – макрогамонт, Д – микрогамонт, Е – трехжгутиковая микрогамета.



Строение зонта

Грегарина (Eugregarina sp.)


Тип Апикомплексы
Phylum Apicomplexa
Класс Споровики
Class Sporozoa
Отряд Грегарины
Ordo Gregarinida



Де – дейтомерит, З - зоиты,
Пр – протомерит, Ц – циста, Эп - эпимерит

Тип: **Apicomplexa**

Eugregarina sp.





Эпицеллюлярный (приклеточный) тип развития. Трофозоит частично внедряется в эпителиоцит с помощью эпимерита, через поверхность которого осуществляется питание паразита


- Безвредные симбионты пищеварительного тракта
- Однако при интенсивном заражении забивают просвет кишечника и пилорических придатков; по нашим данным могут быть умеренно патогенными

Де - дейтомерит, З - зоиты, Пр - протомерит, Ц - циста, Эп - эпимерит



Цикл развития грегарины






Отряд кокцидии Coccidia
Подотряд Эймериевые Eimeriina




Ооциста кокцидии (*Eimeria* sp.)




Жизненный цикл кокцидии рода *Eimeria*




Жизненный цикл кокцидии Eimeria sp.






Цикл развития Токсоплазмы *Toxoplasma gondii*



Токсоплазма (Toxoplasma)





Подотряд Кровяные споровики Haemosporina




Малярийный плазмодий (Plasmodium sp.)

Ring form

Цикл развитие малярийного плазмодия




Подотряд пироплазмы *Piroplasma*



Babesia

паразит, поражающий эритроциты крови крупного рогатого скота, лошадей, овец Бабезия — внутриклеточный паразит, поражающий эритроциты крови крупного рогатого скота, лошадей, овец Бабезия — внутриклеточный паразит, поражающий эритроциты крови крупного рогатого скота, лошадей, овец, свиней Бабезия — внутриклеточный паразит, поражающий эритроциты крови крупного рогатого скота, лошадей, овец, свиней, собак Бабезия — внутриклеточный паразит, поражающий эритроциты крови крупного рогатого скота, лошадей, овец, свиней, человека.

В эритроцитах В эритроцитах происходит бесполое размножение В эритроцитах происходит бесполое размножение бабезий делением каждой на 2—4 особи. Бабезии имеют различную форму и размеры, чаще характерны кольцевые формы располагающиеся



Babesia canis