

Лекция №11

Тема: Тип Arthropoda
(Членистоногие)

Членистоногие

– Полимерные животные, вторая группа высших трохофорных;

- Стали закладываться после Динофилид и первое время шли параллельно с полихетами;




У примитивных представителей различных отрядов сохраняется личинка науплий, соответствующая метатрахофоре.



Существование науплиов сильно сближает членистоногих с аннелидами.

Классическая гипотеза:
Членистоногие – боковая ветвь
продолжающая развитие признаков,
которые начали закладываться у
полихет (ничего не избрели).



Аутапоморфия Arthropoda

- Кутикула состоит из а-хитина и белков и обновляется при линьках;
- Кутикула высоко стабильна (прочность на разрыв и сжатие) и устойчива к химическим и механическим воздействиям, является экзоскелетом;
- Покрывает всё тело, а также все впячивания эктодермы (передняя и задняя кишка, органы дыхания, выводные отверстия желёз и части половой системы)

- Отсутствует мерцательный эпителий;
- У членистоногих возникает новый тип движения – с опорой на наружный скелет;

Эволюция членистоногих в очень большой мере определялась изменениями их скелета, и на различиях в отделах тела базируется систематика всего подтипа членистоногих.




Возможно, в следствие образования экзоскелета, мог стать излишним гидроскелет в виде парных сегментарных целомических полостей.

- Первая и вторичная полости тела объединились друг с другом.
Возникла «третичная» полость тела – миксоцель.

Миксоцель – отличительный признак всех без исключения членистоногих, так же как функционально связанная с ним незамкнутая кровеносная система.

В результате разрушения целома кровь и целомическая жидкость объединяются и образуют гемолимфу.




- Все метамерные с гетерономной сегментацией;
- Тела чётко разделены на голову и туловище;
- Нет внешних локомоторных ресничек;
- У большинства имеются конечности, почти всегда членистые, специализированные и полифункциональные;

*По всей видимости по линии
метамерии строить тело более
20 сегментов не было смысла
(чего не смогли сделать
многоножки) и высшие насекомые и
хелицеровые – высшая ступень
олигомеризации (внутренней
метамерии – нет).*

- Дыхание: жабры, внутренняя стенка карапакса, лёгкие, трахеи;
- Лишены способности регенерировать сегменты;
- Членистоногие раздельнополые, только половое размножение, но бывает партеногенез;

- Выделительные целомодукты или мальпигиевы сосуды (1- трубчатые, слепо оканчивающиеся выросты кишечника.);



Систематика типа Arthropoda:

1. Подтип Жабродышащие (Branchiata)
2. Подтип Трахейные (Tracheata)
3. Подтип Трилобитообразные
(Trilobitomorpha)
4. Подтип Хелицеровые (Chelicerata)

1. Подтип Жабродышащие (Branchiata)



1.Подтип Жабродышащие (Branchiata):

- Преимущественно водные членистоногие;
 - Дыхание осуществляется при помощи жабр или поверхностью тела;
 - Головной отдел состоит из акрона и четырёх сегментов;
 - На голове две пары антенн и три пары челюстей;
 - Конечности двуветвистые, кроме первой пары антенн;
- К подтипу относится лишь один класс — Ракообразные (Crustacea).

Класс Ракообразные (Crustacea)

- Два ларвальных сегмента (у других членистоногих их четыре);
- Высокая специализация отдельных сегментов и их пришатков, и их функциональное объединение в тагмы (тагматизация);


- Цефалон (голова) состоит из акрона и, вероятно, шести сегментов;
- Туловище разделено на две тагмы: торакс (грудь) и абдомен (брюшко, у малокострак - плеон);
- Число туловищных сегментов сильно варьирует у различных групп;

- Если торакомеры (грудные сегменты) сливаются с цефалоном, возникает новая тагма – цефалоторакс (головогрудь);
- Возможен Карапакс (панцирь) – складка покровов заднего края головы (сегмента максилл II)
- Конечности присутствуют на всех сегментах тела (если они не утрачены вторично) – примитивный признак;


Существуют группы ракообразных, у которых тело состоит из цефалона, торакса и абдомена, но есть и такие, у которых тело делится на головогрудь, переон, плеон и плеотельсон.

Брюшко

Головогрудь




- Глаза двух типов : парные
боковые фасеточные глаза и один
медиальный (науплиальный) глаз;




Подтип Трахейные (Tracheata)

- Наземные или вторичноводные животные;
- Дыхание при помощи трахей;
- Голова слитная отчётливо отделена от сегментов тела и способна к независимым движениям.;
- Только одна пара антенн;
- Фасеточные глаза состоят из оммадиев;



Подтип Трахейные (Tracheata)



Класс Многоножки
(*Myriapoda*)

Класс Насекомые
(*Insecta*)


Класс Многоножки (Myriapoda)

- Два отдела тела (голова и однородное членистое туловище);
- Конечности простые ходильные, практически на каждом сегменте туловища;
- Много слепых видов. Медианных глаз не бывает;
- Одна пара мальпигиевых сосудов;

Класс Насекомые (Insecta)

- Практически отсутствуют в морских экосистемах;
- Деление тела на три интегрированные тагмы (самая важная аутапоморфия):
 - а) голова; б) грудь; в) брюшко;


Тело исходно состоит из 20 гетерономных сегментов, к которым спереди и сзади примыкают акрон и тельсон.



- Голова изrudимента акрона и 4 - 6 ларвальных сегментов (максиллы II слиты в нижнюю губу);
- Грудь из трёх сегментов и несёт три пары ходильных ног и крылья (если есть – придатки экзоскелета);
- Брюшко включает от 5 до 11 истинных сегментов и тельсон;


- У большинства брюшные конечностиrudиментарные со сменой функций(служат органами чувств, половыми придатками и т.п.);
- Трубчатые трахеи, диффузный и принудительный газообмен;
- Сердце в брюшке;
- Органы выделения – эктодермальные мальпигиевы трубки, жировое тело, нефроциты, амебоидные клетки;

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ И ПОЛОВАЯ СИСТЕМЫ КОБЫЛКИ




- Нервный аппарат гангионизован, нет рассеянного сплетения, ганглии имеют тенденцию к слиянию, идёт образование головного мозга с хорошо развитыми зрительными долями, развиваются высшие ассоциативные центры (сложное поведение);

ДЫХАТЕЛЬНАЯ, КРОВЕНОСНАЯ И НЕРВНАЯ СИСТЕМА КОБЫЛКИ




Крылья насекомых –
двуслойные складки
тела с жилками (по
жилкам проходят
трахеи, нервы,
гемолимфа);

Крыло прикрепляется
к груди сложным
суставом.



СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ СРЕЗ
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ КРЫЛА (по Matheson)


- Насекомые с полным (в цикле есть куколка) и с неполным превращением (куколки нет);




ОТСУТСТВИЕ МЕТАМОРФОЗА (АМЕТАБОЛИЯ)

Щетинохвостка

Яйцо



Неполовозрелые
ростовые стадии



Имаго

НЕПОЛНЫЙ МЕТАМОРФОЗ (ГЕМИМЕТАБОЛИЯ)

Поденка

◦ Яйцо



Наяда

(водная нимфа)




Имаго

НЕПОЛНЫЙ МЕТАМОРФОЗ (ПАВРОМЕТАБОЛИЯ)
Кобылка

Яйцо



Пять нимфальных
стадий




Имаго

ПОЛНЫЙ МЕТАМОРФОЗ (ГОЛОМЕТАБОЛИЯ)
Колорадский жук


Яйцо



Личиночные стадии



Куколка



Имаго

3. Подтип Трилобитообразные (Trilobitomorpha)

- Целиком вымершая морская группа;
- 4 ларвальных сегмента;
- Науплиев не было;
- Конечности одноветвистые;
- Полное отсутствие дифференцированных тулowiщных конечностей и гомономность сегментации;



Строение панциря

трилобитов:

I- головной отдел (щит)

II- туловищный отдел

III- хвостовой отдел

1- лицевой шов

2- подвижная щека

3- щёчное остроконечие

4- глабелла

5- затылочное кольцо

6- неподвижная щека

7- глаз


8- рахис (осевая часть)

9- плевры (боковые части
панциря)

10- спинная борозда

11- хвостовые сегменты

12- шип (тельсон)



Подтип Хелицеровые (Chelicerata)

- Тело состоит из головогруди (просомы) с 6 парами придатков (хелицеры, педипальпы, 4 пары ног) и брюшка (опистосомы);
- Антенны I отсутствуют;





Схема строения хелицерового:

I — просома; II — мезосома; III — метасома; 1 — 19 — сегменты тела; 20 — головная лопасть (акрон); 21 — эпистом; 22 — медиальные глаза; 23 — боковые глаза; 24 — хвостовой придаток (тельсон); 25 — хелицеры; 26 — педипальпы; 27 — ноги; 28 — жевательные отростки (эндиты); 29 — половые ножки; 30 — жаберные ножки.

Ротовые органы паука крестовика *Araneus diadematus* (по Иванову): 1 - конечный когтевидный членик хелицеры, 2 - основной членик хелицеры, 3 - педипальпа, 4 - жевательный вырост основного членика педипальпы, 5 - основной членик ходной ноги



Подтип Хелицеровые (Chelicerata)



Класс Мечехвосты
(Xiphosura)

Класс Ракоскорпионы
(Euryptera)

Класс
Паукообразные
(Arachnida)

Класс Мечехвосты (Xiphosura)

- Все морские прибрежные виды;
- В отличие от трилобитов, конечности не одинаковы;
- Просома – сверху монолитный карапакс, снизу 7 пар конечностей;





Рис. 8. Строение мечехвоста:
1 — головогрудной щит; 2 — брюшной отдел; 3 — хвостовая игла; 4 — хелицеры; 5 — педипальпы; 6 — ноги; 7 — жевательные отростки ног; 8 —rudименты конечностей седьмого сегмента (хиларии); 9 — жаберные крышки; 10 — жаберные ножки.

- Мезосома состоит из 7 (6) сегментов. Конечности мезосомы служат для дыхания;
- Метасома (третий отдел тела) из 3 сегментов и хвостового шипа;
- В кутикуле нет отложений извести;
- Мозг расположен не над пищеводом, а перед ним;
- Органы выделения (одна пара коксальных желёз) и гонады расположены в просоме;

Класс Ракоскорпионы (Eurypterida)

- Вымершая группа морских и пресноводных хелицеровых;
- Просома из 6 сегментов;
- Мезосома имела свободные сегменты (8);
- Метасома не несла конечностей и могла оканчиваться шипом;




Класс Паукообразные (Arachnida)

- Редукция и утрата брюшных конечностей;
- Преобразование складчатых жабр в лёгочные мешки;
- Внекишечное пищеварение;
- Образование энтодермальных мальпигиевых сосудов;
- Распадение фасеточных глаз на отдельные глазки;

- Деление тела на про- и опистосому;
- Редукция 7-го «предполового» сегмента – «стебелёк» на границе тагм;
- Антенны I отсутствуют;
- На просоме хелицеры, педипальпы и 4-е пары ходильных ног;

Хелицеры и педипальпы гомологичны антеннам II и мандибулам ракообразных.



ПОЛИМЕРНЫЕ



Рис. 10. Структурный уровень и филогения членистоногих