


Состав и строение белков



Ф. Энгельса : «Жизнь есть способ существования белковых тел, и этот способ существования состоит по своему существу в постоянном самообновлении химических составных частей этих тел».




Табл.

Знаю

Хочу знать

Узнал

--	--	--



Молекула белка – **макромолекула** (греч. «Макрос» - большой, гигантский), обладает большой молекулярной массой


Сравните: молекулярная масса спирта – 46

уксусной кислоты – 60

альбумина (одного из белков яйца) – 36000

гемоглобина – 152000

миозина (белок мышц) – 500000

- 
-
- В клетке бактерий кишечной палочки - 5 тыс. молекул органических соединений, из них – 3 тыс. - белки.
 - В организме человека более 5 мил. белков
 - В клетке 10-20% сырой массы и 50-80% от сухой массы клетки составляют белки

Без белков невозможно представить движение.
способность расти, сократимость, размножение



Химический состав

- В белке следующие химические элементы: С, Н, О, N, S, P, Fe.

Железо в гемоглобине крови, фосфор в казеине молока....

- Массовая доля элементов:

С – 50% - 55%;

О – 19% - 24%;

Н – 6,5% - 7,3%;

N – 15% – 19%;

S – 0,3% - 2,5%;

P – 0,1% - 2%



Содержание белка в некоторых тканях (после обезвоживания органа):

Мышцы – 80%;

Почки – 72%;

Кожа – 63%;

Печень – 57%;


Мозг – 45%;









Жировая ткань, кости, зубы – 14 – 28%;

Семена растений – 10 – 15 %;


Стебли, корни, листья – 3% - 5%

Плоды – 1-2%



- 
-
- **Белки** – это **нерегулярные полимеры**, мономерами которых являются **аминокислоты**
 - в природе существует около 100 α-аминокислот, в организме встречается 25
 - в каждом белке 20, из них может быть образовано 2 432 902 008 176 640 000 комбинаций ($\sim 2 \cdot 10^{18}$)
 - **заменимые** аминокислоты - они могут синтезироваться в организме
 - **незаменимые** - в организме не образуются, их получают с пищей (лизин, валин, лейцин, изолейцин, треонин, фенилаланин, триптофан, тирозин, метионин)




Общая формула аминокислот



Аминокислоты являются амфотерными соединениями (в растворе они могут выступать как в роли кислот, так и оснований)





Аланин




Цистеин

2-амино-3-тио-пропановая
кислота



Глицин




Тирозин (тир)

2-амино-3-фенил-пропановая
кислота




Как связаны аминокислоты


Пептидная связь (амидная)



Образование дипептида



При взаимодействии двух аминокислот происходит реакция **конденсации** и образуется пептидная связь




Глицил-аланил-серил-цистеин



Уровни организации белка

- Размер каждой аминокислоты около 0,3 нм,
- Белок, состоящий из многих аминокислотных остатков, должен представлять собой длинную нить
- Размеры молекул белков гораздо меньше
- Макромолекулы белков имеют форму компактных шариков (глобул) или вытянутых структур (фибрилл)
- Полипептидная цепь каким-то образом сплетена, образуя клубок или пучок нитей
- Она свёртывается упорядоченно, для каждого белка определённым образом

Первичная структура




Первичная структура – полипептидная цепь, в которой пептидные связи между аминокислотными остатками.

Доказательства:


1. Небольшое число amino- и карбоксильных групп
2. Успехи синтеза белков (Ф, Сенгер, Англия)
расшифровал структуру инсулина (51 аминокислота, 2 нити).

Вторичная структура




α -спираль

Вторичная структура – спираль, поддерживается водородными связями, каждая из которых в 15 – 20 раз слабее ковалентной.



β -спираль






С полным основанием можно утверждать, что белки – самые важные из всех веществ, входящих в состав организмов животных и растений.

Л. Полинг


Третичная структура



В образовании третичной структуры большая роль принадлежит радикалам.


За счёт которых образуются дисульфидные мостики, сложноэфирные связи, водородные связи, амидные связи. Доказана третичная структура инсулина, рибонуклеазы

Четвертичная структура



Четвертичная структура – это объединение нескольких глобул или фибрилл в одно целое. Классический пример: гемоглобин, хлорофилл. В гемоглобине - гем небелковая часть, глобин белковая часть.


Свойства белков



Чем выше уровень организации белковой молекулы, тем структура менее прочна

Нарушение нативной (естественной), уникальной (свойственной только этому белку) структуры белковой молекулы называют **денатурацией**.


Процесс восстановления структуры белка называется **ренатурацией**.

- 
-
- * альбумин - (*яичный белок*)
 - * кератин - (*рога, шерсть*)
 - * коллаген - (*кожа*)
 - * гемоглобин - (*кровь*)
 - * фибрин, фибриноген - (*кровь*)
 - * пепсин - (*желудочный сок*)
 - * трипсин - (*поджелудочный сок*)
 - * миозин - (*мышцы*)
 - * глобулин - (*вакцина*)
 - * родопсин - (*зрительный пурпур*)
 - * лиозин - (*слюна*)
 - * инсулин - (*поджелудочная железа*)



Итоги:

- **Белки** – это **нерегулярные** полимеры, мономерами которых являются - **аминокислоты**.
- Известно много аминокислот, но в качестве мономеров любых природных белков известно только **20 аминокислот**. Белки разного размера включают в себя от нескольких десятков до нескольких сотен и даже тысяч аминокислот.
- Белки -природные высокомолекулярные органические соединения, построенные из остатков 20 аминокислот, которые соединены **пептидными связями** в длинные цепи. Белки называют также **протеинами** (греч. Protos – первый, главный –простые белки) или **протеидами** (сложные белки).


- 
- **Итак: белки это - макромолекулы, биополимеры, полипептиды.** Белки - это самые сложные молекулы.
-

Различают **четыре уровня** структурной организации молекулы белков:

- **Первичная** – полипептидная цепь, в которой пептидные связи между аминокислотными остатками.
- **Вторичная** – спираль, поддерживается водородными связями
- **Третичная** – глобула, способ укладки спиральных структур в глобулярных белках.
- **Четвертичная** – это объединение нескольких трёхмерных структур в одно целое.

Свойства белков:

- **Денатурация** - нарушение естественной, уникальной структуры белковой молекулы.
- **Ренатурация** - процесс восстановления структуры белка.



Д. з.: §1.4, прочитать, ответить на вопр. в конце §; графу «Узнал» выучить.