

Бенгальский тигр.





Характеристика тигра.

Надцарство: Ядерные

Царство: Животные

Тип: Хордовые

Класс: Млекопитающие

Отряд: Хищные

Подотряд: Кошкообразные

Семейство: Кошачьи

Подсемейство: Большие кошки

Род: Пантеры

Вид: Тигр

Подвид: Тигр бенгальский

Бенгальские тигры имеют два окраса шкуры.

Белый



Оранжевый



Размер и вес тигра.



Бенгальский тигр чемпион по размеру и весу.

Средняя масса – 300кг (388,7 кг).

Длина тела вместе с хвостом - 2,9-3 м.

Высота в холке 90-100 см.



Места обитания

Обитает в Северной и Центральной Индии, в Непале и Бирме, а также в окрестностях устья р. Ганг и в Бангладеш.

Питание тигров.

- За добычей тигр охотится путём скрадывания или из засады, совершая затем мощный рывок или прыжок (до 9 м в длину и до 2 м в высоту). Он обладает такой силой, что, нападая, перекусывает и ломает позвонки даже крупным животным, а тушу утаскивает иногда за несколько километров. При промахах преследует добычу не далее 100—150 м. За один раз тигр может съесть около 35 кг.



Питание.



- Добычей тигру служат **копытные** (кабаны, олени, косули) и многие другие животные, включая обезьян, черепах, неядовитых змей, рыбу, крабов, лягушек и насекомых (термитов, саранчу). В Маньчжурии тигры регулярно нападают на **бурых и гималайских** медведей. При недостатке диких зверей тигры могут уничтожать **домашний скот и собак**. Известны случаи нападения тигра на **крокодилов, питонов, леопардов** и даже других тигров. Среди тигров бывают людоеды; обычно это старые или больные особи, неспособные охотиться на **копытных**.

Зубная система тигра.



Зубная система тигра состоит из резцов, клыков и коренных зубов.





Образ ЖИЗНИ.

Тигр активен преимущественно в ночные часы, особенно в тропиках. Большинство кошек избегает воды, но тигры любят купаться; в южных областях ареала они в жаркую погоду регулярно принимают ванны и охотно плавают. На деревья лазают только молодые тигры.

Размножение.



Размножение.

Если не считать брачного сезона и периода ухода матери за потомством, тигры ведут одиночный образ жизни. Спаривание происходит чаще всего зимой. Там, где тигров мало, за самкой ходит всего один самец. В иных случаях между конкурентами разгораются кровавые столкновения. Беременность самки длится **102—106 дней**. В выводке обычно **2—4** тигрёнка, редко один, ещё реже 5—6. Они рождаются в пещере или другом защищённом логове и растут под присмотром матери, которая не подпускает самца к потомству. Рожает тигрица, как правило, раз в **2-3 года**. Тигрята рождаются слепыми, беспомощными, с массой **1,3—1,5 кг**, но уже примерно через 6—8 дней прозревают. Молодые тигры живут с матерью **2—3** года, а иногда и до 5 лет. Половая зрелость наступает в возрасте **3—4** лет у самок и **4—5** лет у самцов.



Бенгальский тигр

Презентацию делали:

Прокошин Александр
Черногаев Александр

Руководитель:

Железняк Ирина Геннадьевна