

БЕШЕНСТВО




Бешенство —

инфекционное
заболевание
млекопитающих
животных и человека,
вызываемое вирусом
бешенства.




- Возбудитель бешенства – рабдовирус.
- Вакцина против бешенства впервые была применена Луи Пастером в 1885 году у 9 летнего мальчика Йозефа Майстера. Мальчик выжил, став первым человеком, излечившимся от бешенства











Клиника

Инкубационный период
от 10 дней до 1 года (чаще 1-3 мес).

В течении болезни выделяют 3
стадии:

- продромы (депрессии)
- возбуждения
- параличей

Стадия продромы (1-3 дня):


Стадия продромы (1-3 дня):

- ЧУВСТВО ЖЖЕНИЯ, зуд, боли в области зарубцевавшейся раны и по ходу ближайших от нее нервных стволов
- одновременно возникают тревога, бессонница, состояние депрессии
- повышение температуры до 37,2-37,3°C

Стадия возбуждения

(2-3 дня, редко до 7 дней):

- появляются приступы гидрофобии, аэрофобии, фотофобии и акустофобии
- нарастает возбуждение (слуховые и зрительные галлюцинации угрожающего характера, приступы буйства с агрессивными действиями);
- появляется повышенное потоотделение, обильная саливация;
- температура тела повышается до субфебрильной;
- нарастает тахикардия.



Паралитическая стадия:

- прекращаются приступы гидрофобии;
- нарастает вялость, апатия;
- развиваются параличи мышц конечностей, языка, лица.

Смерть наступает через 12-24 ч после возникновения параличей.

ПРИКАЗ МЗ РФ

от 7 октября 1997 г. N

297

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ПРОФИЛАКТИКЕ

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЮДЕЙ

БЕШЕНСТВОМ

- Организовать с 1 января 1998 г. проведение обязательной **профилактической иммунизации против бешенства** лицам, профессиональная деятельность которых связана с риском заражения вирусом бешенства



• Обеспечить расширение
применения



концентрированной

очищенной

культуральной

антирабической

вакцины (КОКАВ) и

сокращение применения

Первую медицинскую помощь
лицам, обратившимся по поводу укусов, оцарапывания, ослюнения любым животным, а также лицам, получившим повреждения кожных покровов и попадание инфицированного материала на слизистые оболочки при разделке и вскрытии туш животных, павших от бешенства, или при вскрытии трупов людей, умерших от гидрофобии,
оказывают все ЛПУ.

Курс лечебно-
профилактической
иммунизации против
бешенства назначается
НЕМЕДЛЕННО

при обращении (направлении)
пострадавшего и проводится в
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПУНКТАХ (КАБИНЕТАХ), а при
их отсутствии в

УРГУВЕНСКИХ КАБИНЕТАХ

медицинскую помощь пострадавшему:

- **обильно промыть раны**, царапины, ссадины, места ослонения **струей воды с мылом** (или любым моющим средством),
- **обработать края раны 70⁰ спиртом или настойкой йода, наложить стерильную повязку.**
- Края раны, нанесенной животным, в течение первых трех дней не иссекать и не зашивать, исключая повреждения, которые требуют специальных хирургических вмешательств по жизненным показаниям;
 - при обширных ранах после предварительной местной обработки раны накладываются несколько наводящих швов;
 - в целях остановки наружного кровотечения проводится прошивание кровотока сосудов.

Провести
экстренную
профилактику
столбняка

в соответствии с инструкцией
о ее проведении.

Направить пострадавшего

в травматологический пункт

(кабинет), а при его

отсутствии в хирургический

кабинет или хирургическое

отделение больницы **для**

назначения и проведения

курса антирабических

прививок.

Передать на каждого обратившегося телефонограмму и в течение **12 часов** направить письменное "Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку" (учетная форма N 058/у) в центр госсанэпиднадзора, в районе которого находится данное

Информировать каждого пострадавшего:

- О ВОЗМОЖНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЯХ
ОТКАЗА ОТ ПРИВИВОК И
РИСКЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
БЕШЕНСТВОМ,

Обеспечить госпитализацию

следующих категорий пострадавших

для проведения курса прививок:

- лиц, получивших тяжелые и множественные укусы и укусы опасной локализации;
- лиц, проживающих в сельской местности;
- лиц, прививающихся повторно;
- лиц, имеющих отягощенный анамнез (неврологический, аллергологический и т.д.).

Уточнить курс прививок

на основании сообщения из ветеринарного учреждения о результатах наблюдения за животными или сообщения центра госсанэпиднадзора о результатах лабораторного исследования павшего или убитого животного.

Информировать центры госсанэпиднадзора,

в районе деятельности которого находится травм.пункт (кабинет), хир.каб. или х/о:

- 1) в случае переезда на другое место жительства пострадавшего, не закончившего курс антирабических прививок;**
- 2) в случае возникновения поствакцинального осложнения;**
- 3) о прививающихся, не закончивших курс прививок;**
- 4) о каждом случае отказа от антирабических прививок.**

Направлять копии всех
заполненных

**"Карт обратившихся
за антирабической
помощью"**

(учетная форма N 045/у)

в территориальные
центры

госсанэпиднадзора.

Обеспечить

непрерывность

проведения курса

антирабических

прививок

ПО ВОЗМОЖНОСТИ

одной серией вакцины.



Оформлять **отказ от оказания антирабической помощи** в виде расписки больного, заверенной

- подписями 2-х врачей
- печатью ЛПУ.

Оформить и выдать пациенту справку о проведении курса антирабических прививок, при наличии у него прививочного свидетельства, заполнить учетный листок (справка выдается на основании данных карты обратившегося за антирабической помощью) - учетная форма N 045/у.