

# Биологически активные соединения живых организмов

А.М. Чибиряев

Подготовлен в рамках реализации  
Программы развития НИУ-НГУ

**Липиды** – жиры и жироподобные вещества, являющиеся производными высших жирных кислот, высших жирных спиртов или высших жирных альдегидов. Как правило, это низкомолекулярные жирорастворимые органические вещества, которые извлекаются из клеток животных, растений и микроорганизмов неполярными растворителями.

## **Основные биологические функции липидов:**

- главные компоненты биологических мембран;
- запасной, изолирующий и защищающий органы материал;
- наиболее калорийная часть пищи;
- важная составная часть диеты человека и животных;
- транспорт некоторых витаминов внутри организма;
- регуляторы транспорта воды и солей;
- иммуномодуляторы; регуляторы активности некоторых ферментов;
- эндогормоны;
- передатчики биологических сигналов.

**Основные источники липидов:** молоко, растительные масла (оливковое, подсолнечное, льняное, кукурузное, кокосовое и т.д.), свиное сало и другие животные жиры, яйца, мозг и внутренности животных и др.

В состав липидов, помимо жирных кислот, спиртов и альдегидов, могут входить азотистые основания, фосфорная кислота, углеводы, аминокислоты, белки и т.п.

Подразделяются на простые и сложные. К простым относятся липиды, молекулы которых содержат только остатки жирных кислот (или альдегидов в енольной форме) и спиртов. Из простых липидов в растениях и животных встречаются жиры и жирные масла, представляющие собой триацилглицерины (триглицериды) и воски.

Воски состоят из сложных эфиров высших жирных кислот и одно- или двухатомных высших спиртов.

К жирам близки простагландины, образующиеся в организме из полиненасыщенных жирных кислот (в первую очередь - арахидоновой). По химической природе это производные протаноевой кислоты со скелетом из 20 атомов углерода и содержащие циклопентановое кольцо.






Сложные липиды делят на три большие группы: фосфолипиды (соединения, имеющие в своей структуре остаток фосфорной кислоты), гликолипиды (соединения, имеющие в своей структуре углеводный компонент) и сфинголипиды. Иногда сложные липиды дополнительно подразделяют на нейтральные, полярные и оксилипины.

# Составные части липидов - жирные кислоты

3

Известно более 800 жирных кислот, отличающихся по длине углеродной цепи, по степени и характеру её разветвления, числу и положению С=С связей, по природе и количеству других функциональных групп (COOH, OH, SH, NH<sub>2</sub> и др.).




## Í àñû ù áí í û á æøđí û á èèñëî ù





## Составные части липидов - жирные кислоты

ï î ëèáí î âùà



î ëääèí î âàÿ è ëèí î ëääàäÿ êèñëî òù ñî ñòàâëÿþ ò î ëî ëî 60%  
 àññõ ÆË òàññòèòàëüí ù õ ì àññë.

# Состав жирных кислот некоторых растительных жиров и масел

Жирная кислота	Кокосовый орех	Арахис	Оливки	Масличная пальма (мяк.)	Рапс обычный	Рапс селекционный	Соевые бобы	Подсолнечник обычный	Подсолнечник селекц.	Семена льна
<12:0	21.5									
12:0	48.8			1.2						
14:0	14.8			1.0				0.2	0.1	
16:0	6.9	12.5	10.3	45.0	3	4	11	6.0	3.6	6.1
18:0	2.0	2.5	2.3	4.5	1	2	3.5	5.6	4.9	3.2
18:1n-9	4.5	37.9	78.1	37.5	16	56	22	17.8	80.6	16.6
18:2n-6	1.4	41.1	7.3	10.5	14	26	53	68.7	8.4	14.2
18:3n-3		0.3	0.6	0.4	10	10	7.5	0.2	0.1	59.8
20:1n-9			0.3		6	2	1.0	0.1	0.3	
22:1n-9					49	следы				

# Состав жирных кислот некоторых ЖИВОТНЫХ жиров и масел

Жирная кислота	Сливочное масло	Свиной жир	Говяжий жир	Бараний жир	Жир тихоокеанской сельди	Жир трески	Жир тихоокеанского анчоуса
<12:0	10.1						
12:0	2.8			0.6	0.2		
14:0	10.1	2.0	2.5	5.6	6.8	3.3	8.3
16:0	25.0	27.1	27.0	27.0	22.7	13.4	19.5
16:1	1.5	4.0	10.0	1.6	8.0	9.6	9.1
18:0	12.1	11.0	7.4	31.7	2.7	2.7	3.2
18:1n-7					5.0		2.5
18:1n-9	27.1	44.4	47.5	31.7	29.7	23.4	12.9
18:2n-6	2.4	11.4	1.7	1.6	0.7	1.4	0.9
18:3n-3	2.0		1.1	0.2	0.2	0.6	0.4
20:1n-9					4.4	7.8	1.2
20:1n-11					1.0		0.1
20:4n-6						1.4	0.5
20:5n-3					5.3	11.5	18.2
22:1n-11					3.9	5.3	1.4
22:5n-3					0.2	1.6	1.2
22:6n-3					1.5	12.5	10.9



# Мировое производство важнейших жиров и масел.

Жиры и масла	Миллионы тонн (% всего)				
	1965	1975	1985	1995	2005
Соевое	4.1 (13.0)	8.5 (19.7)	14.1 (22.1)	19.5 (22.1)	27.3 (23.8)
Пальмовое	1.4 (4.4)	2.8 (6.5)	6.7 (10.5)	13.9 (15.7)	21.4 (18.7)
Рапсовое	1.4 (4.4)	2.6 (6.1)	6.0 (9.4)	9.5 (10.7)	12.0 (10.5)
Подсолнечное	2.9 (9.2)	3.7 (8.6)	6.5 (10.2)	8.9 (10.0)	10.8 (9.4)
Хлопковое	2.6 (8.3)	2.9 (6.8)	3.4 (5.3)	4.4 (5.0)	5.2 (4.5)
Арахисовое	3.0 (9.5)	2.9 (6.8)	3.3 (5.2)	4.2 (4.7)	5.1 (4.4)
Кокосовое	2.0 (6.3)	2.6 (6.1)	2.7 (4.2)	3.2 (3.6)	3.5 (3.1)
Пальмитоядерное	0.4 (1.3)	0.5 (1.2)	0.9 (1.4)	1.7 (1.9)	2.7 (2.4)
Кукурузное	0.4 (1.3)	0.6 (1.4)	1.0 (1.6)	1.6 (1.8)	2.0 (1.7)
<b>Всего по группе</b>	<b>18.2 (57.7)</b>	<b>27.1 (63.2)</b>	<b>44.6 (69.9)</b>	<b>66.9 (75.5)</b>	<b>90.0 (78.5)</b>
Сливочное	4.6 (14.6)	5.3 (12.4)	6.3 (9.9)	6.7 (7.6)	7.3 (6.4)
Технический жир	4.3 (13.7)	5.5 (12.8)	6.1 (10.0)	7.3 (8.2)	8.1 (7.1)
Свиной	3.5 (11.1)	4.0 (9.3)	5.0 (7.8)	6.2 (7.0)	7.5 (6.6)
Рыбий	0.9 (2.9)	1.0 (2.3)	1.5 (2.4)	1.5 (1.7)	1.6 (1.4)
<b>Всего по группе</b>	<b>13.3 (42.3)</b>	<b>15.8 (36.8)</b>	<b>19.2 (30.1)</b>	<b>21.7 (24.5)</b>	<b>24.5 (31.5)</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>31.5</b>	<b>42.9</b>	<b>63.8</b>	<b>88.6</b>	<b>114.5</b>

# Масло растений с необычным составом жирных кислот.

Касторовое масло из клещевины – 90% рицинолевой кислоты 12-OH-18:1(n-9); годовое производство – более 500 тыс. т.



*Hydnocarpus laurifolia*  
 $8H_{34}O_2$   
 Масло дерева – 69% годовое производство  
 -OH-18:1 (9t)  
 $8H_{30}O_2$   
 энденовой кислоты  
 $8H_{30}O_2$



Масло индийских растений рода *Hydnocarpus*

*Hydnocarpus laurifolia* (*H. wightiana*) – 49% гид

*Hydnocarpus Kurzii* – 27% чаульмугровой к-ты



82.2% каприновой кислоты 10:0

*Cuphea palustris* – 80.1% лауриновой кислоты 12:0

# Масло растений с необычным составом жирных кислот.


Масла с высоким содержанием стеариновой кислоты (18:0):

**масло какао из шоколадного дерева (*Theobroma cacao*) – 34.4% (+ 34.8% олеиновой кислоты);**

**масло салового дерева (*Shorea robusta*) – 44.3% (+ 40.4% олеиновой кислоты);** в 1975 году было произведено 35 тыс. т.;


**масло масляного дерева карите (*Butyrospermum parkii*) – 44.3% (+ 45.6% олеиновой кислоты);** в 1979 году было произведено 35 тыс. т.

# Биосинтез жирных кислот





# Простые липиды – жиры.



одеаөеëãëöåдеі û (æèđû)

# Составные простых липидов – жирные спирты.



оåòеëі âû é ñі èđò

C<sub>16</sub>H<sub>33</sub>OH



оåðеëі âû é ñі èđò


C<sub>26</sub>H<sub>53</sub>OH



і èðеөеëі âû é ñі èđò

C<sub>30</sub>H<sub>61</sub>OH


# Простые липиды – воски.



R -  $\hat{i} \hat{n}\hat{o}\hat{a}\hat{o}\hat{i} \hat{e}$   
 $\hat{e}\hat{a}\hat{d}\hat{a}\hat{i} \hat{i} \hat{i} \hat{a}\hat{i} \hat{e}$   
 $\hat{e}\hat{e}\hat{n}\hat{e}\hat{i} \hat{o}\hat{u}$

R<sub>1</sub> -  $\hat{i} \hat{n}\hat{o}\hat{a}\hat{o}\hat{i} \hat{e}$   
 $\hat{n}\hat{i} \hat{e}\hat{d}\hat{o}\hat{a}$

$C_{15}H_{31}OH$  -  $\hat{i} \hat{a}\hat{e}\hat{u}\hat{i} \hat{e}\hat{o}\hat{e}\hat{i} \hat{i} \hat{a}\hat{a}\hat{y}$   
 $C_{25}H_{51}OH$  -  $\hat{o}\hat{a}\hat{d}\hat{i} \hat{o}\hat{e}\hat{i} \hat{i} \hat{a}\hat{a}\hat{y}$




$\beta$ - $\hat{n}\hat{e}\hat{o}\hat{i} \hat{n}\hat{o}\hat{a}\hat{d}\hat{e}\hat{i}$

$C_{19}H_{39}OH$  -  $\hat{a}\hat{f}\hat{i}\hat{i}\hat{i}$   
 $n-C_{30}H_{61}OH$  -  $\hat{o}\hat{d}\hat{e}\hat{a}\hat{e}\hat{i} \hat{i} \hat{o}\hat{a}\hat{i} \hat{i} \hat{e}$

# Первичная классификация липидов биологических мембран

15








# Составные части липидов биологических мембран

ãëèöåðî ëèë èäû




более 50% от встречающихся в природе

**ЖК + глицерин (или другие полиолы)**



äèî ëüí û å ëèë èäû




ï ðî åëöèü Ôèø åðà ãëèöåðèäèäî ä

ñô èí ã ëèë èäû




Строительный материал нервных тканей и мозга

**жирные кислоты + сфингозиновые основания**




ñô èí ãäí èí

(2S, 3R)-2-àì èí î î èòàäåäèäî äèè è-1,3




ñô èí ã çèí

(2S, 3R, 4A)-2-àì èí î î èòàäåäèäî -4-äèè è-1,3



öåðàè èäû


Глицерофосфолипиды



Глицерофосфолипиды

Глицерофосфолипиды


Сфингофосфолипиды



Сфингофосфолипиды


Сфингофосфолипиды

Сфинголипиды




Сфинголипиды

Сфинголипиды



Сфинголипиды


Сфинголипиды



$R_1CO$ ,  $R_2CO$  - преимущественно  $C_{16}$ - и  $C_{18}$ -кислоты, причем  $R_1$  - насыщенные, а  $R_2$  - ненасыщенные.

## Они являются

50% их составу принадлежит фосфолипиды. А именно: фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин, фосфатидилinositol.




Их составу принадлежит 15-30% их составу принадлежат фосфолипиды. А именно: фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин, фосфатидилinositol.

## Они являются

А именно: фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин, фосфатидилinositol.

# Фосфолипиды




Аи 10-15% иò иáùáã ëì èè-аñoàà  
 ô î ñô î èèì èäî â â òèáí ýõ ì èäëì ì èòàр-  
 ù èõñü. Èì èàèèçàöèÿ: ì î çã, ñãäöä,  
 ì á-áí ü, ì î ÷èè, ñãèäç, í èà, è, äèèä.


## Ôî ñô àèèäèèñãèèí ù

Âù ñòóí ààò äãäèÿüí ðì ì àèèèáí î ñèè ðÿäà ì àì áðáí î ñãÿçáí í ù õ  
 ô äðì áí ù â; ÿäèÿäòñü ì äãäèäñoäáí í èèì ì ì ðè áèì ñèì òãçã  
 ô î ñô àèèäèèÿòáí î èàì èì î â.


## Ñò èì ã ô î ñô î èèì èäü .



(ñèì æ ù é ýò èð ô î ñô î ðí î é èèñèì òù è  
 ñò èì ã çèì î áí ã î ñí î ááì èÿ)




## Аэеëî ëèï èäû .



# Каскад арахидоновой К-ТЫ

àðàõèäî í î âàÿ èèñèî à

Öèñ, öèñ, öèñ, öèñ - Ýéñ çà-5,8,11,14-òàððàáî í âàÿ èèñèî à









# Простаноиды

25

ферментативно




не ферментативно

$\alpha$ - $\omega$ 18:3


$\alpha$ - $\omega$ 20:4

$\gamma$ - $\omega$ 20:5


$\alpha$ - $\omega$ 22:6




$E_2$




15-F<sub>2t</sub>




15-A<sub>2</sub>



A<sub>2</sub>



7-F<sub>4t</sub>




7-F<sub>4t</sub>

Объект - животные

# Простаноиды

26

ферментативно




$\alpha$ - $\omega$ -18:3


$\alpha$ - $\omega$ -20:4

$\gamma$ - $\omega$ -20:5


$\alpha$ - $\omega$ -22:6



Не ферментативно




12- $\omega$ -7 -  
- $\omega$ -7




$\omega$ -7


растения



$\omega$ -7 6- $\omega$ -1



$\omega$ -7




$\omega$ -7

морские  
организмы


# Препараты простагландинов.

27



Латанопрост (Ксалатан) – антиглаукомное средство (на основе синтетического простагландина группы  $F_{2\alpha}$ ).



Алпростадил – для лечения эректильной дисфункции (на основе синтетического простагландина группы  $E_1$ ).



Мизопростол и Энпростил – противоязвенные средства (на основе синтетических простагландинов группы  $E_1$ ).



Динопрост ( $PGF_{2\alpha}$ ) и Динопростон ( $PGE_2$ ) – в акушерской практике для стимулирования родовой деятельности в любой период беременности