


**Степи Забайкальского края.
Государственный комплексный
заказник Агинская степь. Даурский
заповедник.**

Работу выполнила

Муратова Марина,

2016





- В степной зоне Забайкалья преобладают равнинные территории со средними высотами 600 – 800 м и низкогорья. В схеме поясности растительности выражены только степной и горно-степной пояса. Лишь на древней бортовой террасе Онона встречается сосновый массив – Цасучейский бор и своеобразная степь с редко растущими соснами – Цирик-Нарасун.

Даурский Заповедник

- **Читинская область, Ононский и Борзинский районы**

- **История основания**

Государственный природный биосферный заповедник "Даурский" организован в 1987 году с целью восстановления и сохранения в естественном состоянии степных, озерно-степных и водно-болотных комплексов Юго-Восточного Забайкалья, а также для охраны гнездовых местообитаний околотовных птиц, в частности, единственных в России гнездовой реликтовой чайки.

Заповедник состоит из нескольких изолированных озерных и степных участков общей площадью 45,8 тысяч га.

- **Физико-географические особенности**

Территория заповедника относится к Приононско-Торейскому округу сухих монголо-маньчжурских степей.

В состав заповедника входит озеро Барун-Торей, образующее с озером Зун-Торей единую гидрологическую систему. Интересно, что эти озера имеют непостоянный водный режим, что во многом связано с климатом. За последние 200-220 лет озера неоднократно высыхали и наполнялись с периодичностью около 30 лет. В прошлом столетии озера пересыхали четырежды.

Климат района заповедника резко континентальный с жарким летом и сухой холодной зимой. Особенностью климата является огромная амплитуда колебаний температуры, как суточной, так и годовой, а также неравномерное распределение осадков по сезонам. Самый теплый месяц года - июль (среднемесячная температура +19°+20°С), самый холодный - январь (со среднемесячными температурами -25°С).

Даурский журавль[1][1]

(лат. *Grus vipio*) — птица семейства журавлей) — птица семейства журавлей, обитающая в Восточной Азии, в том числе и на территории Российской Федерации.

Редкий вид, его общая численность по оценкам орнитологов составляет 4900—5300 особей.

Находится под охраной международных и национальных законодательств.



Серый журавль[2][2] (лат. *GRUS GRUS, GRUS COMMUNIS*) — крупная птица) — крупная птица, обитающая в Европе) — крупная птица, обитающая в Европе и Азии) — крупная птица, обитающая в Европе и Азии; второй по численности вид журавлей.



Японский (уссурийский, маньчжурский) журавль^{[1][1]} (лат. *Grus japonensis*) — птица семейства **журавлей**) — птица семейства журавлей, обитающая на **Дальнем Востоке**) — птица семейства журавлей, обитающая на Дальнем Востоке и в **Японии**. Редкий вид, его общая численность оценивается в 1700—2000 особей. Находится под угрозой полного исчезновения и охраняется международным и национальными



Журавль-красавка^[1], или **красавка**^{[2][2]} (лат. *Anthropoides virgo*) — самый маленький^[3]) — самый маленький^[3] и третий по численности (после **канадского журавля**) — самый маленький^[3] и третий по численности (после канадского журавля) представитель семейства **журавлиных** в мире — его численность оценивается в 200—240 т



(лат. *Marmota sibirica*) —
млекопитающее) — млекопитающее
рода сурков) — млекопитающее рода
сурков. Длина — до 60 см. В
России) — млекопитающее рода
сурков. Длина — до 60 см. В России
(в степях Забайкалья и Тувь),
Монголии (исключая юг), Северо-
Восточном Китае. Также
тарбаганами называют
черношапочных сурков. Также
тарбаганами называют
черношапочных сурков на Камчатке и
в Корее. Носитель возбудителя



Даурский ёж^{[1][1]}
(лат. *Mesechinus dauuricus*) —
млекопитающее семейства
ежовых.



млекопитающее), — хищное млекопитающее семейства кошачьих. Своё второе название — **палласов кот** — он получил в честь немецкого натуралиста Петера Палласа Петера Палласа, который впервые описал манула в XVIII веке Петера Палласа, который впервые описал манула в XVIII веке [2] Петера Палласа, который впервые описал манула в XVIII веке [2]. Синонимичное латинское название *Otocolobus* происходит от греческого *us, otos* — ухо,



(монгольский) дзерен, или **зобастая антилопа**[1][1] (лат. *Procapra gutturosa*, *Gazella gutturosa*) — копытное) — копытное животное рода дзеренов семейства полорогих.

Масса тела самцов 24—39 кг, самок 20—28 кг, длина тела самцов 105—148 см, самок 110—121 см, высота в холке самцов 62—84 см, самок 54—74 см, длина хвоста 9—12 см.

У самцов тёмно-серые чёрные рога длиной 18—28 см, у самок рогов нет. Окраска меха сверху желтовато-песчаная, белая снизу.



Лесные полёвки (лат. *Myodes*, или лат. *Clethrionomys*) — род грызунов подсемейства полёвок.



Бёлки (лат. *Sciurus*) — род грызунов — род грызунов семейства беличьих. Кроме собственно рода *Sciurus*, белками называют ещё целый ряд представителей семейства беличьих из родов красные белки (*Tamiasciurus*), пальмовые белки (*Funambulus*) и многих других. Что касается собственно рода *Sciurus*, то он объединяет в себя около 30 видов



Кула́н[1] (джигетай, лат. *Equus hemionus*) — вид из семейства лошадиных. Внешне очень напоминает осла, но имеет немало общих признаков с лошадью, из-за чего кулана нередко называют полуослом



**СПАРЖА КОРОТКОЛИСТНАЯ
(*ASPARAGUS
BRACHYPHYLLUS TURCZ.*)**

Вид из семейства Спаржевые (*Asparagaceae*). Ареал вида в России узко ограничен только территорией Забайкалья, где спаржа коротколистная известна из 5 местонахождений



**НЕОТТИАНТЕ КЛОБУЧКОВАЯ
(*NEOTTIANTHE CUCULLATA* (L.)
Schiechter)**

Представитель семейства Орхидные (*Orchidaceae*). В России распространён на значительной площади, но встречается спорадически.



ТРЁХБОРОДНИК КИТАЙСКИЙ (TRIPOGON CHINENSIS (FRANCH) HACK)

Растение из многовидового семейства Злаковые (Poaceae). В России встречается в Забайкальском крае и в 3 пунктах Еврейского АО.

