

Семейство бобовых

БОБЫ однолетнее травянистое растение семейства бобовых. Кормовая, зерновая и овощная культура (в зелёной массе, зерне, недозрелых плодах- белки, сахара, витамины В, РР, С, каротин). В Евразии, Сев. Африке. Урожайность зерна до 25-30 ц с 1 га, зеленой массы 200-300 ц с 1 га.



Цветение бобов



Горох род одно- и многолетних трав семейства бобовых. 6-7 видов, в Евразии и Африке, Возделывают преимущественно горох посевной- продовольственное (крупа, мука и т. д.) и кормовые (зеленая масса, сено и т. д.) растение.



Фасоль род одно - и
многолетних
растений семейства
бобовых. Свыше 200
видов , в тропиках и
субтропиках
Америки и Африки
Как зерновые
бобовые культуры
возделывают более
20 видов.



Соя род однолетних трав семейства бобовых. 10 видов, во влажных тропиках и субтропиках Азии и Африки. Возделывают сою обыкновенную- зерновая, кормовая и т. Д. Основные плантации в Китае и США.



Клевер около 200 видов, главным образом в Евразии и Сев. Америке. Выращивают в смеси со злаками и в чистом виде, в основном, клевер красный.



Донник
кормовая
культура. Ок.
26 видов, в
Евразии, Сев.
Африке.
Выращивают
донник белый
и жёлтый.



Конец