

# Частная физиология ЦНС


## Передний мозг

2009 г.

# Промежуточный мозг

- К структурам промежуточного мозга относят
- **таламус** – зрительный бугор,
- **эпиталаму** – надбугорье,
- Таламус – это релейная станция мозга, осуществляющая обработку и интеграцию всех сигналов, идущих в кору большого мозга, центр организации и реализации инстинктов, влечений, эмоций, регуляции функционального состояния организма в целом, а также высший центр болевой чувствительности. **гипоталамус** – подбугорье.

# Промежуточный мозг



**Паравентрикулярное ядро**

**Эпифиз**

**Ядро воронки**

**Супрахиазматическое ядро**

**Аденогипофиз**

**Нейрогипофиз**


# Гипоталамус


- Гипоталамус – это многоядерная структура, включающая
- переднюю группу ядер,
- среднюю группу ядер,
- латеральную группу ядер и заднюю группу ядер

# Промежуточный мозг

- **Таламус** – это релейная станция мозга, осуществляющая обработку и интеграцию всех сигналов, идущих в кору большого мозга,
- центр организации и реализации инстинктов, влечений, эмоций,
- регуляции функционального состояния организма в целом,
- а также высший центр болевой чувствительности.

# Таламус





Таламус

# Таламус






Рис.6.29. Топография таламических ядер. **А.** Расположение зрительного бугра в мозге. **Б.** Схема основных ядер зрительного бугра. **1** - правая подушка зрительного бугра; **2** - левая подушка зрительного бугра; **3** - медиальное коленчатое тело; **4** - латеральное коленчатое тело; **5** - вентропостеролатеральное ядро; **6** - передневентральное ядро.

# Таламус



# Таламус

- Функционально ядра таламуса делятся на:
  - **специфические**
- **релейные** (переднее вентральное, медиальное, вендролатеральное, постлатеральное, постмедиальное, латеральное и медиальное коленчатые тела)
- **и ассоциативные** (переднее медиодорсальное, латеральное дорсальное, подушка)
  - **неспецифические** (срединный центр, парацентральноное, центральное медиальное и латеральное, субмедиальное, вентральное переднее, парафасцикулярное, ретикулярное ядрами и перивентрикулярной и центральной серой массой).

# Таламус

- Релейные ядра таламуса получают афферентные входы от зрительной, слуховой, соматосенсорной сенсорных систем и посылают их в IV слой первичных проекционных зон коры.
- Ассоциативные ядра таламуса получают входы от релейных ядер таламуса и посылают сигналы к верхним и нижним слоям ассоциативных зон коры.
- Неспецифические ядра таламуса получают сигналы от РФ ствола мозга и посылают их диффузно во все слои и зоны коры.





Рис. 7-6. Генерация  $\alpha$ -ритма в таламусе. А. Элек-  
 трокортикограммы левой и правой двигательных  
 областей коры кошки. Б. Те же записи после уда-  
 ления левого таламуса путем отсасывания. Пре-  
 обладающий ритм (веретена  $\alpha$ -ритма на фоне  
 барбитуратного наркоза) с левой стороны исчез,  
 с правой не изменился. В. Схема связей пейсме-  
 ров таламуса с корой (между Г, Д, Е и г, д, е)  
 друг с другом. Отдельные пейсмекеры таламу-  
 са соединены при помощи «распределительных  
 нейронов». Длительность и интенсивность коле-  
 баний в цепях отрицательной обратной связи  
 внутри отдельных групп пейсмекеров определяет  
 ритм разрядов таламуса (Г, Д, Е) и возникающей  
 под влиянием этих разрядов электрокортико-  
 граммы (г, д, е) [1, 31].

# Эпиталамус

К структурам эпиталамуса относят

- поводки (уздечка), где располагаются ядра поводков – габенулярные ядра,
- и эпифиз.
- Эпифиз – это железа внутренней секреции, регулирующая цикл «сон-бодрствование». У человека эпифиз получает основные входы от передних гипоталамических ядер, а у низших позвоночных имеется пинеальный орган – «теменной глаз», реагирующий на циклическое изменение уровня освещенности в течение суток. Эпифиз вырабатывает гормоны меланин и серотонин, участвующие в регуляции суточной активности у человека и животных.

# Гипоталамус

- Гипоталамус – это многоядерная структура, включающая
- переднюю группу ядер,
- среднюю группу ядер,
- латеральную группу ядер и заднюю группу ядер

Функционально в гипоталамусе выделяют трофотропную зону (передняя группа ядер), связанную с парасимпатическими стволовыми центрами, и эрготропную (заднюю группу), связанную с симпатическими центрами ствола мозга.

# Гипоталамус

## - **Функции:**

организация эмоциональных, гомеостатических и поведенческих реакции


## **Особенности:**

- чувствительность нейронов к составу омывающей крови
- отсутствие гематоэнцефалического барьера
- способность нейронов к нейросекреции пептидов, нейромедиаторов


## **Строение:**

передняя группа ядер (парасимпатическая)  
средняя группа ядер (снижение влияния симпатической системы)  
задняя группа ядер (симпатическая)

# Топография ядер гипоталамуса



# Гипоталамус



**Паравентрикулярное ядро**

**Эпифиз**

**Ядро воронки**

**Нейрогипофиз**


**Аденогипофиз**

**Супрахиазматическое ядро**


# Гипоталамус

- **Центры гипоталамуса:**
  - Вегетативные центры (передние и задние ядра)
  - Центры теплопродукции и теплоотдачи (передние и задние ядра)
  - Центры голода и насыщения (латеральные и медиальные ядра)
  - Центр жажды (передние ядра)
  - Центры регуляции полового поведения
  - Центры страха и удовольствия (передние и задние ядра)
  - Центры регуляции цикла «бодрствование-сон» (передние ядра).

# Гипоталамус




разрушение  
латерального  
ядра вызывает  
потерю аппетита.



таламус

разрушение  
вентро-  
медиального  
ядра вызывает  
ярость и  
чрезмерный  
аппетит



# Связи гипоталамуса и гипофиза

Задний отдел гипофиза (нейрогипофиз), регулирует водно-солевое равновесие, функции матки и молочных желез

Передний отдел гипофиза (аденогипофиз) – вырабатывает

- АКТГ (стимулирует работу надпочечников)
- Тиреотропный гормон – активация щитовидной железы
- гонадотропный гормон – активация половых желез
- соматотропный гормон – активация роста костной системы
- пролактин – стимулирует рост и активность молочных желез и т.д.