



# Класс Земноводные,

*Цель: познакомить с многообразием класса  
земноводных и особенностью особей этого класса*

*Презентацию подготовила:  
ученица МКОУ СОШ №1,7 «А» класса*

*Воронина Ульяна*

# Амфибии

**Лиловая лягушка**  
**(*Nasikabatrachus sahyadrensis*).**

**Большую часть года  
проводит под землей,  
поэтому была открыта  
лишь в 2003 году. В опасном  
состоянии.**

Фото из журнала [Nature](#)



**b**

**c**

**d**

Photo: Miguel Vences



Лягушки-привидения (род *Heleophryne*). Один из видов встречается исключительно на кладбище в Южной Африке. Два из шести видов находятся в критическом состоянии. Фото из [коллекции Калифорнийского университета в Беркли](#).



**Протей (*Proteus anguinus*). Слеп, имеет прозрачную кожу, охотится, используя обоняние и электрическую чувствительность кожи. Может жить до 10 лет без пищи. В уязвимом состоянии. Фото с [сайта пресс-центра правительства Словении](#)**



**Узкорот лопатоногий (*Scaphiophryne gottlebei*). При опасности надувается. Может лазить по вертикальным скалам. В критическом состоянии. Фото с сайта ["Информационный центр амфибий"](#)**



Лягушка Дарвина (*Rhinoderma darwinii*). В критическом состоянии, возможно, исчезли. Фото из [Wikimedia](#)

[Commons](#)




**Самцы лягушки Дарвина вынашивают головастика во рту. Изображение из коллекции Мичиганского зоологического музея**





**Жабы-повитухи (*Alytes dickhilleni*). Самцы переносят оплодотворенные яйца на задних ногах. В уязвимом состоянии. Фото из [коллекции Калифорнийского университета в Беркли](#)**



Лягушка зооглоссус Гарднера (*Sooglossus gardineri*). Взрослая особь не превышает в длину 11 миллиметров. В уязвимом состоянии. Фото с сайта [Arkive](#)