


Фотосинтез



Фотосинтез у растений

- Фотосинтез — процесс образования органического вещества из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов.




Ли

за

■ Уг
пр
ли
ли

ТСЯ В
В
роне
,



клетки которой богаты хлоропластом.

Чтобы процесс фотосинтеза проходил

непрерывно, клетки должны быть достаточно насыщены водой, устьица регулируют этот процесс.

Строение листа растения
 1 — клетки верхнего эпидермиса, 2 — клетки нижнего эпидермиса; 3 — клетки столбчатой мезофиллы; 4 — клетки губчатой паренхимы; 5 — замыкающие клетки устьиц; щель между каждой из парей — просвет устьица; 6 — кутикула, покрывающая слой как верхнего, так и нижнего эпидермиса; 7 — межклеточные пространства.

Хлоропласты




Основные классы фотосинтетических пигментов

- Хлорофиллы
- Каротиноиды
- Фикобилины

Хлорофиллы

Хлорофилл (от греч. chloros - зеленый и phyllon - лист) — зелёный пигмент, обуславливающий окраску растений в зелёный цвет. При его участии осуществляется процесс фотосинтеза. По химическому строению хлорофиллы — магниевые комплексы различных тетрапирролов. Хлорофиллы имеют порфириновое строение и структурно близки гему.




тетрапирролы,
образующие
циклическую структуру
хлорофилла (магний-
порфирины)

Каротиноиды

- Каротиноиды - природные органические пигменты фотосинтезируемые бактериями, грибами, водорослями и высшими растениями. Идентифицировано около 600 каротиноидов. Они имеют преимущественно жёлтый, оранжевый или красный цвет, по строению это циклические или ациклические изопреноиды.
- Каротины включают две основных группы структурно близких веществ:
 - каротины
 - ксантофиллы
- и другие растворимые в жирах пигменты.

Каротины

Каротины
оранжево-красная
группа



из

Эмпир

воде,


но растворяется в органических растворителях.

Содержится в листьях всех растений, а также в корне

моркови

провит

качеств




Различ

каротин. β -каротин встречается в желтых, оранжевых и зеленых листьях фруктов и овощей. Например в шпинате, салате, томатах, батате и других.

Ксантофилл

- Ксантофилл — растительный пигмент



Зеленый пигмент и желтый — каротин переходят в бензин. В спектре поглощения ксантофилла характерны три полосы поглощения в сине-фиолетовой части.

Фикобилины

Фикобилины (от греч. *phýkos* – водоросль и лат. *bilis* – жёлчь), пигменты красных и синезелёных водорослей (фикоэритрины – красные, фикоцианины – синие); белки из


Открытые

тетрапиррольные

структуры

Группы хромопротеидов, в состав небелковой части которых входят хромофоры билины – аналоги жёлчных кислот. Маскируют цвет основного пигмента фотосинтеза – хлорофилла. Выделены в кристаллическом виде.


Аминокислоты в Ф. составляют 85%, углеводы – 5%, хромофоры – 4–5%. Общее содержание Ф. в водорослях достигает 20% (на сухую массу). Локализованы Ф. в клетке в особых частицах – фикобилисомах. Поглощают кванты света в жёлто-зелёной области спектра. Участвуют в фотосинтезе в качестве сопровождающих пигментов, доставляя поглощённую энергию света к фотохимически активным молекулам хлорофилла. Нередко Ф. называют небелковую (хромофорную) часть этих пигментов.



Флавоноидные пигменты

- Флавоноиды — наиболее многочисленная

группа
липофильных
соединений
гетероциклических
соединений
оранжево-красных
соединений
имеют
друг с
Большинство
рассматриваемых
флавоноидов
растительного происхождения и очень широко
распространены в высших растениях. Они
принимают участие в фотосинтезе,
образовании лигнина и суберина.



Структура флавононов


ие

длежат к
лекулах
енных
нтом.

на или
роль в


Световые и темновые реакции

- Фотосинтез происходит в свету как в




- фазы: световая и темновая
- световая фаза происходит в свету
- темновая фаза происходит в темноте

- Из схемы синтеза фотосинтеза можно увидеть, что образуются органические вещества из углекислого газа и воды при освещении. Эта реакция называется фотосинтезом.



печивает: 1) НАДФН; 3) электроны для... также к... используется в... жит для... водов, ...вой фазы... теза за счет... НАДФ-Н... также идут... сходить и в... ДФН. По... еза назван...): клетки... ст с гранами,

Световые и темновые реакции



Световые реакции:

Зависят от света

Не зависят от температуры

Быстрые < 10 (-5) сек

Протекают на мембранах

Темновые реакции:

Не зависят от света


Зависят от температуры

Медленные ~ 10 (-2) сек

Протекают в строме Хл


Световая фаза фотосинтеза

- Световая фаза фотосинтеза осуществляется в



а.

Световые реакции




1. Введение энергии в биологические системы через воспринимающие пигментные системы
2. Преобразование энергии света в «биологическую энергию»

Темновая фаза фотосинтеза

- В темновую фазу фотосинтеза энергия, накопленная клетками в молекулах АТФ, используется на синтез глюкозы и других органических веществ. Глюкоза образуется при восстановлении углекислого газа - CO_2 ; с участием протонов воды и НАДФ•Н.
- В молекуле углекислого газа содержится один атом углерода, а в молекуле глюкозы их шесть ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$).
- Углекислота, проникающая в лист из воздуха, вначале присоединяется к органическому веществу, состоящему из пяти углеродных атомов. При этом образуется очень непрочное шестиуглеродное соединение, которое быстро расщепляется на две трехуглеродные молекулы. В результате ряда реакций из двух трехуглеродных молекул образуется одна шестиуглеродная молекула глюкозы. Этот процесс включает ряд последовательных ферментативных реакций с использованием энергии, заключенной в АТФ. Молекулы НАДФ•Н; поставляют ионы водорода, необходимые для восстановления углекислого газа.
- Таким образом, в темновой фазе фотосинтеза в результате ряда ферментативных реакций происходит восстановление углекислого газа водородом воды до глюкозы.

- Восстановление углерода происходит в строме хлоропласта в цикле реакций, известных как цикл Кальвина. Цикл Кальвина - не единственный путь фиксации углерода в темновых реакциях. У некоторых растений первый продукт фиксации CO_2 - не трехуглеродная молекула 3-глицерофосфата, а четырехуглеродное соединение - оксалоацетат. Отсюда этот путь фотосинтеза получил название C4-пути (C4-растения). Оксалоацетат затем быстро переносит CO_2 к РБФ цикла Кальвина. Существует особая анатомическая структура в мезофиле листа (крайц-структура) - Kranz-анатомия с C4-путем фотосинтеза. У C4-растений цикл Кальвина осуществляется по преимуществу в клетках обкладок проводящих пучков, а C4-путь - в клетках мезофилла. Интенсивность фотосинтеза у C4-растений в 2-3 раза выше, чем у C3-растений, но они в пределах одного растения пространственно разделены. C4-растения более экономно утилизируют CO_2 , чем C3-растения, отчасти благодаря тому, что фосфоенолпируваткарбоксилаза не ингибируется O_2 и, таким образом, C4-растения обладают способностью поглощать CO_2 с минимальной потерей воды. Кроме того, у C4-растений практически отсутствует фотодыхание - процесс выделения CO_2 и поглощения O_2 на свету.

C4- путь фотосинтеза




фотосинтетически активная радиация

- ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИ АКТИВНАЯ РАДИАЦИЯ (ФАР) , часть солнечной энергии, к-рая может использоваться растениями для фотосинтеза. Соответствует полосе видимого света и составляет ок. 50% от суммарной энергии солнечного излучения.

Спектры поглощения


ФАР : 380 – 710 нм



Хлорофиллы:

в красной области спектра
640-700 нм

в синей - 400-450 нм



Каротиноиды: 400-550 нм
главный максимум: 480 нм

Зелёные насаждения

- Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории. В городах они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей города, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна города и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:
 - поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;
 - понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;
 - снижение уровня шума;
 - снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;
 - защита от ветров;
 - выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;
 - положительное влияние на нервную систему человека.

- Зелёные насаждения делятся на три



на одного человека.

Лиственные насаждения

1,

X

2