




Кафедра гистологии

ПЕЧЕНЬ

Выполнила:
Студентка 1 медицинского ф-та
Группа 209
Межмидинова Эльвина
Куртаметовна

Преподаватель:
Купша Елена Ивановна

Симферополь. 2012 год.



ФУНКЦИИ:

- **Общесоматическая** – участие в обмене белков, липидов, углеводов, пигментов, витаминов, гормонов.
- **Секреторная:** экзокринная – выделение желчи в кишку, эндокринная – выделение в кровь синтезированных и метаболитически преобразованных продуктов.
- **Защитная** – фагоцитоз, разрушение приносимых кровью токсинов, микроорганизмов и т.д.
- **Обезвреживающая** - обезвреживание чужеродных продуктов и соединений, приводящая к снижению токсичности в-ва.
- **Кроветворная** (внутриутробный период)

Как устроена
печень





- ? Печень покрыта висцеральным листком брюшины и тонкой соединительнотканной капсулой (Глиссона), отдающей вглубь органа прослойки, разделяющие его на дольки.
- ? 500 000 долек

? **ДОЛЬКА** – это блок тканей шестиугольной формы, $d=1-2$ мм.

? **Она состоит из:**

- ? а) центральной вены,
- ? б) радиально расположенных печеночных балок,
- ? в) синусоидных капилляров (между двумя балками),
- ? г) желчных капилляров (между 2-мя гепатоцитами).








Рис. 9.3. Схема микроструктуры печени: ДП — долька печени; ПТ — портальная триада; ПА — печеночный ацинус

? **Печеночная балка** (пластинка) – это группа анастомозирующих гепатоцитов толщиной в одну клетку.

? **Гепатоцит (составляет более 80% клеток печени)** – это клетка эпителия, образующая перенхиму печени. Он содержит 1-2 ядра и развитую грЭПС и аЭПС. Продолжительность жизни 200-400 сут.

? **Функции:**

? 1) Синтез (в гр.ЭПС, выделяются в пространство Диссе) и секреция белков плазмы крови – альбуминов, фибриногена.

? 2) В аЭПС осуществляются: а) синтез гликогена из глюкозы, б) распад гликогена до глюкозы и секреция глюкозы в кровь.


? 3) Секреция в кровь липопротеиновых частиц,

? 4) Секреция пигмента билирубина и желчных солей в желчный капилляр,

? 5) Синтез (в аЭПС) малотоксичной мочевины из

? Синусоидный капилляр

- ? Образует анастомозирующую сеть, несущую кровь от периферии к центру. Получают смешанную артериально-венозную кровь.



СТЕНКА КАПИЛЛЯРА

1 — эндотелиоциты: -60% клеток, формирующих стенку капилляра. Имеют

а) вытянутые ядра, а также (ближе к центру дольки)

б) фенестры (истончения цитоплазмы) и далее в) мелкие поры (1А).

2 — клетки Купфера, или звездчатые

макрофаги: -40% клеток стенки капилляра; Ядра тоже вытянутые, но форма клеток — отростчатая.

Ф-я: фагоцитоз бактерий и старых эритроцитов.


Способны также представлять антигены лимфоцитам.

3) 20%-перисинусоидальные **липоциты** (жиронакапливающие кл., клетки Ито в прост-ве Диссе).

Ф-я: а) депо витаминов А и D, б) при стимуляции **алкоголем** секретируют много **коллагена**, что приводит к **ЦИРРОЗУ** печени.

4) **pit-клетки** (5%)

Ф-я: элиминация раковых клеток



? ОКРУЖАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО

4 — пространство Диссе, или вокругсинусоидное пространство: находится вокруг капилляров (между ними и гепатоцитами).

Содержит сеть ретикулярных волокон, поддерживающих капилляры.


? 5 — **клетки Ито**, или перисинусоидальные липоциты: по размеру — небольшие. Содержат мелкие (не сливающиеся) капли жира, в которых могут депонироваться жирорастворимые витамины. Синтезируют коллаген III типа, образующий ретикулярные волокна.

? **Лимфоциты**, в т.ч. большие гранулированные лимфоциты, или **ямочные (pit-) клетки** (на схеме не доказаны): в отличие от прочих лимфоцитов, содержат гранулы.



Это НК-клетки (естественные киллеры), которые узнают и уничтожают видоизмененные клетки организма.

? 6 — гепатоциты и у них — 6A — микроворсинки на стороне, обращенной к пространству Диссе

Кровообращение в печени.



1-5 — ветви печеночных артерий и воротной вены идут в составе триад;
6 — капилляры: отходят от вокругдольковых артерий и вен и вступают в дольку, где сливаются в
7 — внутрислобковые синусоидные капилляры (идущие к центру дольки);
8 — центральная вена: принимает в себя синусоидные капилляры и проходит по оси дольки;
9 — поддольковые вены: продолжения центральных вен вне дольки.



Печень человека


Окраска гематоксилином и эозином

а) Малое увеличение


1— триада (на границе долек);

2 — центральная вена (в центре дольки);

3 — поддольковая вена: по размеру — крупнее центральной; является продолжением последней за пределами дольки.




**б) Среднее
увеличение**



1 — центральная
вена: вена
безмышечного типа.
В ее стенке:
1А — эндотелий,
1Б — тонкий слой
соединительной
ткани;
2 — печеночная
балка;
3 — синусоидные
капилляры (между
балками) и в их
стенке:
3А —
эндотелиоциты и
звездчатые
макрофаги (и те, и
другие имеют
уплощенные ядра).

в) Большое увеличение



1 — печеночные балки и образующие их

2 — гепатоциты: крупные клетки с округлыми ядрами.


Составляют -60% клеток печени.

Многие гепатоциты (до 20%) — двуядерные, а многие ядра (до 50%) — полиплоидные.


В цитоплазме хорошо развиты все основные органеллы и содержатся разнообразные включения — гликогена, липидов, пигментов (см. рис. 23 и 24).

Гепатоциты выполняют разнообразные функции: желчеобразование, синтез компонентов плазмы крови, депонирование углеводов, обезвреживание веществ.


Внутрипеченочные сосуды и протоки



Внутридольковые (желчные капилляры и терминальные ж. каналцы Геринга),
междольковые ж.пути



Долевые правый и левый. Общий печеночный. Пузырный, желчный



Желчные капилляры в печеночной дольке

1 — кровеносный синусоидный капилляр;

2 — гепатоциты: лежат в составе двуслойных балок.

Стороны гепатоцита:

2А— васкулярная сторона: обращена к «кровеносному капилляру (в пространство Диссе).

Здесь происходит двусторонний обмен веществами между кровью и гепатоцитами.

2Б — билиарная сторона: обращена к желчному капилляру.

Здесь имеет место, видимо, только односторонний поток веществ — компонентов желчи из гепатоцитов в желчные капилляры.

И на васкулярной, и на билиарной стороне гепатоциты имеют микроворсинки.


3 — желчные капилляры: небольшие пространства без собственной стенки между двумя рядами (слоями) гепатоцитов в каждой печеночной балке. Ток желчи по этим капиллярам идет от центра дольки к ее периферии.

ТРИАДА

4 — вокругдольковый желчный проток, или холангиола: сюда впадают желчные капилляры;



5 — вокругдольковая артерия;

6 — вокругдольковая вена.




Желчные внутрипеченочные протоки

Окраска гематоксилином и эозином



1 — междольковый желчный проток и в его стенке:
1A — однослойный кубический эпителий (в более крупных протоках эпителий — цилиндрический) **1B** — соединительнотканная оболочка;
2 — междольковая вена, **3** — междольковая артерия.

Стенка желчного пузыря



СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА:

1 — складки;

2 — однослойный цилиндрический каемчатый эпителий;

3 — собственная пластинка: богата эластическими волокнами. В области шейки пузыря здесь находятся слизистые железы.

4 — МЫШЕЧНАЯ ОБОЛОЧКА:



тонкая; пучки мио-цитов ориентированы циркулярно.

5 — НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА

образована плотной волокнистой соединительной тканью; содержит:

5 А — сосуды.

Нижняя поверхность пузыря покрыта мезотелием.




1 — печеночная долька: по классическим представлениям, имеет вид призмы (шести- или пятигранной);
 2 — соединительнотканые перегородки между дольками (септы): в печени свиньи выражены особенно хорошо (тогда как у человека в норме развиты слабо);
 3 — центральная вена: является центром радиальной структуры дольки.

ТРИАДА (находится на стыке долек, что позволяет примерно определить положение их границ):

1 — междольковая артерия,
 2 — междольковая вена,
 3 — междольковый желчный проток.
 4 — синусоидные капилляры: выглядят как светлые пространства (часто заполненные эритроцитами) в паренхиме дольки;
 5 — гепатоциты; образуют балки: на поперечном срезе — это двойные ряды клеток между синусоидными капиллярами; в объемной же призмоподобной дольке это двуслойные стенки, часто анастомозирующие (сливающиеся) друг с другом над или под синусоидными капиллярами;

6 — центральная вена: к ней сходятся и капилляры, и балки



**БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!!!**



**БЛАГОДАРЮ
ЗА
ВНИМАНИЕ!!!**

