


Фізіологія нейрона. Збудження та гальмування в ЦНС. Інтегративна функція нейронних ланцюгів.

Підготувала
Викладач фізіології
Дромашко М.В.

Функціональна характеристика нейрона

- морфологічно нервова система представлена двома типами клітин: **нейронами і нейроглією**
- **нейрон**-це клітина ,яка складається з тіла(сома) та відростків:коротких гіллястих-дендритів,та довгого аксону який бере участь в утворенні нерва
- з нейронів побудована нервова система;
- Автоматія;




Функції нейрона



Реагування на подразнення зовнішнього та внутрішнього середовища;



Встановлення контактів з іншими нейронами та клітинами органів за допомогою синапсів;



Прийняття, обробка та збереження інформації;



Регуляція ніяльності органів та систем організму;



Формує поведінку, вищу нервову, психічну діяльність

Види нейронів



АФЕРЕНТНІ (ЧУТЛИВІ) -
виконують функцію
отримання і передавання
інформації вище лежачі
структурі ЦНС від
рецепторів

- Уніполлярні;
- Біполярні;
- Псевдоуніполлярні тобто мають один Т - подібний відросток отримують сенсорну інформацію від рецепторів і здійснюють передачу іншим нейронним центрам.

Види нейронів



ЕФЕРЕНТНІ (ЕФЕКТОРНІ)
посилають нервові
імпульси за рахунок
довгого аксона в
нижчерозташовані структур
и ЦНС, в нервові вузли, які
знаходяться за її
межами до виконавчих
органів ,
мультиполлярні (мають один
аксон і декілька дендритів)

Види нейронів

ВСТАВНІ (ПРОМІЖНІ ,АСОЦІАТИВНІ)

найбільш чисельні ,забезпечують взаємодію між нейронами однієї структури ,мультиполярні можуть бути збуджувальними і гальмівними



Види нейроні

нервові волокна

- відростки нервових клітин(осьовий циліндр), які вкриті оболонками:

Мієлінові


- в ЦНС і ПНС
- висока швидкість проведення збудження
- вкриті нейролемою
- Нервовий імпульс поширюється стрибкоподібно від одного **перехвату Ранв'є** до іншого

Безмієлінові волокна


- вегетативна (автономна)НС
- мала швидкість проведення збудження
- Нервовий імпульс по немієліновому волокну поширюється безперервно




Сообщение передается очень быстро
(со скоростью около 400 км/час)



Нормальный нерв – миелиновая оболочка не повреждена




Сообщение передается медленно (скорость около 4 км/час)



Поврежденный нерв – миелиновая оболочка повреждена или разрушена




властивості нервового волокна:

- Збудливість
- Провідність;
- закон двосторонньої провідності;
- закон ізольованої провідності.



нейроглія

- неоднорідні клітини, що заповнюють простір між капілярами та нейронами
- Астроцити
 - беруть участь у створенні ГЕБ
 - в обміні медіаторів, іонів
 - синтезують фактори регулятори росту та розвитку нейронів
- Олігодендроцити
 - утворюють мієлінову оболонку нейронів
 - поглинають деякі м/о
- Мікログлія- беруть участь у фагоцитозі
- Епендимоцити- вистилають шлуночки головного мозку, беруть участь в утворенні спинномозкової рідини






Різновиди клітин нейроглії

СИНАПСИ

ЦНС

- кожний нейрон прямо або опосередковано взаємодіє з тисячами інших нейронів завдяки синапсам:
- будова-нервове
пресинаптичне закінчення
(містить гранули
нейромедіатора), пре-
синаптична мембрана,
синаптична щілина,
постсинаптична мембрана(з
рецепторами до
нейромедіатора)





Синаптический пузырек вы свобождает нейромедиатор (Synaptic vesicle releases neurotransmitter).

Медиатор в макроподынегают (Mediator binds to macrophages).


Поглощением ионов K⁺ и Na⁺ (Absorption of K⁺ and Na⁺).

Пресинаптическое поглощение ионов K⁺ и Na⁺ (Presynaptic absorption of K⁺ and Na⁺).

Активация боксилоглутаматного рецептора (Activation of glutamate receptor).

Класифікація синапсів

ЗА МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛА



Класифікація синапсів

- Аксо-дендритичні;
- Аксо-аксональні;
- Аксо-соматичні
- ефектори(рухові та секреторні);
- рецептори;
- міжнейронні синапси-спеціалізовані контакти нервових клітин, що проводять імпульси в одному напрямку.

Види центрального гальмування

Процес гальмування – обмежовує потрапляння нервових імпульсів до еферентних нейронів, це має визначне значення для координації діяльності ЦНС, звільняє її від переробки несуттєвої інформації.

- Гальмування – це зменшення, або повне припинення відповідної реакції на подразнення.
- В ЦНС гальмування – активний процес а не втома нейронів.
- Гальмування зв'язане з існуванням гальмівних нейронів, які вони іннервують (вставні нейрони Реншоу, а в мозочку нейрони Пуркіньє).

Гальмівні синапси

- Гальмування забезпечується гальмівними синапсами
 - пресинаптичне(зупинка вивільнення нейромедіатора в пресинаптичній мембрані)
 - постсинаптичне(зниження чутливості постсинаптичних рецепторів соми та нейронів)
- МЕДІАТОРИ: ГАМК, гліцин
- гальмівні синапси розміщені між збудливими синапсами
- гіперполяризація-Гальмівний постсинаптичний потенціал



Нейромедіатори і їх види

ІСННОУСТДАІОН І IV РНІН

Нервовий центр(НЦ)

- **сукупність нейронів , які регулюють певну функцію організму та беруть участь у здійсненні рефлексів.**
- Нервові центри входять до складу ЦНС і складаються з багатьох тисяч і навіть мільйонів нейронів, зібраних компактно або розміщених в різних відділах ЦНС, але об'єднаних функціонально.
- Центр мови знаходитьться в скроневій, лобовій і тім'яній долях лівої півкулі головного мозку

Властивості нервових центрів

післядія після припинення подразнення
аферентних нервів по еферентних шляхах
продовжують надходити від ЦНС до виконавчих
органів нервові імпульси

Інтегративна функція ЦНС

- Інтеграція – це узгодження і об'єднання діяльності різних систем в єдине ціле.
- Принципи інтеграції:
- **КОНВЕРГЕНЦІЯ ЗБУДЖЕННЯ**-імпульси, які проходять в ЦНС можуть сходитись до одних і тих же рухових нейронів
- **ДІВЕРГЕНЦІЯ ЗБУДЖЕННЯ**-здатність нейрона встановлювати чисельні зв"язки з іншими нейронами (одна і та сама нервова клітина бере участь у багатьох процесах, забезпечуючи іrrадіацію збудження)
- **СУМАЦІЯ ЗБУДЖЕННЯ**-при частому та тривалому надходження імпульсів підпорогової сили вони сумуються і виникає залповий ПД(чхання)
- **ІRRАDІАЦІЯ ЗБУДЖЕННЯ**-нервові імпульси при тривалому подразненні рефлекторних центрів можуть викликати збудження сусідніх рефлекторних полів

Координаційна функція ЦНС;

- - реципрокна іннервація
- - принцип домінанти
- - принцип кінцевого шляху
- **Координація** – це узгоджувальна взаємодія окремих рефлексів з метою пристосування до умов існування. (Який рефлекс в першу чергу, який в другу, в третю...).



Координаційна функція ЦНС:

Принцип реципронності (успиральний принцип) полягає в тому, що при збудженні одних нервових центрів діяльність інших може гальмуватись.

Цей принцип реципронності був показаний на діяльності м'язів антагоністів - згинаючій і розгинаючій.

- Принцип загального кінцевого шляху. Чутливих нейронів набагато більше ніж рухових, й тому різні аферентні шляхи зводяться до загальних вихідних шляхів.
- Принцип зворотнього зв'язку. При скорочені скелетних м'язів подразнюються їх пропріорецептори, які посилають імпульси в ЦНС, які контролюють силу та інші характеристики м'язового скорочення.
- Принцип домінанти лежить в основі узгоджувальної діяльності організму.
- Домінанта - тимчасово пануюче вогнище збудження в ЦНС, яке визначає характер відповідної реакції організма на зовнішнє і внутрішнє подразнення.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ