



Курганская область, Петуховский район, МОУ «Новогеоргиевская СОШ»

Грибы - паразиты

Выполнила:
учитель биологии и химии
первой квалификационной категории
Яковлева Лариса Александровна



Грибы – паразиты зерновых

СПОРЫНЬЯ

болезнь злаков, а также названия. Известны завязи растений, пораженные спорыньями. Наиболее распространены спорынья пурпурные на колосьях злаков, поражающие зерна вместо зерен синие и черно-фиолетовые, содержащие эмульгаторы и алкалоиды. Применяется в муке или кормах для животных при тяжелом заболевании ("ведьмины кони", "огонь"). Для гонконгской медицины, спорынья пурпурные считаются ядовитыми и культивируются.



- ГОЛОВНЯ, болезнь растений, вызываемая головневыми грибами. Несколько видов:
твёрдая, пуховая, стеблевая, колосистая. Наиболее опасна для злаковых культур: рожь, кукурузы, ячменя, овса, пшеницы. Почки, стебли и листья покрываются темную сплошную массой.





МУЧНИСТАЯ РОДА - обобщенное название болезней растений, вызываемых разными мучнисторосляными грибами, которые поражают многие сельскохозяйственные культуры, древесные породы. На листьях, стеблях, плодах развивается мучнисто-белый порошистый налет, плоды растрескиваются и загнивают.



Грибы – паразиты деревьев

ТРУТОВЫЕ ГРИБЫ
Плодовые тела
мясистые, кожистые
или деревянистые,
часто копытообразной
формы (напр., у чаги).
Ок. 600 видов, обитают
на древесине, разрушая
ее; вызывают гибель
деревьев.



Трутовики



Окаймленный трутовик - дереворазрушающий гриб. Вызывает гниение стволов лиственницы, кедра, березы, ели, сосны, осины, ольхи.



Трутовик зимний.
На древесине лиственных пород.



Трутовик серно-желтый вызывает красно-бурую стволовую гниль ивы, липы, березы, кедра, ели, сосны.



Плоский трутовик.
Паразит ели и сосны.

Чага – берёзовый гриб. Применяется в медицине
Замедляют рост опухолей разного происхождения
и нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта.
Настой используется для лечения злокачественных опухолей
различной локализации.



Парша растений

- I
E
F
D
R
T



- ФИТОФТОРА паразитируют на растениях (вызывают фитофторозы); некоторые живут и как сапрофиты. Около 70 видов, распространены широко.





- ЧЕРНАЯ НОЖКА,
болезнь растений,
вызываемая
паразитическими
почвенными грибами,
реже бактериями.
Поражает картофель,
морковь, очень часто
рассаду, комнатные
растения



Разрушители древесных
построек

- ДОМОВЫЕ ГРИБЫ вызывают гниение древесины в постройках, 50 видов. Наиболее опасны настоящий и белые домовые грибы. Домовой гриб при разложении древесины выделяет воду (до 10 л на кубометр дерева), поэтому серая пленка всегда покрыта каплями воды и любое строение он быстро превращает в труху.

Домовой гриб





Грибковые заболевания у животных и человека

Микроспория, трихофития

- МИКРОСПОРИЯ
ЛИЦА
Зародыш
или
ПОКРЫТИЕ
пятна
ГОЛОВЫ
высокий
чаша



щий
тных.
ека
ния:
е
части
бы
текает

Микозы стоп и ногтей



Кандидоз

- МОЛОЧНЫЙ КАНДИДОЗ (внутренних полостей грудных образований язвочек)



ом
ки
м у
гов,



Домашнее задание

- §10 учебника