

***Тема: ИССЛЕДОВАНИЯ Г.МЕНДЕЛЯ.
МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ.
I и II ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ.***



Механизмы и закономерности наследования признаков раскрыл чешский исследователь-любитель Грегор Мендель. Он сумел правильно поставить задачу

исследования – выяснить, как наследуются отдельные признаки.

Для этого он применил гибринологический метод. Для скрещивания он отбирал родительские формы с константными, т.е.

воспроизводящимися из поколения в поколение, признаками. Им выбирались родительские растения, контрастно отличающиеся друг от друга по парам альтернативных признаков.






Удачно был выбран Менделем объект исследования – садовый горох. Он легко культивируется, неприхотлив, дает многочисленное потомство. У гороха он изучал характер наследования по семи признакам: окраска цветков, окраска плодов, высота стебля, форма бобов, окраска семян, поверхность семян, расположение цветков.




МОНОГИБРИДНЫМ –

**НАЗЫВАЕТСЯ ТАКОЕ СКРЕЩИВАНИЕ, ПРИ
КОТОРОМ РОДИТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗМЫ
ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА ПО ОДНОЙ
ПАРЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ.**

В одном из опытов Мендель изучал наследование окраски семян при скрещивании растений, выращенных из **желтых** семян, с растениями, выращенными из **зеленых** семян. В первом поколении все гибриды были одинаковыми, причем проявлялся признак только одного родителя.







Преобладание признака одного из родителей было названо доминированием. Явление доминирования у гибридов первого поколения одного признака над другим и единообразии гибридов первого поколения было названо законом единообразия гибридов первого поколения или **первым законом Менделя**.

I закон: *при скрещивании двух особей одного вида, отличающихся по **одному** признаку, гибриды первого поколения будут **единообразными***

Во втором поколении при самоопылении гибридов первого поколения обнаружилось выщепление подавленного (рецессивного) в предыдущем поколении родительского признака у $\frac{1}{4}$ части потомства: $\frac{3}{4}$ растений имели горошины желтого цвета и $\frac{1}{4}$ растений имели горошины зеленого цвета.





Следовательно, рецессивный признак у гибридов первого поколения не исчез, а только был подавлен и вновь проявился во втором поколении. Это обобщение было названо законом расщепления или вторым законом Менделя

II закон: *при скрещивании гибридов первого поколения между собой во втором поколении наблюдается расщепление признаков в соотношении 3:1*



· · · · ·
· *Выявленные Г.Менделем закономерности не* ·
· *были поняты его современниками и по* ·
· *достоинству оценены только через 35 лет. В* ·
· *1900 году Г.де Фриз (Голландия), К. Корренс и Э.* ·
· *Чермак обнаружили те же закономерности* ·
· *наследования, что и Мендель. Но приоритет* ·
· *остался за Г. Менделем.* ·
· · · · ·