

Лекция 4

Методика исследования

Исследования современных и ископаемых диатомей
слагается из нескольких этапов:

- 1) сбор материала в природе,
- 2) техника извлечения и очистка панциря и створок,
- 3) приготовление постоянных препаратов,
- 4) таксономическая обработка,
- 5) оформление результатов исследования.

Сбор материала

- Осадочные породы (пробы отбираются из обнажений или из керна при бурении).
- Донные осадки современных морей и озер собираются с помощью специального оборудования (грунтовые трубки) (берутся колонки осадков).
- При бурении на торфяниках и озерах пробы берутся с помощью торфяного бура.
- В мелких водоемах берутся пробы обрастания и поверхностного грунта, а в более глубоких – также и планктон.
- Фитопланктон собирается планктонной сетью (с 68-78 отверстий в 10 мм) для таксономической обработки видов, а для количественной обработки используют сборы непосредственно в сосуд (батометр) 0,5-1-5 л.
- Все сборы снабжаются подробными этикетками.
- Пробы современных диатомей фиксируются немедленно на месте их сбора 40% формалином.

Техника лабораторной обработки

- **Осадочные породы:**

- Разрыхление пород, обогащение их диатомеями и очищение панцирей от органических и минеральных веществ.
- Разрыхление – кипячение в 10% растворе пергидроля или 5% растворе пирофосфата натрия.
- Удаление карбонатов и органических веществ: кипячением в 10% HCl, после отмывания осадка добавляют H₂SO₄ и кипятят до просветления осадка, затем добавляют NaNO₃ или KNO₃ до полного обесцвечивания осадка.
- Для выделения крупных диатомей рекомендуется метод разделения на фракции. Целые панцири крупных диатомей остаются во фракции, Получаемой на сите с диаметром отверстий 0,65-0,075 мм. Выделение средней фракции, наиболее обогащенной остатками диатомей, производят отмучиванием.
- Разделение средней фракции тяжелой кадмиевой жидкостью с удельной массой 2,6.

- **Донные осадки современных морей и океанов**

- Разрыхление осадка (дезинтеграция) и очищение панцирей от загрязнений достигается путем его обработки двудецимолярным раствором триполифосфата натрия ($\text{Na}_2\text{P}_3\text{O}_{10}$).
- Для обогащения суспензию натурального осадка пропускают через сито с отверстиями 0,1 мм для удаления крупного и среднего песка и через сито с отверстиями 0,05 мм для отделения крупного алеврита от мелкого. Мелкий алеврит очищают от пелита (частиц меньше 0,01 мм) отмучиванием. Из крупного и мелкого алеврита (отдельно) выделяют легкую фракцию с диатомеями с помощью тяжелой жидкости.
- Триполифосфат натрия удаляется дистиллированной водой путем многократных сливов через интервалы 5-6 часов. Отмывается триполифосфат также в центрифуге – 5-6 разовые сливы через 3 мин.

- **Современные диатомеи**

- Собранный фиксированный материал по современным диатомеям перед дальнейшей работой с ним в лаборатории следует разделить на две части. Одна часть пробы, в которой среди других диатомей присутствуют формы с тонкоструктурным панцирем, растворимым в кислотах при сжигании органического вещества (очень многие компоненты морского планктона – виды рода *Chaetoceros*, *Rhizosolenia* и др.), используется для таксономических целей во временных препаратах без специальной технической обработки. В этой же части пробы исследуются типы колоний, распадающихся при кипячении в кислотах, а также изучаются виды диатомей, для определения которых необходимо знать количество и форму хлоропластов и некоторые другие морфологические признаки.
- Вторая часть пробы подвергается технической обработке, состоящей в очистке панцирей и приготовлении из них постоянных препаратов. Очистка панцирей производится в четыре последовательных приема: а) очистка пробы от случайных примесей, б) отмывка ее от фиксатора и растворимых солей, в) удаление из пробы нерастворимых

Среды

- Для определения диатомей главными признаками являются форма панциря и его структура. Структура или не четко различима, или вовсе не видима в воде, глицерине, спирте, канадском бальзаме, т.е. в средах, показатель преломления (n) которых близок к показателю преломления кремневого панциря диатомей ($n=1,43$) или равен ему. Для четкой видимости деталей структуры употребляют высокопреломляющие среды, в которые заключают панцири.
- Стиракс ($n=1,58\div 1,62$), ароматический бальзам, получаемый из сока деревьев ликвидамбор.
- Среда Кольбе ($n=1,63$), приготовляемая из пиперина (алкалоид, экстрагируемый из черного перца) и канифоли (твердая смола хвойных деревьев).
- В последнее время широкое применение получили синтетические смолы в связи с их дешевизной и простотой приготовления.
- В России общеупотребительна среда Эльяшева ($n=1,67\div 1,68$), состоящая из анилина, формальдегида и уксусной кислоты (Эльяшев, 1957).

- Для приготовления препарата из небогатого материала на покровное стекло, предварительно обезжиренное, наносится мерной пипеткой 0,1 см³ суспензии осадка, которая при этом взбалтывается. Если проба (0,5 г осадка) была разведена в 100 см³ воды, то суспензия в 0,1 см³ соответствует 0,5 мг осадка, а при разведении пробы в 50 см³ воды – 1 мг осадка. Препарат подсушивается при комнатной температуре и заключается в смолу с высоким показателем преломления. Подсчет количества диатомей обычно производится в 5-8 горизонтальных рядах препарата с последующим пересчетом на весь препарат. Среднее число диатомей в 1 ряду препарата умножается на 120, т.е. на количество горизонтальных рядов на покровном стекле 18x18 при иммерсионном объективе 90 и окуляре 7, или на 80, если используется объектив 60. Так определяется количество створок диатомей в одном препарате, или в 0,5 мг осадка.
- При дальнейшем пересчете получаем данные количественного содержания створок диатомей в 1 г осадка. Пересчет производится следующим образом. Предположим, что среднее количество створок диатомей в 1 ряду препарата равно 37, тогда во всем препарате, или в 0,5 мг осадка, количество створок будет $37 \times 120 = 4400$. Для пересчета на 1 г осадка $4400 \times 2000 = 8\,800\,000$. Следовательно, в 1 г осадка будет 8 800 000 створок или 4 400 000 панцирей диатомей. Параллельно подсчитываются створки каждого вида в препарате, что можно выразить на диаграммах в абсолютных числах или в процентах от общего количества створок других видов.


Оформление результатов исследования

Т а б л и ц а


Образец систематической таблицы диатомей по разрезам
(скважина № 44, водораздел рек Тосны и Саблилки, коллекция
О. М. Н. . . . , 1967 г., ЛГУ)

Вид	Номера препаратов по журналу лаборатории, литология, глубина взятия (м) и номера образцов				
	75	74	73	72	71
	межморенные глины			надморенные суглинки	
	15.0	14.5	14.0	7	6.5
	30	28	26	18	17
Морские и солоноватоводные виды					
<i>Hyalodiscus scoticus</i> (Kütz.) Grun. . .	2	2	1	—	—
<i>Actinoptychus undulatus</i> (Bail.) Ralfs . .	4	3	2	—	—
<i>Grammatophora oceanica</i> (Ehr.) Grun.	6	3	2	—	—
Пресноводные виды					
<i>Fragilaria virescens</i> Ralfs	—	—	1	1	1
<i>Eunotia arcus</i> Ehr.	—	—	—	1	2

Оформление результатов исследования



Оформление результатов исследования



Оформление результатов исследования




Рис. Распределение створок *Coscinodiscus marginatus* Ehr. в поверхностном слое осадков Берингова моря (Жузе, 1962).

1 — в массе; 2 — нередко, редко; 3 — единично.