



# Многообразие одноклеточных организмов





# Подцарство Простейшие

## Общая характеристика

Одноклеточные организмы – это организмы, тело которых состоит из одной клетки, но эта клетка - целостный организм, ведущий самостоятельное существование и которому присущи все проявления жизни.

Общее число видов простейших превышает 30 000. Среда обитания: моря, пресные водоемы, сырая почва, жидкая среда других организмов. Широкое распространение среди всех классов простейших получил паразитизм.

Способ питания - гетеротрофные организмы (исключение эвглена зеленая). Дышат всей поверхностью тела. Размножение осуществляется бесполом или половым путем.




# Особенности строения

- Тело состоит из одной ядерной клетки
- Микроскопические размеры (от 3 до 150 мк)
- Клетка покрыта оболочкой
- Кроме органоидов общего назначения, есть органоиды движения (жгутики, реснички)
- Есть сократительные вакуоли
- Одноклеточные с постоянной формой тела обладают пищеварительными органоидами: клеточной воронкой, ртом, глоткой, а также органоидом выделения – порошицей.
- При неблагоприятных условиях образуется циста
- Форма тела разнообразна



# Строение инфузории - туфельки



- 1 – рот
- 2- глотка
- 3 – пищеварительная вакуоль
- 4 – ротовая
- 5 – макронуклеус
- 6 – микронуклеус
- 7,8 – сократительные вакуоли
- 9 – реснички
- 10 – пищеварительная вакуоль



# Классификация простейших

Подцарство  
Одноклеточные

ТИП  
Сарко -  
жгутиконосцы

классы:  
Саркодовые  
Жгутиковые



ТИП  
Споровики

ТИП  
Инфузории



# Тип Саркожгутиконосцы

- К саркожгутиконосцам принадлежат наиболее древние простейшие
- У них нет постоянной формы тела
- Отсутствуют органоиды специального назначения
- Есть свободноживущие и паразитические формы
- Тип саркожгутиконосцев представлен двумя классами: саркодовыми и жгутиковыми





# Класс Саркодовые

- Характерный признак корненожек – способность не покрытого плотной оболочкой тела образовывать цитоплазматические выросты – ложноножки, благодаря которым они передвигаются. Ложноножки служат также органами захвата пищи. Переваривание пищи происходит в пищеварительных вакуолях.
- Избытки воды и солей удаляются через сократительную вакуоль.



амёба-протей, дизентерийная амёба, эвглифа, арцелла, панцирная амёба диффлюгия



# Класс Жгутиковые



Лямблия


Все жгутиковые имеют не менее одного жгутика (некоторые – тысячи). Одни из них – свободноживущие формы, заглатывающие твёрдую пищу, другие – паразиты, питающиеся жидкими органическими веществами, например, кровью.



# Тип Споровики



- Этот тип включает только паразитические формы
- Под влиянием паразитизма строение споровиков сильно упростилось: они не имеют органоидов движения, пищеварительных и сократительных вакуолей






# Тип Инфузории или Ресничные



Инфузории




Колония инфузорий кархезиум

- Органоиды движения – реснички
- В цитоплазме находятся 2 ядра.
- Пищеварительные органоиды: клеточная воронка, глотка, рот, порошица
- Выделительные органоиды – сократительные вакуоли



- Инфузории произошли от примитивных жгутиконосцев; их 6000–8000 видов.
- Они обитают и в пресной, и в морской воде (как в толще воды, так и возле дна), в почве и влажных мхах; некоторые являются паразитами.



парамеция, блефаризма, эвплотес, подофрия, инфузория-трубач



# Значение простейших

- Возбудители заболеваний человека (малярийный плазмодий вызывает малярию, а дизентерийная амеба – дизентерию).

Полезьа от этих созданий несоизмеримо больше, чем вред от них:

- Поедая бактерий и гниющие останки, они выполняют важную санитарную функцию, очищая водоемы и почву
- Звено в цепи питания
- Служат индикаторами чистоты воды.
- Участвуют в образовании залежей известняков.
- Оказывают влияние на почвообразовательные процессы.

