



Мочевыделительная система



Автор: Морозова И.О.





Процессы выделения закljučаются в удалении из организма

Выделительные процессы являются неотъемлемой частью обмена веществ.

Обмене веществ


Выделительные процессы направлены на поддержание постоянства внутренней

среды

организма




Органы выделения



Мочевыделительная система



**Парные
почки**



Мочевыводящие пути

мочеточники

Мочевой пузырь

Мочеиспускательный канал



ПОЧКИ

Парные органы,
лежащие в
брюшной полости
по двум сторонам
позвоночника на
уровне поясницы.





**Имеет форму боба, ее
вогнутый край
обращен к
позвоночнику. Этот
вогнутый край служит
местом вхождения
сосудов и нервов.
Отсюда же берет
начало и мочеточник.**

ПОЧК





Значение

почек

- поддержание водно-солевого обмена (удаление избытка воды и минеральных солей)
- поддержание кислотно-щелочного равновесия
- биологический фильтр
- синтез БАВ



Строение

Корковый слой

Мозговой слой
(почечные пирамиды)

Почечная лоханка

Почечная артерия

Почечная вена




**В обеих почках около 2 млн. нефронов.
Длина почечных канальцев 120 км.
Фильтрующая поверхность обеих
почек 5-6 м².**

**Структурно-
функциональной
единицей почки является
нефрон**



**Нефроны расположены в
корковом веществе**

**В нефронах происходит
образование мочи**



**В нефронах происходит очищение крови от
растворенных в ней вредных веществ**

Строение




Каждый нефрон
начинается
микроскопической
капсулой, от которой
отходит длинный
каналец нефрона




Стенки почечной капсулы образованы двумя слоями эпителиальных клеток.

Между этими слоями находится щелевидное пространство; от которого почечный каналец. Внутри почечной капсулы в своеобразном бокале лежит капиллярный клубочек. Он образован разветвлением капилляров почечной артерии.



Капсулы и часть канальцев нефрона находятся корковом слое

Остальные части канальцев и выводные трубки – в почечных пирамидах мозгового слоя



Кровь поступает в капиллярный клубочек по приносящим, а вытекает по выносящим артериям. По выходе из капиллярного клубочка выносящая артерия распадается на капилляры, оплетающие почечный каналец. Значит, кровь, прошедшая через капиллярный клубочек, затем проходит через капилляры почечного канальца и лишь после этого поступает в вены.



Механизм образования

мочи

Моча образуется из плазмы крови. Однако состав мочи существенно отличается от состава плазмы крови.


Значит, почки перерабатывают мочу, изменяя протекавшую через них кровь. Этот процесс происходит в два этапа: сначала образуется первичная моча, а затем вторичная, или конечная моча. Мочеобразование происходит с помощью ряда физиологических механизмов.




Образование

1 фаза — образование первичной мочи (фильтрация в клубочке)

- фильтрация благодаря разнице давлений, т. к. приносящий сосуд имеет диаметр больше, чем уносящий
- в сутки через почки проходит 1500-1700 л. крови, образуется 150-170 л. первичной мочи





2 фаза - образование вторичной мочи

- в сутки выделяется 1-1,5 л. вторичной мочи

I моча

→

Почечные каналы

Обратное всасывание
(вода, мин. в-ва,
витамины, глюкоза, АК)




**Капилляры,
оплетающие
каналы**

II моча
(вода,
мочевая к-та,
мочевина,
мин. в-ва)

**Мочевой
пузырь
(V=200-300
см³)**

**Почечная
лоханка**

**Собирающая
трубочка**





**За 1 минуту через почки проходит 1/5
всей крови.**

**Работа почек регулируется нервно-
гуморальным путем.**

**Камни в почках выпадают при рН =
5,5-6,0, => щелочные минеральные
воды препятствуют
камнеобразованию.**



В сутки через почки проходит 1500 – 1700 л крови

Образуется 150-170 л первичной мочи

В сутки выделяется 1,5 – 2 л вторичной мочи



Значение почек

**Поддержка водно-солевого обмена
(удаление избытка воды и минеральных солей)**

Биологический фильтр (выведение ненужных и вредных веществ)



Предупреждение почечных заболеваний:

- все вредные вещества, имеющиеся в крови, действуют на нефроны, нарушая их работу (алкоголь, уксус, перец, горчица, ртуть, антибиотики, борная кислота, бензол)
микроорганизмы из кариозных зубов, миндалин
- инфекции:
- нисходящие (ангина, кариес)
- восходящие (через мочеиспускательный канал) - охлаждение