

ТИП МОЛЛЮСКИ (MOLLUSCA)

Около 113-115 тыс. видов

Систематика типа:

- 7 классов:
- Полиплакофоры, Аплакофоры, Моноплакофоры, Лопатоногие
- БРЮХОНОГИЕ (**GASTROPODA**) Более 90 тыс. видов
- ДВУСТВОРЧАТЫЕ (**BIVALVIA**) Более 20 тыс. видов
- ГОЛОВОНОГИЕ (**CERHALOPODA**) Около 650 видов

Среда обитания и образ жизни:

- Подавляющее большинство – свободноживущие:
Морские, пресноводные, сухопутные
- Небольшое число паразитических видов

По способу питания:

- Растительноядные
- Хищники
- Фильтраторы
- Детритофаги
- Частичные
автотрофы!!!!!!




Pteraeolidia ianthina

Особенности строения:

1.


Тело состоит из трех отделов:

- Голова (ротовое отверстие, органы чувств)
- Туловище (внутренние органы)
- Нога (мускульный орган передвижения)



ДЧ / 95

- Тело покрыто **мантией** – кожная складка на спинной стороне
- 2.
- Между мантией и стенкой тела – **мантийная полость** (мантийный комплекс органов)



- У многих раковина (откладывается снаружи от мантии ее клетками).

3.

- Раковина многослойная.
- Форма разнообразна:
Несколько пластинок, щитов
Колпачок
Сpirали
Две створки
Конусовидная трубка



- Пищеварительная система – три отдела (передний, средний, задний)


Своеобразие:

- В глотке хитиновые образования:

Терка (радула)

Челюсти, иглы, клювы

- Развитие слюнных желез
- Расширение среднего кишечника – **желудок**, открываются протоки – **«печени»**




Органы дыхания связаны с мантийной полостью

5.

- Для водных: различные по форме жабы (перистые или пластинчатые)
- Для наземных или **вторичноводных** : «легкое» - видоизменение мантийной полости
- Для многих важно кожное дыхание


6.




Эш / 95

- Органы выделения – «почки», видоизменения целомодуктов (связаны с околосердечной – перекардиальной полостью). Выделительное отверстие в мантийной полости

- 7.
- Кровеносная система обычно незамкнутая – кровь течет по сосудам и по полостям между органами.
 - Имеется сердце из нескольких камер – предсердие и желудочек




- Варианты предсердие и желудочек: 4x2, 2x2, 2x1, 1x1



8.

Нервная система: нервные ганглии и нервные стволы



- Примитивные виды – нервная система лестничного типа (см. Кольчатых червей)
- Большинство – нервная система разбросано-узлового типа: несколько парных ганглиев соединенных перемычками.
- Некоторые (головоногие) - «головной мозг»



9ш/97


Органы чувств:

- Зрение – глаза. У некоторых глаза устроены сложно – на подобии млекопитающих (головоногие)
- Химических чувств – осфрадии
- Осязания – сенсорные клетки



Половая система:

- Большинство раздельнополые
- Некоторые Брюхоногие гермафродиты
- Половое отверстие в мантийной (или отсут




- 10.
- Половое размножение
 - Оплодотворение перекрестное (даже при гермафродизме)
 - Оплодотворение наружное или внутреннее



Развитие:

Развитие обычно непрямое (с метаморфозом). Личинки:

- Низшие – трохофора (как у кольчатых)
- Высшие – видоизмененная трохофора – велигер (парусник)
- У наземных видов (Брюхоногие) и Головоногих – прямое развитие




КЛАСС БРЮХОНОГИЕ (GASTROPODA)

- Морские, пресноводные. Единственные представители сухопутных моллюсков
- Размеры раковины некоторых до 30-60 см.



Особенности строения:

- Голова хорошо выражена (1-2 пары щупалец и глаза)
- Раковина цельная (в виде колпачка, спирали).
- В глотке - радула, челюсти и т.д.
- Органы дыхания: Водные – 1-2 ктенидия (жабры);
Наземные – «легкое»
- Нервная система – развиты все 5 пар узлов (иногда перекручивание нервных стволов)
- Встречаются гермафродитные формы. Обычно сложное строение половой системы
- Развитие с личиночной стадией (велигер), или прямое – у наземных и пресноводных



Land snail anatomy. A. General anatomy; B. Urogenital system. (Illustration by Patricia Ferrer)


● Некоторые брюхоногие
лишены раковины
(представители
отрядов Голожаберные
и Крылоногие)



1. *Glossodoris atromarginata*; 2. *Pupa solidula*; 3. *Aeolidiella sanguinea*; 4. *Tylodina corticalis*; 5. *Corolla spectabilis*; 6. *Elysia viridis*. (Illustration by Joseph E. Trumper)


КЛАСС ДВУСТВОРЧАТЫЕ (BIVALVIA) Более 20 тыс. видов

- Исключительно водные, малоподвижные. Питаются путем фильтрации воды
- Размеры до 1,5 м и массы до 200 кг.




Особенности строения:


- Голова редуцирована (иногда редуцирована и нога)
- Раковина из 2-х створок, соединенных подвижно связкой – лигаментом (на спинной стороне тела). Створки охватывают тело с боков. Животное лежит на одной из створок




9ш/99




- Органы дыхания – пластиначатые жабры, дополнительная функция – фильтры
- Нервная система упрощена – меньшее число ганглиев
- Исключительно раздельнополые. Оплодотворение наружное
- Развитие с метаморфозом – велигер. У некоторых специальная личинка – глохидий (функция расселения)



Цикл развития двустворчатьих со стадией гпохилия



● Некоторые уклонившиеся виды двустворчатых: Камнеточцы и Древоточцы (Корабельный червь)




1. Zebra mussel (*Dreissena polymorpha*); 2. Shipworm (*Teredo navalis*); 3. Giant vent clam (*Calyptogena magnifica*); 4. Giant clam (*Tridacna gigas*); 5. Northern quahog (*Mercenaria mercenaria*); 6. Watering pot shell (*Brechites vaginiferus*); 7. Coquina clam (*Donax variabilis*); 8. Coquina clam color morph 1; 9. Coquina clam color morph 2. (Illustration by Barbara Duperron)



1. Eastern American oyster (*Crassostrea virginica*); 2. Queen scallop (*Chlamys opercularis*); 3. No-leaf clam (*Scapharca subcrenata*); 4. Common blue mussel (*Mitifus adansonii*); 5. European peacock mussel (*Margaritifera margaritifera*); 6. No-leaf pearl oyster (*Pinctada imbricata*); 7. F. P. *megabidentata* internal view; 8. P. *megabidentata* internal view. (Illustration by Barbara Duperron)

КЛАСС ГОЛОВОНОГИЕ (СЕРНАЛОРОДА)


- Наиболее высокоорганизованная группа моллюсков
- Исключительно морские
- Активные хищники
- Размеры (глубоководные кальмары) до 10-18 м.





1. *Mastigoteuthis magna*; 2. Common cuttlefish (*Sepia officinalis*); 3. Longfin inshore squid (*Loligo pealeii*); 4. Ram's horn squid (*Spirula spirula*); 5. Vampire squid (*Vampyroteuthis infernalis*); 6. Butterfly bobtail squid (*Stoleteuthis leucophtera*); 7. Pearly nautilus (*Nautilus pompilius*); 8. *Stauroteuthis syrtensis*; 9. Greater argonaut (*Argonauta argo*); 10. Common octopus (*Octopus cf. vulgaris*). (Illustration by Barbara Duperron)

Особенности строения:



- Нога видоизменена в щупальца и воронку (орган реактивного движения)
- Раковина у большинства видов полностью или частично редуцирована (сохраняется в виде пластинок внутри тела) Исключение Наутилус и Аргонавт (самка)
- Многие головоногие способны менять окраску



- В глотке имеется хитиновый «клюв», часто есть ядовитые железы
- Скопление нервного вещества – «головной мозг». Мозг защищен хрящевой капсулой
- Сложные органы чувств, особенно глаза. Имеются органы обоняния. Вкусовые рецепторы во рту и на щупальцах
- Кровеносная система – замкнутая



- Исключительно раздельнополые
- Размножение половое, оплодотворение наружное (но через спематофор). У некоторых видов самцы имеют половое щупальце – гектокотиль
- Развитие прямое





www.cephbase.utmb.edu

CephBase



www.cephbase.utmb.edu

