



Работу выполнила:
ученица 7 класса ФМЛ
Афанасьева Анастасия

План работы

- **Происхождение Кишечнополостных**
- **Основные классы Кишечнополостных:**
 - Класс Гидроидные**
 - Класс Коралловые полипы**
 - Класс Сцифоидные медузы**
- **Значение Кишечнополостных**
- **Интересные факты**

Происхождение Кишечнополостных

- Все классы Кишечнополостных известны с докембрия (более 600 млн. лет).
- Кишечнополостных считают древней группой, близкой к предкам всех многоклеточных животных.

Происхождение Кишечнополостных

- Исходной формой, вероятно, следует считать гидроидных полипов.
- В дальнейшем эволюция пошла по пути утраты полипоидной стадии (у сцифомедуз) или медузоидной стадии (у кораллов).




Происхождение Кишечнополостных

- По преобладанию остатков медуз конец протерозоя называют "веком медуз" (около 700 миллионов лет назад). С тех пор медуза – это один из самых многочисленных хищников на Земле.



Класс Гидроидные

- 2800 видов
- Место обитания:
 - медленно текущие пресные водоемы
 - придонная часть морей



ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ

ПОЛИПНАЯ
(ПОЛИПНАЯ ОСНОВНАЯ)



МЕДУЗНАЯ
(КРАТКОВРЕМЕННАЯ)



ОБРАЗ ЖИЗНИ

сидячий

плавающий

Представители:

- Пресноводные гидры :
обыкновенная стебельчатая,
бурая, зеленая
- Морские гидроидные полипы:
- Гидроидные медузы
- Смешанные гидроиды
(сифонофоры)

ПРЕСНОВОДНЫЕ ГИДРЫ




Встречаются в озерах, речках или прудах с чистой, прозрачной водой, на корнях ряски, стеблях и листьях других водных растений прудов и рек

МОРСКИЕ ГИДРОИДНЫЕ ПОЛИПЫ



- Многие гидроиды похожи на ажурные веточки.

ГИДРОИДНЫЕ МЕДУЗЫ



Гидроидная медуза *Bougainvillia*
(увеличенено в 3 раза).

Гидроидные
медузы
размножаются
половым путем,
выделяя в воду
половые клетки.

СМЕШАННЫЕ ГИДРОИДНЫЕ ПОЛИПЫ (СИФОНОФОРЫ)



- Самыми красивыми представителями сифонофор, бесспорно, являются физалии. Тело физалии состоит из большого пузыря, который достигает иногда величины детской головы, и плавательного столба.

«Португальский военный кораблик»

Класс Коралловые полипы

- **6000 видов**
- **Место обитания:** дно морей (от прибрежной части до больших глубин)
- **Представители:** актинии, кораллы одиночные (красный, розовый, черный) и колониальные мадрипоровые кораллы

■ Распространены
в морях от
Арктики до
Антарктики.





Несколько видов актиний строят домики из слизи и песка. Их называют «трубчатые анемоны». Как и остальные актинии, они питаются мелкими животными, коснувшимися их липких и жалящих щупалец



Кораллы

Ювелирные кораллы



В мире насчитывается
около 200 видов

■ Ювелирные кораллы, хотя и имеют очень плотный скелет, не участвуют в образовании рифов. Ювелирные черные кораллы встречаются небольшими группами в тропических морях на глубине 30-80 м. Их колонии похожи на кусты или на куски проволоки.

Ювелирные кораллы



- У красного благородного коралла скелет содержит окись железа, которая придает ему разные оттенки красного цвета. Колонии благородных кораллов обитают на береговых склонах Средиземного моря и у Канарских островов на глубине больше 20 м (обычно - от 50 до 150 м).

Класс Сцифоидные медузы

- **200 видов**
- **Место обитания:** моря
- **Представители:**
медузы:
 - ушастая медуза аурелия
 - Ропилема
 - полярная медуза цианея

- Это жизненная форма некоторых кишечнополостных животных, в жизненном цикле некоторых видов чередуется с полипом.
- Ведет активно плавающий образ жизни (передвижение по реактивному принципу).

МЕДУЗА



МЕДУЗА

- Она всегда лишена скелета, имеет развитую мезоглею, органы равновесия и светочувствительные органы, позволяющие ориентироваться в пространстве.



Значение кишечнополостных

- Могут быть ядовитыми
- Образуют коралловые рифы
- Образуют симбиозы с другими видами животных
- Используются для изготовления ювелирных изделий
- Могут снижать численность рыб
- Служат пищей другим видам рыб



**Одно из эффективных
средств защиты – женские
колготы, которые однажды
использовали спасатели на
соревнованиях по серфингу в
Квинсленде, Австралия.**

Ядовитые животные
Самая ядовитая медуза
в мире – австралийская
морская оса (*Chironex
fleckeri*). После
прикосновения к ее
щупальцам человек
умирает через 1-3 мин,
если не подоспеет
медицинская помощь.
Яд парализует
сердечную мышцу.

Ядовитые животные



Последствия крайне серьёзны: от паралича до смерти, кровоизлияния в мозг или остановки сердца

- Медуза-убийца ***Carukia barnesi***, обладающая смертоносным жалом, имеет длину купола всего-навсего 12 миллиметров. В течение часа жертвы испытывают сильную боль в пояснице, прострелы по всему тела, судороги, тошноту, рвоту, обильно потеют и кашляют.

Уже через 15—20 минут после стрекания появляется ощущение удушья (особенно затруднен выдох), боли в пояснице, в суставах конечностей. Немеют пальцы, появляется одышка, стеснение в груди. Острый период длится 4—5 суток, а затем явления идут на убыль и исчезают без каких-либо последствий.

Ядовитые животные



Контакт с небольшой дальневосточной медузой-крестовиком (*Gonionemus vertens*) может стоить купальщику жизни.

Ядовитые животные



Ложные огненные кораллы (*Millepora*) (гидроидный полип), которые могут серьезно травмировать кожу при прикосновении. Нередко после ожогов на коже образуются долго незаживающие язвы.

Ядовитые животные



- Яд физалий подобен яду кобры, стоек к высушиванию и замораживанию, выброшенные на берег сифонофоры сохраняют способность ужалить любого, кто к ним прикоснется, а щупальца, пролежавшие в течение шести лет в холодильнике, прекрасно сохранили свои токсические свойства. Для человека яд сифонофоры крайне опасен.

- Определенные группы коралловых полипов, например мадрепоровые, роговые кораллы и морские перья, обитают главным образом в тропиках и субтропиках, где они образуют целые подводные сады, поражающие красотой форм и расцветок, и коралловые рифы.

Коралловые рифы




Симбиозы




- Это **сцифомедуза**, которая по-латыни называется «*Cassiopeia*», по имени эфиопской царицы из греческих мифов, но на ивrite и английском ее так и называют - «цветная капуста». В нормальном состоянии кассиопея лежит в песке, ну, если не «вниз головой», то во всяком случае «вверх ногами», и ловит короткими толстыми щупальцами планктон. Эта медуза научилась выращивать в своем теле **симбиотические водоросли**.

Симбиозы



- Симбиоз актинии и рыбы-клоуна

Ювелирные изделия из коралла



Ювелирные изделия из коралла



Медузы - пожиратели рыб

- Обследуя косяки сельди, нерестящейся у побережья Британской Колумбии, биологи установили, что за один день хрустальные медузы сожрали весь селедочный приплод. Кроме того медузы вредят рыбам и тем, что пожирают их пищу




Медуза - корм для животных

- Среди главных врагов медуз – тунец, морские черепахи, океанская луна-рыба и некоторые океанские птицы. Медузами не брезгует и семга.



Интересные факты



- Медуза колобонема *Colobonema sericeum* отбрасывает щупальца, а их у нее 32.

Интересные факты

Крупнейшей медузой в мире считается **арктическая гигантская медуза (Cyanea)**, обитающая в Северо-Западной Атлантике. Одна из таких медуз, выброшенная на берег в Массачусетском заливе, имела диаметр колокола 2,28 м, а ее щупальца простирались на 36,5 м. Каждая такая медуза в течение жизни съедает около 15 тыс. рыбок



Интересные факты

■ Медузы-экстремалы

Озеро Могильное на острове Кильдин вблизи Кольского залива – уникально: морская вода просачивается в него. Морская и пресная вода не смешиваются по причине различной плотности. От поверхности до глубины 5-6 м лежит слой пресной воды, а ниже, до 12 м, лежит слой морской воды, в которой живут медузы, треска, морские раки. Еще глубже расположен зараженный сероводородом слой воды, в котором отсутствуют животные.

Интересные факты

- Начиная с сентября, у берегов города Этидзэн (префектура Фукуи) наблюдают тысячи гигантских медуз размером более метра и весом около 100 килограммов. Они могут достигать в длину до 5 метров, имеют ядовитые щупальцы, однако не смертельны для людей. Их миграция в Японское море связана с увеличением температуры воды.



Интересные факты

- В результате достижений генной инженерии появилась возможность в геном растения картофеля вставить ген... медузы! Благодаря этому гену тело медузы удерживает пресную воду, а при недостатке воды в почве воду будет удерживать и картофель с этим геном. Кроме того, благодаря этому гену медуза светится. И это свойство сохраняется в картофеле: при недостатке воды его листья светятся зеленым светом в инфракрасных лучах.

Спасибо
за ваше внимание.