

Особенности:
много клеток, мало
межклеточного вещества
(волокон и аморфного
вещества)

Локализация:
образует строму многих
органов, адвентициальная
оболочка сосудов,
располагается под
эпителиями - образует
собственную пластинку
слизистых оболочек,
подслизистую основу,
располагается между
мышечными клетками и
волокнами

КЛЕТКИ


Рыхлая соединительная ткань

Рыхлая волокнистая неоформленная
соед. тк

белые жировые клетки (белые адипоциты)
в их цитоплазме имеется одна большая капля жира, а ядро и органоиды оттеснены к периферии между группами адипоцитов имеются прослойки рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани


**Пуповина
человека(окр.г
ематоксилин-
ЭОЗИНОМ**

Соедин.ткань со спец.
св-вами слизистая

A circular microscopic view of liver tissue stained with hematoxylin-eosin. The tissue has a reddish-pink hue. Several large, pale, foamy cells (macrophages) are visible, scattered throughout the field. The background consists of a dense network of smaller, darker-stained cells and structures.

они находятся везде в соединительной ткани, особенно много их там, где богато развита кровеносная и лимфатическая сеть сосудов. Форма макрофагов может быть овальной, округлой, вытянутой, размеры — до 20-25 мкм в диаметре. На поверхности макрофагов имеются псевдоподии. Поверхность макрофагов резко очерчена, на их цитолемме имеются рецепторы к антигенам, иммуноглобулинам, лимфоцитам и другим структурам. Форма макрофагов имеет овальную, круглую или вытянутую форму, содержат грубые глыбки хроматина. Встречаются многоядерные макрофаги (гигантские клетки инородных тел, остеокласты). Цитоплазма макрофагов слабо базофильна, содержит много лизосом, фагосом, вакуолей. Органеллы общего значения развиты умеренно.

**Макрофаги
печени
крысы(окр.гем
атоксилин-
эозином)**




Эластич.хрящ ушной раковины свиньи

Имеет беловато-желтоватую окраску, располагается в ушной раковине, стенке наружного слухового прохода, черпаловидном и рожковидном хрящах гортани, надгортаннике, в бронхах среднего калибра. От гиалинового хряща отличается тем, что эластический хрящ, во-первых, эластичный, так как в нем, кроме коллагеновых, содержатся эластические волокна, идущие в различных направлениях и вплетающиеся в надхрящницу и окрашивающиеся орсеином в коричневый цвет; во-вторых, меньше содержит хондроитинсерной кислоты, липидов и гликогена; в-третьих, никогда не подвергается обызвествлению. В то же время общий план строения эластической хрящевой ткани сходен с гиалиновым хрящом.


Плотная оформленная соединительная ткань представлена сухожилиями, связками, апоневрозами мышц, капсулами суставов, оболочками некоторых органов, белочными оболочками глаза, мужской и женской половых желез, твердой мозговой оболочкой, надкостницами и надхрящницами.

Сухожилие (*tendo*) состоит из параллельно расположенных волокон, образующих пучки I, II и III порядков. Пучки I порядка отделены друг от друга сухожильными клетками, или фиброцитами, несколько пучков I порядка складываются в пучки II порядка, которые отделены друг от друга прослойкой рыхлой соединительной ткани, называемой эндотением (*endotendium*); несколько пучков II порядка складываются в пучки III порядка. Пучком III порядка может быть само сухожилие. Пучки III порядка окружены прослойкой рыхлой соединительной ткани, называемой перитением (*peritendium*). В прослойках рыхлой соединительной ткани эндотения и перитения проходят кровеносные и лимфатические сосуды и нервные волокна, заканчивающиеся в нервно-сухожильных веретенах, т. е. чувствительных нервных окончаниях сухожилий.

Сухожилие свиньи



Эластичный хрящ. Надгортанник собаки




**Сальник
крысы.
Коллоидны
й уголь в
макрофага
х(окр.гемат
оксилин-
эозином)**




**Сухожилие
свиньи(окраск
а
гематоксилин-
эозином)**

Гиалиновый хрящ. Ребро щенка



Гиалиновый хрящ на концах ребер покрыт надхрящницей, под которой располагается зона молодого хряща. Здесь находятся молодые хондроциты веретеновидной формы, расположенные в хрящевых лакунах и способные вырабатывать только фибриллярные белки. Поэтому межклеточное вещество вокруг них окрашено оксифильно. Глубже хондроциты округляются. Еще глубже образуются изогенные группы хондроцитов, способные вырабатывать белки и хондроитинсерную кислоту, окрашивающуюся базофильно. Поэтому межклеточное вещество вокруг них окрашивается основными красителями. Еще глубже находятся изогенные группы, содержащие еще более зрелые хондроциты, секретирующие только белки. Поэтому основное вещество вокруг них окра




Развитие кости из мезенхимы
Прямым способом

Попер-полос. Мышечн.тк языка кролика



. Состоит из 2 компонентов: 1) миосателлитоцитов и 2) миосимпласта. Мышечное волокно имеет примерно такую же длину, как и сама мышца, диаметр — 20-50 мкм. Снаружи волокно покрыто оболочкой — сарколеммой, состоящей из 2 мембран. Наружная мембрана называется базальной мембраной, а внутренняя — плазмолеммой. Между этими двумя мембранами


**П.п.мышечная
ткань языка
кролика.
Окраска
гематоксилин-
эозином**



Кровь (sanguis) относится к тканям внутренней среды. Поэтому, как и все ткани внутренней среды, она состоит из клеток и межклеточного вещества. Межклеточным веществом является плазма крови, к клеточным элементам относятся эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.


Мазок крови человека. Окраска по Романовскому

A circular microscopic field of view showing a blood smear. The background is a light, granular brownish-yellow color, representing the plasma. Numerous small, dark-stained cells are visible, including several large, dark-stained cells with prominent nuclei, likely leukocytes, and many smaller, dark-stained cells, likely erythrocytes. The overall appearance is that of a typical Romanovsky-stained blood smear.




Сердце

Кардиомиоциты имеют цилиндрическую форму, их длина 50-120 и диаметр 10-20 мкм. Кардиомиоциты своими концами соединяются друг с другом, образуя функциональные сердечные мышечные волокна. Места соединения кардиомиоцитов называются *вставочными дисками* (discus intercalatus). В дисках имеются интердигитации десмосомы, места прикрепления актиновых филаментов и нексусы. Через последние происходит обмен веществ между кардиомиоцитами. Снаружи кардиомиоциты покрыты сарколеммой, состоящей из наружной (базальной) мембраны и плазмолеммы. От боковых поверхностей кардиомиоцитов отходят отростки, вплетающиеся в боковые поверхности кардиомиоцитов соседнего волокна. Это мышечные анастомозы.



**Гиалиновый
хрящ. Ребро
щенка.
Окраска
гематоксилин
эозином**



Поперечнополосатая
скелетная мускулатура
языка

**Эластический
хрящ ушной
раковины
свиньи.
Окраска
гематоксилин-
эозином**






Развитие кости
из мезенхимы

The image shows a circular field of view, likely from a microscope, displaying various layers of developing tissue. The colors range from light yellow to dark brown. A white pointer line originates from the text 'Костные балки' and points to a specific layer of tissue within the circular field.


Костные балки

Развитие. Скелетная мышечная ткань человека развивается из миотомов мезодермальных сомитов, поэтому называется *соматической*. Клетки миотомов дифференцируются в 2 направлениях: 1) из одних образуются миосателлитоциты; 2) из других образуются миосимпласты.

Красный костный мозг




Диафиз



Диафиз трубчатой кости снаружи покрыт надкостницей, а со стороны костномозговой полости — эндостом. Между надкостницей и эндостом располагается компактное костное вещество диафиза, состоящее из 3 слоев:


- 1) слой наружных общих костных пластинок;
- 2) слой остеонов и вставочных пластинок;
- 3) слой внутренних общих костных пластинок.

Мочевой пузырь кошки






**Рыхлая
волокнистая
неоформленна
я
соединительна
я
ткань(окр.жел
езный
гематоксилин)**




Развитие
костной ткани
из мезенхимы

The image shows a circular field of view containing a histological section of developing bone tissue. The tissue is stained, showing various cellular and structural components. There are large, pale, rounded areas that likely represent cartilage or early bone matrix, and darker, more densely stained regions that indicate areas of active cell division and differentiation. The overall appearance is that of a developing embryonic or fetal bone structure.



Сухожилия




**Макрофаги
селезенки
крысы (окр
гематоксил
и
эозином)**




**Эластический
хрящ.
Надгортанник
собаки. Окраск
а
гематоксилин-
эозином**

Развитие зуба прямой остеогенез




. *Прямой остеогенез* характеризуется тем, что костное вещество развивается непосредственно из мезенхимы. Таким путем развиваются плоские кости. *Непрямой остеогенез* характеризуется тем, что вначале образуется хрящевая модель будущей кости, состоящая из гиалинового хряща, потом на месте этой модели формируется трубчатая кость.



Макрофаги селезенки крысы



Пуповина человека



Макрофаги печени крысы

Попер.полосат мыш.тк языка кролика

