

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

МЕЖДУ ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ И
КЛЕТКАМИ ОРГАНИЗМА

БАЛАНС ВЕЩЕСТВ – СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРИХОДА И РАСХОДА В-В В ОРГАНИЗМЕ

ОБЩАЯ ФОРМУЛА БАЛАНСА В-В:

$$\text{ПРИХОД} = \text{РАСХОД} + \text{НАКОПЛЕНИЕ}$$

ФУНКЦИИ ПИТАТЕЛЬНЫХ В-В:


- пластическая (синтез новых БЖУ)
- энергетическая (окисление и выделение энергии)

ПРИХОД В-В В ОРГАНИЗМ

- Питательные в-ва (**белки, углеводы, жиры**) в составе пищи поступают в ЖКТ
- В ЖКТ происходит гидролиз БЖУ до мономеров:
 - Б – до аминокислот
 - Ж – до жирных кислот и глицерола
 - У – до моносахаров (**глюкоза и др.**)
- Из ЖКТ мономеры всасываются в кровь (**т.е. поступают во внутреннюю среду организма**) и используются клетками
- Неусвоенные БЖУ выделяются из ЖКТ в составе кала

ПРИХОД В-В В ОРГАНИЗМ (ассимиляция)


ПРИХОД = БЖУ (пищи) – БЖУ (кала)



РАСХОД В-В В ОРГАНИЗМЕ -

ЭТО КОЛИЧЕСТВО ПИТАТЕЛЬНЫХ В-В, КОТОРЫЕ
ОКИСЛЯЮТСЯ В КЛЕТКАХ ОРГАНИЗМА ЗА СУТКИ.

РАСХОД В-В В ОРГАНИЗМЕ (диссимиляция, катаболизм)



НАКОПЛЕНИЕ (депонирование)

- УГЛЕВОДЫ – гликоген в печени и мышечных волокнах (**400** г)
- ЖИРЫ – жировая ткань и другие клетки организма (до **50%** от массы тела, иногда больше)
- БЕЛКИ – не накапливаются
ДЕПО БЕЛКОВ В ОРГАНИЗМЕ НЕТ

ЗНАЧЕНИЕ БЕЛКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗМА

- Рост и самообновление структур
- Синтез ферментов,
гормонов,
иммуноглобулинов,
гемоглобина,
белков плазмы крови,
факторов свёртывающей системы и др.
- Участие в глюконеогенезе

ОБМЕН БЕЛКОВ

- Только белки содержат азот (в составе аминокислот).
- 1 г азота содержится в **6,25** г белка.
- Обмен белков оценивается по азотистому балансу.

АЗОТИСТЫЙ БАЛАНС

- Азотистое равновесие:

приход = расход

$$\mathbf{N \text{ (пищи)} - N \text{ (кала)} = N \text{ (мочи)}}$$

- Отрицательный баланс:

приход < расход

- Положительный баланс:

приход > расход

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ АЗОТИСТЫЙ БАЛАНС

- 1. ДЕТИ (рост организма)**
- 2. БЕРЕМЕННЫЕ (рост организма)**
- 3. ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИЕ (восстановление массы тела)**
- 4. СПОРТСМЕНЫ (но только в период наращивания мышечной массы – например, «боди-билдинг»)**

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ АЗОТИСТЫЙ БАЛАНС
– при голодаании

КОЭФФИЦИЕНТ ИЗНАШИВАНИЯ

- Расход белка за сутки при безбелковой диете достаточной калорийности (за счёт Ж и У):

Приход белка = **0**

Расход белка = **20-30** г

(расходуются собственные белки организма)

СПЕЦИФИЧЕСКИ-ДИНАМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ В-В (СДД)

- Увеличение расхода веществ и энергии, связанное с усвоением питательных в-в.
- При смешанном питании обмен увеличивается на **5-15%**
- Белковая пища увеличивает обмен на **30%.**
- СДД начинается через **1** час, достигает максимума через **3-4** часа и продолжается **12-18** часов после приёма пищи.

БЕЛКОВЫЙ МИНИМУМ

- Минимальное количество белка, при поступлении которого в организме возможно азотистое равновесие.
- Приход = **50** г ; расход = **50** г
- Азотистое равновесие при этом неустойчивое: оно сохраняется в условиях покоя, а в состоянии напряжения (нагрузки, стресс) быстро переходит в отрицательный азотистый баланс.

БЕЛКОВЫЙ ОПТИМУМ

- Количество белка, которое при поступлении в организм, обеспечивает устойчивое азотистое равновесие, а также:
 - хорошее самочувствие,
 - высокую работоспособность,
 - надёжную защиту от действия стрессорных факторов.
- Приход = **100** г; расход = **100** г.
- Превышать белковый оптимум не рекомендуется.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- ПРИХОД В-В В ОРГАНИЗМ:
 - исследование состава пищи химическими методами
 - определение коэффициента усвоения питательных в-в
 - использование таблиц (**- 10%**)
- РАСХОД В-В В ОРГАНИЗМЕ:
 - по конечным продуктам метаболизма и данным газообмена

методом Шатерникова (**«Физиология человека» под ред. В.М.Смирнова, 2001, стр. 399**)

РЕГУЛЯЦИЯ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА

- АНАБОЛИЧЕСКИЕ ГОРМОНЫ:
 - гормон роста (СТГ)
 - андрогены (тестостерон)
 - инсулин (сберегающий белки)
 - тироксин (при нормальном питании)
- КАТАБОЛИЧЕСКИЕ ГОРМОНЫ:
 - глюкокортикоиды (глюконеогенез)
 - тироксин (при голодаии, когда депо жиров и углеводов использовано)

ПИЩЕВОЙ РАЦИОН

- 1. КАЛОРИЙНОСТЬ** (зависит от пола, возраста, массы, роста и вида трудовой деятельности)
- 2. КОЛИЧЕСТВО БЖУ** и их соотношение **Б:Ж:У =
1:1:4 (100 г белков, 100 г жиров и 400 г углеводов)**
- 3. КАЧЕСТВО БЖУ:**
белки – **1/3** животного происхождения;
жиры – **1/3** растительного происхождения;
углеводы – необходимы клетчатка и пектины

Б:Ж:У = (1:1:5,6)
- 4. Вода, минеральные соли, витамины.**
- 5. РЕЖИМ ПИТАНИЯ:** **3-4** раза в день

Суточное распределение пищевого рациона (в %)

Питание	1-й завтрак	2-й завтрак	Обед	Ужин
4-разовое	20-30	10-25	40-50	15-20
3-разовое	30	-	45-50	20-25

ЗНАЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН

КЛЕТЧАТКА И ПЕКТИНЫ НЕ УСВАИВАЮТСЯ

- Как механические раздражители – стимулируют секрецию, моторику, образование гормонов ЖКТ.
- Как мощные сорбенты – выводят из ЖКТ токсины, избыток холестерола.
- Являются субстратом для развития нормальной микрофлоры кишечника.

Необходимы для профилактики рака, атеросклероза, дисбактериоза.

Пищевая пирамида



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

