

Орган зрения

Задачи:

Дать характеристику анализаторам,
изучить особенности строения и
работы зрительного анализатора



Пименов А.В.

Понятие об анализаторах

Одна из важнейших функций нервной системы — получение и анализ информации об изменениях условий внешней и внутренней среды. Эту функцию нервная система осуществляет с помощью **анализаторов**.


Нервная система получает информацию, обрабатывает ее и на этой основе выполняется ответная программа деятельности организма.

Понятие об анализаторах ввел *И.П.Павлов*.



Анализаторы состоят из трех частей: **рецепторной**, периферической части анализатора; **проводниковой** части — нервных путей, по которым информация передается в центральную часть анализатора; **нервного центра** в коре головного мозга, в котором информация анализируется.

Понятие об анализаторах




Рецепторная часть представлена нервными клетками, воспринимающими раздражения. В зависимости от природы раздражителя различают **фоторецепторы**, механорецепторы, хеморецепторы, терморецепторы, болевые (ноцицепторы).


То, что обычно называют органом чувств, является периферической частью анализатора. У человека связь с внешней средой осуществляется с помощью шести органов чувств: **зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания и равновесия**.




Зрительный анализатор




Орган зрения — важнейший из органов чувств, обеспечивающий человеку до 90% информации. Периферическая часть анализатора — орган зрения состоит из глазного яблока и вспомогательных органов: **веки, ресницы, слезные железы, глазодвигательные мышцы.**



Стенка глазного яблока состоит из трех оболочек. Наружная — **белочная оболочка (склера)** в передней части глаза прозрачная, этот ее участок называется **роговицей**. Конъюнктива покрывает заднюю поверхность век и переднюю часть глазного яблока до роговицы.




Зрительный анализатор



Под белочной оболочкой находится **сосудистая оболочка**, питающая глаз. В передней части сосудистая оболочка переходит в **радужку**, имеющую в центре отверстие — **зрачок**. Кольцевые и радиальные мышцы радужки рефлекторно меняют диаметр зрачка, регулируя количество света, попадающее внутрь глаза. От пигмента радужки зависит цвет глаз.


Рядом с радужкой находится **ресничное тело**, мышца, с помощью которой меняется кривизна хрусталика, осуществляется **аккомодация, приспособление к ясному видению предметов, находящихся на различном расстоянии от глаза.**


Зрительный анализатор





Между роговицей и радужкой находится полость, заполненная влагой — **передняя камера глаза**. Полость между радужкой и хрусталиком называется **задней камерой глаза**.

Третья оболочка глазного яблока — **сетчатка**. В ней расположены светочувствительные клетки — зрительные рецепторы, **около 130 млн. палочек, обеспечивающих черно-белое видение и около 7 млн. колбочек**, дающих информацию о цвете.






Зрительный анализатор





Максимальное количество колбочек находится в сетчатке на оптической оси глаза, против зрачка, этот участок называется **желтым пятном**. В том месте, где от глазного яблока отходит зрительный нерв, в сетчатке нет рецепторов — **слепое пятно**. Максимальное количество палочек находится на периферии глаза. Палочки содержат зрительный пигмент **родопсин**, для его разложение достаточно небольшого количества света. В колбочках под действие света происходит разложение **йодопсина**, но для возбуждения колбочек нужно большее количество света.

Зрительный анализатор




Сетчатка состоит из нескольких слоев клеток: наружный, прилегающий к сосудистой оболочке — слой пигментных клеток черного цвета. Этот слой поглощает свет, препятствуя его рассеиванию и отражению. Затем идет слой, содержащий палочки и колбочки, перед ним еще три слоя клеток , затем их аксоны, объединяющихся в зрительный нерв.

Зрительный анализатор





Стекловидное тело заполняет всю полость глаза, образовано прозрачным студенистым веществом. Между стекловидным телом и задней камерой глаза располагается **хрусталик**, упругое прозрачное образование в виде двояковыпуклой линзы. Хрусталик преломляет лучи света и собирает их в фокусе на сетчатке. С помощью **цинновых связок** он прикреплен к ресничной (**цилиарной**) мышце.

Световые лучи претерпевают наибольшее преломление в роговице и хрусталике, изображение на сетчатке **уменьшенное и перевернутое**.



Зрительный анализатор





Изменение кривизны хрусталика:

Сверху ресничная мышца расслаблена, внизу — сокращена. Аккомодация осуществляется за счет сокращения ресничной мышцы, при этом расслабляются цинновы связки и хрусталик, в силу природной упругости, становится более выпуклым.

Когда человек смотрит вдаль, ресничная мышца
Глаз отдыхает, при этом цинновы связки натянуты и хрусталик уплощается.


Зрительный анализатор



Миопия – близорукость, при этом нарушении зрения лучи фокусируются перед сетчаткой. Это может зависеть от большой преломляющей силы глаза или от большой длины глазного яблока. Для коррекции зрения используют очки с рассеивающими линзами.


При **врожденной дальнозоркости** глазное яблоко укороченное и предметы удаленные человек видит нормально, но при рассматривании близких предметов фокусное расстояние уходит за сетчатку.

Зрительный анализатор



С возрастом часто хрусталик теряет эластичность и становится более плоским, изображение от близкорасположенных предметов уходит за сетчатку — развивается *приобретенная дальнозоркость*.


Зрительный анализатор



Нервные импульсы поступают по волокнам зрительного нерва в задние части затылочных долей, причем аксоны от левых половин сетчатки обоих глаз направляются в левое полушарие, от правых — в правое. При этом аксоны от медиальных половин пересекаются, образуя *зрительный перекрест*.

При изменении интенсивности освещенности происходит рефлекторное изменение диаметра зрачка. Мышцы-сфинктеры, суживающие зрачок, иннервируются парасимпатическими нервами, радиальные мышцы, расширяющие зрачок, иннервируются *симпатическими нервами*, поэтому страх и боль приводят к расширению зрачков, недаром говорят: «У страха глаза велики».

Какая часть мозга обрабатывает информацию о травянистой , какая о древесной растительности?



Интересно, что левая половина единого поля зрения обрабатывается у человека в правой половине мозга и наоборот, так хрусталик проецирует на сетчатку перевернутое изображение.


Зрительный анализатор

Расстройства цветоощущения

Нормальная трихромазия




Так бы написал эту картину художник-протаномал




протаномалия-
аномальное
восприятие
красного цвета

Так бы написал эту картину художник-дейтераномал



дейтераномалия-
аномальное
восприятие
зеленого цвета


Так бы написал эту картину художник-тританомал



тританомалия-
аномальное
восприятие
синего цвета

Колбочки в сетчатке делятся на три группы, одни возбуждаются **красным светом**, вторые — **зеленым**, третьи — **синим**. Если не работает какая-то группа колбочек, развиваются заболевания, при которых человек аномально различает какие – то цвета.


Протанопия – аномальное восприятие красного цвета;
Дейтеранопия – аномальное восприятие зеленого цвета;
Тританопия – аномальное восприятие синего цвета;




Зрительный анализатор

Расстройства цветоощущения

Нормальная трихромазия



Так бы написал эту картину художник-протаномал




протаномалия-
аномальное
восприятие
красного цвета


Зрительный анализатор

Расстройства цветоощущения

Нормальная трихромазия



Так бы написал эту картину художник-тританомал




тританомалия-
аномальное
восприятие
синего цвета


Зрительный анализатор

Расстройства цветоощущения

Нормальная трихромазия



Так бы написал эту картину художник-дайтераномал



дайтераномалия-
аномальное
восприятие
зеленого цвета


Зрительный анализатор

Расстройства цветоощущения

Нормальная трихромазия




Так бы написал эту картину художник-протаномал




протаномалия-
аномальное
восприятие
красного цвета

Так бы написал эту картину художник-дейтераномал





дейтераномалия-
аномальное
восприятие
зеленого цвета


Так бы написал эту картину художник-тританомал





тританомалия-
аномальное
восприятие
синего цвета

При недостатке витамина А не образуется пигмент родопсин в палочках, при этом человек плохо видит в темноте — заболевание называется «куриная слепота». Загрязнение слизистой оболочки век (конъюнктивы), приводит к воспалительным процессам — конъюнктивиту. Чтение в движущемся транспорте, чтение лежа, длительная работа с компьютером приводят к переутомлению ресничной мышцы и снижению остроты зрения. При работе с мелкими объектами должно быть не менее 30-35 см, рабочее место должно быть хорошо освещено.











Что обозначено на рисунке цифрами 1 – 14?




Повторение




1. Что обозначено цифрами 1 — 15?
2. Как называются три оболочки глазного яблока?
3. Как называется прозрачная часть белочной оболочки?
4. Какая структура придает цвет глазам?
5. В какой оболочке глаза находится зрачок?
6. Какая структура меняет диаметр зрачка?
7. В какой оболочке находятся зрительные рецепторы?
8. Какие защитные приспособления имеет глаз?
9. Где расположены передняя и задняя камеры глаза?

Повторение



- Какие рецепторы глаза воспринимают черно-белое изображение?
- Какие рецепторы глаза воспринимают цвета?
- Где в сетчатке находится слой пигментных клеток?
- Где в сетчатке больше палочек? Где колбочек?
- Для возбуждения каких рецепторов нужно большая сила света?
- Сколько колбочек и палочек находится в сетчатке?

Повторение



- Какое нарушение зрения изображено на рис. 6 и 8?
- Какое нарушение зрения изображено на рис. 7 и 9?
- Чем характеризуется врожденная близорукость? Как исправить?
- Чем характеризуется врожденная дальнозоркость? Как исправить?