

Многообразие ЗЕМНОВОДНЫХ

Жовтобрюх Андрея 7"В"Класса

Характеристика

ЗЕМНОВОДНЫЕ-класс позвоночных животных; включает три отряда: безногие земноводные, хвостатые земноводные и бесхвостые земноводные; 25-30 семейств; около 4000 видов.

Отряды земноводных

ХВОСТАТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ- отряд земноводных.

Объединяет 8 семейств: скрытожаберные, углозубые, сиреновые, амбистомовые, безлегочные, саламандровые, протеи, амфиумовые. Около 350 видов, главным образом в умеренном поясе Северного полушария; в России 4 вида.

БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ- отряд земноводных.

Объединяет около 19 семейств, в том числе: пиповые, круглоязычные, чесночницы, древолазы, жабы, квакши, ринодермы, свистуны, лягушки, узкоротые лягушки и другие; 256 родов, около 3500 видов. Распространены широко, их нет только в Арктике и Антарктиде.

БЕЗНОГИЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ- отряд земноводных, включает четыре семейства: настоящие червяги, рыбозмеи, водные червяги и африканские червяги; всего 33 рода; около 170 видов. Внешне похожи на крупных червей или мелких змей.

Хвостатые земноводные





Тигровая
амбистома

Пятнистая саламандра





Калифорнийский тритон

Бесхвостые земноводные



Лягушка-бык



Озерная лягушка






Листолаз ужасный

Безногие земноводные



A photograph of a blue and white striped annelid worm, *Syphonops annulatus*, coiled on a light-colored tiled floor. The worm has a glossy, segmented body with alternating dark blue and white horizontal stripes. It is positioned in a loose coil, with its head pointing towards the bottom right of the frame. The floor consists of large, light-colored tiles with dark grout lines. There are some small, dark spots and stains on the tiles, particularly around the worm's head and tail.

Червяга вида
Syphonops annulatus



Водяная червяга