

A photograph of a sunset over the ocean. The sun is a bright yellow circle on the horizon, casting a warm glow. The sky is a mix of purple, pink, and blue. The foreground is filled with white, frothy foam from waves, which is slightly out of focus. The overall mood is serene and peaceful.

Палеозой Ородовик



Geofagus // Ammonit.ru



© Eric Thorsen - thorsengallery.com




Эндоцерас.



Ортоцерас

Это был период расцвета трилобитов и головоногих моллюсков с прямой раковиной – эндоцерасов и ортоцерасов.



Появились мечехвосты, на смену археоциатам пришли кораллы.

Современный
мечехвост.



Растительный мир.

В ордовикском периоде господствовали бактерии. Продолжали развиваться сине-зелёные водоросли. Пышного развития достигают известковые зелёные и красные водоросли, обитавшие в тёплых морях на глубине до 50 м. О существовании наземной растительности свидетельствуют остатки спор и редкие находки отпечатков стеблей, вероятно, принадлежавших сосудистым



Отпечаток ископаемого семенного папоротника.

Животный мир.

Ископаемая морская лилия



Позвоночные пока немногочисленны, но уже имеется два класса бесчелюстных. Появляются хорошо знакомые всем морские звезды и менее знакомые - морские лилии. В конце ордовика вымирают многие древние группы беспозвоночных.



Хорошо чувствовали себя в морях брахиоподы, гастроподы, иглокожие.

Ракоскорпион.



Кроме того были распространены ракоскорпионы, мшанки, губки, граптолиты.

Крупная мшанка ордовикского периода.





Трилобиты достигают огромного разнообразия .В ордовике были трилобиты, ползающие по дну, зарывающиеся в ил, плавающие в толще воды. Часть видов, по мнению палеонтологов, были хищными.



Ceratodus // Ammonit.ru

Ceratodus // Ammonitium

