

Презентація  
На тему:  
Плацентарні звірі  
або  
Вищі звірі

# До вищих звірів належать такі ряди як:

- 1)Ряд комахоїдні
- 2)Ряд рукокрилі
- 3)Ряд гризуни
- 4)Ряд хижі
- 5)Ряд ластоногі
- 6)Ряд китоподібні
- 7)Ряд парнокопитні
- 8)Ряд непарнокопитні
- 9)Ряд примати



## *Ряд Комахоїдні*

Плацентарні ссавці примітивної будови. Невеликі за розміром. Живляться безхребетними та комахами. Найдавніші плацентарні ссавці. Поділяються на родини: Їжакові, Кротові, Землерийкові.



- **Комахоїдні** (*Insectivora*, =*Eulipotyphla*) — надряд плацентарних) — надряд плацентарних ссавців, який поділяється на два ряди і чотири родини. Півкулі переднього мозку невеликі, без звивин. Цей ряд об'єднує близько 900 видів плацентарних ссавців, дрібних і середніх розмірів. Усі зуби у комахоїдних подібні за будовою, передній відділ голови видовжений у вигляді коротенького хоботка, на якому є довгі чутливі волосини. Ці тварини мають добре розвинений нюх. Комахоїдні заселили різні середовища життя: наземне, ґрунтове, водне. Вони переважно сутінкові тварини. До них належать їжаки, землерийки, кроти, хохулі

# Фотографії











# Ряд Рукокрилі

Рукокрилі пристосувалися до вільного польоту. До цього ряду належить Підряд Кажани. Кажани так само як і птахи мають кіль, до якого кріпляться м'язи.



- **Кажані** — підряд — підряд ссавців — підряд ссавців з ряду рукокрилих (*Vespertilioniformes*, або *Chiroptera*). Завдяки здатності до польоту кажани поширені по всіх куточках Землі. Існує близько 1000 видів — підряд ссавців з ряду рукокрилих (*Vespertilioniformes*, або *Chiroptera*). Завдяки здатності до польоту кажани поширені по всіх куточках Землі. Існує близько 1000 видів, і кажани становлять майже одну чверть усіх сучасних видів ссавців. Хоча кажани досить поширені, у регіонах з інтенсивним розвитком промисловості і сільського господарства чисельність їхніх популяцій катастрофічно зменшується, і багато видів зараз знаходяться на межі зникнення. В Україні більшість видів внесено до Червоної книги України (2009).
- Довжина тіла кажанів — від 2,5 до 14 см. Кажани є переважно комахоїдними рукокрилими. Кажани добре бачать, але орієнтуються у просторі за допомогою ультразвуку: випускаючи локаційні сигнали у вигляді коротких ультразвукових імпульсів частотою 20-120 кГц і тривалістю 0,2-100 мс. Нічні тварини.

# Фотографії







# Ряд Гризуни

Найчисельніший ряд ссавців.  
Відрізняються від решти ссавців  
відсутністю іклів та наявністю двох пар  
розвинених різців. Переважна більшість  
гризунів-рослиноїдні.



- **Гліреси (Glires)**, або **гризуні** в широкому (вихідному) розумінні (Rodentia sensu Linnaeus) — надряд, що обіймає два ряди **ссавців** в широкому (вихідному) розумінні (Rodentia sensu Linnaeus) — надряд, що обіймає два ряди ссавців — **Зайцеподібні** в широкому (вихідному) розумінні (Rodentia sensu Linnaeus) — надряд, що обіймає два ряди ссавців — **Зайцеподібні (Lagomorpha)** й **Мишоподібні (Muriformes)**.
- Гризуни - це зазвичай тварини невеликих розмірів. Розміри тіла коливаються від 5 сантиметрів у деяких **мишівок** Гризуни - це зазвичай тварини невеликих розмірів. Розміри тіла коливаються від 5 сантиметрів у деяких мишівок до 130 сантиметрів у **капібари** Гризуни - це зазвичай тварини невеликих розмірів. Розміри тіла коливаються від 5 сантиметрів у деяких мишівок до 130 сантиметрів у капібари. Але зазвичай не перевищують 50 см. Хвіст у гризунів може бути значно довшим за тіло (наприклад, у **мишівок** Гризуни - це зазвичай тварини невеликих розмірів. Розміри тіла коливаються від 5

# Фотографії

















# Ряд Хижі

Характерною ознакою цих звірів є наявність великих іклів і гострих кутніх зубів. Ряд хижі поділяється на Родини: Котячі, Собачі, Куницеві та Ведмедеві.



- **Хижі** (Carnivora) (від лат. *carō* — м'ясо + *vorāre* — пожирати) — різноманітний ряд плацентарних ссавців — пожирати) — різноманітний ряд плацентарних ссавців, що включає понад 270 видів. Дослівно Carnivora означає «м'ясоїдні» або «плотоїдні».

- 

Багато хижих харчуються не лише м'ясом. Ведмежі (Ursidae) є опортуністичними всеїдними, а деякі види, такі як велика панда і зовсім спеціалізуються на рослинному живленні. В малих панд, борсуків, олінго, кинкажу, ракунів і єнотів рослинна їжа також складає значну, якщо не основну частину їх меню. Гієни і псові (вовки, койоти, шакали, лисиці) поїдають кавуни і дині на баштанах і фрукти, що впали на землю.



# Фотографії



















# Ряд Хижі в анімації



Дякуємо за перегляд!!!



