

- *Конкурс презентаций «Интерактивная мозаика»*
- *Номинация «Интерактивный кроссворд»*
- *Сайт: Pedsovet.su*
- *Автор :Боклагова Елена Евгеньевна*
- *Место работы: муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №5 г.Красный
Сулин*
- *Учитель биологии и химии*
- *Учитель высшей категории*





- интерактивный кроссворд по биологии

- «По страничкам Красной книги

Ростовской области»

- для учащихся 5-6 классов

- (базовой школы)



2

б



4

ф



к

о

л

п

и

ц

а



г

л

о

5

и

м

д

н



3

о

р



п

о

л

о

з



ф

а



Колпица

Platalea leucorodia



Достигает длины 1 м, веса в 1,2-2 кг. Размах крыльев 115—135 см. Окраска обыкновенной колпицы белая, клюв и ноги чёрные. В брачном наряде развивается хохолок на затылке и охристое пятно в основании шеи. Гнездится в низовьях Дона и его притоков. Редкий вид с сокращающейся численностью. Включён в список редких и исчезающих видов птиц РО.

Дрофа



Otis tarda.
Встречается на
Дону в различных
районах.
Места её обитания на
территории – открытые
целинные ковыльно-
типчаковые степи.
Редко гнездится на полях
озимых зерновых культур
и на сенокосных угодьях.
Редкий вид, численность,
которого быстро
сокращается по
всему ареалу.



Фили

Н

Budo budo L.

Одна из самых крупных.....мира.

Размеры самцов варьируют географически от 50 см и 1100 г до 65 см и 2800 г, самки крупнее: 60-75 см и 1700-4200 г.

Размах крыльев - от 160 до 188 см.

Интенсивность темного рисунка оперения различна, характерны тонкая поперечная рябь на брюхе и черные широкие продольные пестрины на груди и шее.

В природе доживают до 20 и более лет, в неволе - до 60.

Узорчатый полоз



Достигает в длину **1,5** м, хвост, как правило, не превышает **17—30** см. Предглазничный щиток иногда может быть частично разделён снизу. У самцов — **171—201** брюшных щитков, а у самок — **187—214**. Чешуя на боках тела гладкая, а на спине — со слабыми ребрышками и двумя порами. Вид характеризуется очень изменчивой окраской. На верхней поверхности головы расположен специфический рисунок, меняющийся с возрастом. От глаз к шее проходит тёмная височная полоса. Брюхо сероватое или желтоватое с красноватым крапом и иногда тёмными пятнами.


Богомол

обыкновенный



Mantis religiosa. Распространён в юго-восточных районах области.

Обитает в разнотравье, где маскируется под цвет окружающей среды. Теплолюбивый дневной хищник, питающийся насекомыми. Везде малочислен, встречаются единичные экземпляры. Редкий, нуждающийся в охране вид.



Они ждут нашей
защиты!!!



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ

- -Лабораторный практикум БИОЛОГИЯ
6-11класс-НФПК
- -Сонин Н.И. «Биология»-6кл
- Плешаков А.А.«Природоведение»-5класс

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- <http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=1964>
- <http://bloganet.ru/news/drugoe/besplatnye-shablony-dlya-prezentacij-power-point/>
- <http://images.google.ru/imghp?hl=ru&tab=wi>
- <http://images.yandex.ru/>
- <http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text>
- -Лабораторный практикум БИОЛОГИЯ 6-11класс-НФПК

