



**ПОДТИП ЖАБРОДЫШАЩИЕ
(BRANCHIATA)
КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ
(CRUSTACEA)**

Около 40 тыс. видов



Общая характеристика:

1. Среда обитания и образ жизни:



- Преимущественно водные: морские и пресноводные. Постоянные и временные водоемы.
- Небольшое число наземных и почвенных видов: например мокрицы, некоторые крабы
- Некоторые виды – паразиты (Карповые вши, китовые вши, саккулина)

Водные ракообразные:



- Придонные – **бентосные**
- Пассивно парящие в толще воды – **планктоны**
(Ветвистоусые, Веслоногие)
- Активно плавающие – **нектонные**
(плавающие крабы)


After: Henderson, 1888

After: Bate, 1888


After: Paulson, 1875

- Подвижные (ходячие и плавающие)
- Прикрепленные (балянусы, морские уточки)







Бокоплав (антенны)




Неполнохвостый рак
(антенны)




Веслоногий рак
(ротовой аппарат)



Эвфаузиевый рак (конечности)



Неполнохвостый рак
(ротовой аппарат)



Усоногий рак
(конечности)

Питание:

- Хищники (Раки-богомолы, рак-щелкун)
- Сапрофаги
- Фильтраторы




2. Размеры и внешнее строение:





- Мелкие – до 1 мм
- Крупные – до 80 см (панцирь), до 2 м в размахе ног (см. Камчатский краб)

- Сегменты – 3 отдела (голова, грудь, брюшко). У некоторых слияние сегментов (отделов) – головогрудь



Keith A. Crandall




- Во всех отделах тела на сегментах – по паре конечностей
- Конечность – исходно двуветвистая
- Конечности различны на разных отделах – многофункциональны:
- На голове: **антенны, antennulae** (осознание и равновесие), челюсти
- На груди: двигательные конечности (плавательные или ходильные) + вспомогательные при питании, дыхании (жабры) и т.д.
- На брюшке: конечности плавательные, дыхательные, половые

3. Хитиновый покров:



- Обычно 2-а слоя:
Экзокутикула и
эндокутикула
- Кутикула может быть пропитана CaCO_3 для прочности
- Хитиновые элементы сегментов могут сливаться – общий панцирь
- На голове может образовываться складка, прикрывающая голову и грудь – **карапакс**
- В гиподерме пигменты (окраска тела). Некоторые ракообразные способны изменять окраску


4. Дыхание:



- Большинство – жаберное. Жабры на конечностях
- Некоторые мелкие ракообразные – дыхание через тонкие покровы
- У наземных ракообразных – жаберные полости, спрятанные внутри тела. Частичная редукция жабр

5. Органы выделения:

- 1 или 2 (редко) пары почек – измененные целомодукты
- **Антенальные и максилярные** железы



6. Половая система:






- Раздельнопольые. Редко у неподвижных форм - гермафродитизм
- Часто ярко выраженный половой диморфизм (Манящий краб – Uca)

7. Размножение и развитие:



- В период размножения у некоторых высших ракообразных – сложное брачное поведение (Манящий краб)




Развитие чаще с метаморфозом, реже прямое


При непрямом развитии разные личинки у разных групп:

- Яйцо – **науплиус** (акрон+2+тельсон; науплиусов глаз) – метанауплиус *** у низших ракообразных
- Яйцо – науплиус – метанауплиус – **зоеа** – **мизида** *** у креветки
- Яйцо – зоеа *** крабы
- Прямое развитие (например у раков)


8. Значение в природе и жизни человека:




- Участие в цепях питания. Многие планктонные ракообразные (массовые виды) – основа питания для рыб, китов и пр.
- Ракообразные-фильтраторы – биологическая очистка воды. Осаждение взвешенных в воде частиц – осветление



1




2



3

Brueboden © 2003

1. Fish louse (*Argulus foliaceus*); 2. *Argulus japonicus*; 3. *Dolops ranarum*. (Illustration by Bruce Worden)



Whale lice

- Ракообразные – паразиты водных беспозвоночных, рыб и морских млекопитающих



● Человек –
использует многие
виды в пищу себе
(Крабы, крабоиды,
креветки) и
разводимым
животным (в рыбном
хозяйстве – дафнии,
артемия)